



28,883 /A /1

A x 0.1 c



Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b22021589>



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

*Ouvrage du même Auteur et qui se
trouve chez le même Libraire.*

LE SYNOPSIS DES FIÈVRES, 1 vol. in-8°.

Hippocrates III

42550



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

HIPPOCRATIS APHORISMI.

APHORISMES

D'HIPPOCRATE,

Traduits sur le texte Grec, d'après la collation
des Manuscrits de la Bibliothèque Impériale;
avec une Dissertation sur ces Manuscrits, et les
Variantes.

PAR M. DE MERCY,

Docteur en Médecine, de la Faculté de Paris, Professeur
particulier de Médecine Grecque, et Membre de plu-
sieurs Sociétés savantes.

A PARIS,

Chez CROCHARD, libraire, rue de l'École de
Médecine, n^o. 3.

AN 1811.



A

M. J. N. CORVISART,

PREMIER MÉDECIN DE S. M. L'EMPEREUR
ET ROI ; BARON DE L'EMPIRE ; MEMBRE
DE L'INSTITUT ; PROFESSEUR HONO-
RAIRE AU COLLÈGE DE FRANCE , ET A
L'ÉCOLE DE MÉDECINE , etc. , etc.

Monsieur le Baron,

*Les titres que vous possédez à la
Science sont si éminens , que mon*

travail ne peut vous être offert ,
comme un tribut de reconnaissance.
C'est dans les *Fastes de l'Art* , qu'il
sera permis de citer votre nom
justement célèbre , qui transmettra
par la bouche de la *Renommée* , les
services importans que vous avez
rendus à la *Science* , et vos glorieux
Travaux. La perspicacité médicale,
qui sait pénétrer les maladies des
organes les plus cachés , est un don
qui n'appartient qu'au *Praticien*
illustre ; et votre gloire justement
méritée , s'appuie encore du suf-
frage du *Grand Roi*.

Vous êtes le protecteur de la *Mé-*
decine , et le digne soutien de la

gloire d'Hippocrate. Puis-je mieux
 vous rappeler ces titres , M. le
 Baron , qu'en vous priant de pren-
 dre sous votre protection , cet ex-
 cellent Ouvrage du père de la Mé-
 decine. C'est aussi sous vos yeux ,
 que le Diagnostic médical a été por-
 té à ce degré de perfection qui fait
 pressentir d'avance l'excellence de
 la méthode de vos principes , dont
 les heureux résultats sont aussi des
 Prognostics certains dans l'art de
 guérir. Tant de titres mémorables
 m'imposent l'obligation de consac-
 rer ma vie entière à de longs tra-
 vaux , pour me rendre digne , aux
 yeux de la postérité , de l'honneur

*que vous daignez m'accorder . Puis-
sent mes vœux être accomplis , et
les Ouvrages d'Hippocrate étudiés
de nouveau à leur source , vous être
offerts tout entiers , comme un hom-
mage digne de votre illustre répu-
tation !*

*Daignez agréer, M. le Baron , les
sentimens distingués de ma profonde
vénération.*

Votre très-humble et très-obéissant serviteur ;

DE MERCY. D. M. P.

PRÉFACE.

LES Aphorismes d'Hippocrate sont pour les médecins praticiens l'ouvrage le plus précieux à consulter, parce qu'il n'est le fruit d'aucune de ces combinaisons de l'esprit humain qui tiennent aux systèmes, mais qu'il est tout entier fondé sur la nature. C'est aussi pourquoi il a reçu l'approbation des siècles, et a mérité chez tous les peuples d'être consulté comme l'oracle de la médecine. Il a servi de base aux décisions des jurisconsultes, lorsqu'il s'est agi des questions les plus difficiles relatives à la physique médicale; et nous y trouvons encore les vrais fondemens de la médecine clinique.

L'existence d'Hippocrate, contemporain d'Hérodote, est prouvée par le témoignage des plus anciens philosophes, et par celui des anciens historiens.

Platon , Aristote , donnent les plus grands éloges à cet habile maître , dont ils ont emprunté les principes de la philosophie. On sait que cette science étoit cultivée avec beaucoup de soin du temps d'Hippocrate. Ce grand médecin philosophe avoit , dit-on , étudié sous Démocrite. Mais si l'on considère , d'après la doctrine d'Hippocrate , que la vie qu'il désigne sous le nom de *chaleur innée* , est le feu universellement répandu dans toute la nature , comme l'élément de tous les corps ; on sera plutôt porté à croire que notre philosophe a puisé ces principes dans Héraclite. Plutarque fait mention , dans la vie de Caton l'ancien , qu'Hippocrate le premier a porté le flambeau de la philosophie dans la pratique de la médecine. Nous trouvons dans Pline , la preuve de ce témoignage authentique : *Medicinam revocavit in lucem Hippocrates genitus Co , imprimis clara ac valida et Esculapio dicata ,*

cap. xxix, ex Varrone. Enfin, Hippocrate, que les philosophes ses contemporains, avoient nommé l'ami de la nature, a mérité en se consacrant tout entier à l'art de guérir, le titre de Père et de Fondateur de la médecine. Mais c'est effectivement par ses grandes connoissances consignées dans les écrits, qu'il a transmis à la postérité, que la célébrité de son nom est parvenue jusques à nous, malgré l'intervalle immense de vingt-deux siècles. Il sut le premier combattre les faux systèmes, dévoiler les erreurs grossières de l'empirisme, dissiper les faux préjugés et démontrer par une analyse raisonnée des fonctions du corps humain et des phénomènes de la maladie, que la médecine est une science fondée sur l'observation; et que, comme la philosophie, elle existe dans la nature. Il prouva par ses écrits, qu'il possédoit au degré le plus éminent, le rare talent de l'observation. Ses livres, tels

que les Aphorismes , les Prognostics , les Constitutions , les Epidémies et les Histoires des maladies , le Traité du régime dans les maladies aiguës . le Traité des airs , des eaux et des climats , sont encore , de l'aven de tous les médecins , des chef-d'œuvres , sur lesquels repose en entier l'édifice de la médecine. C'est surtout dans la rédaction des Aphorismes , qu'Hippocrate a excellé , et qu'il se surpasse lui-même. Au rapport de Suidas , cet ouvrage s'élève au-dessus de l'intelligence humaine : ὑπερβαλλῶσι τὴν ἀνθρωπίνην σύνεσιν. En lisant le premier Aphorisme , on ne peut s'empêcher d'admirer la beauté des pensées qu'il renferme ; on y trouve l'exorde de toute la médecine. *Vita brevis , ars longa , experientia fallax , judicium difficile* : « la vie est courte , l'art est long , l'expérience est trompeuse , le jugement est difficile. » Cette interprétation qui ne doit être considérée que sous le seul point de vue philosophique , est loin de

ressembler au sens vulgaire qu'on attache à *πειρα σφαλερή* — *experimentum periculosum*, qui détruit le sens de l'Aphorisme. Pour bien le comprendre, il faut définir auparavant ce qu'on entend par expérience en médecine, et par crise ou jugement de la maladie.

L'expérience en médecine est cette connoissance des maladies et de leur traitement, fondée sur la régularité d'une série de faits de pratique soumis au raisonnement et à l'observation. D'après cette définition, qui suppose la parfaite connoissance de ce que les anciens ont appris, jointe à ce que les modernes savent parfaitement, on voit que la carrière de la vie, quelque longue qu'elle puisse être, ne suffit pas aux grands travaux qu'exige la médecine, qui est un art qui se perfectionne à l'aide des autres sciences.

Le jugement que l'on porte sur la maladie est fondé sur l'expérience, appuyée des dogmes fondamentaux de

l'art de guérir, dont la juste application, toujours soumise à la sagacité du médecin, le détermine sur le choix du traitement et lui en fait prévoir les conséquences heureuses ou funestes.

Telle est l'expérience raisonnée dont a fait usage Hippocrate, et c'est dans ce sens qu'il faut admirer les pensées philosophiques renfermées dans le premier Aphorisme, qui peint à grands traits les devoirs du médecin, la brièveté de la vie, la nécessité de s'instruire, la difficulté de juger ou de bien connoître la maladie, le moment bien court de l'application du remède, sans pouvoir se dissimuler que l'expérience la plus consommée peut encore nous tromper : *Nam errare humanum est*. C'est cette vérité si douloureuse qui doit nous faire redoubler d'efforts, de constance et de travail pour vaincre la nature.

L'art difficile du Prognostic a été pour Hippocrate le principe de sa gloire. Galien conçut une telle admiration pour

ce grand maître, qu'il en parle comme d'un Dieu : πάλιν ἔν' ᾧσπερ ἀπὸ θεῶ φωνῆς τῆς Ἱπποκράτους ἀρξάμεθα λέξεως. *De l'usage des parties*, cap. 9. Aëtius dit de même, que ce n'est point un homme, mais que c'est la nature qui parle par la bouche d'Hippocrate.

Les Aphorismes ne doivent leur célébrité qu'à la vérité des sentences qu'ils renferment; ils sont écrits dans un style grave, simple, et néanmoins plein de majesté. Εἰς οἷς ὀλίγη λέξις δυνάμεις ἔστι μεγάλη. La concision et la clarté règnent dans tout l'ouvrage : ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'on y trouve en substance, l'extrait de toutes les œuvres du père de la médecine; et l'on peut dire, en effet, que c'est le chef-d'œuvre de l'art. C'est aussi pourquoi les Aphorismes ont été traduits et commentés dans presque toutes les langues : en effet, ils sont des dogmes vivans de la médecine d'observation; et ces dogmes sont si peu l'effet du système

et du raisonnement , qu'ils sont le corollaire des livres historiques , par conséquent des leçons vivantes et perpétuelles de médecine clinique. Cette vérité est sensible pour quiconque veut faire la comparaison de la plupart des sentences aphoristiques d'Hippocrate avec les faits de pratique qu'on observe journellement en médecine , et de l'authenticité desquels l'on peut s'assurer en lisant les Constitutions, les Histoires de maladies rapportées dans le premier et le troisième Livres des Epidémiques.

Les nosologies et les nosographies inventées par la médecine moderne , ont ce rare avantage sur la médecine ancienne , qu'elles dirigent plus sagement dans la voie de l'observation , et qu'elles offrent pour ainsi dire , dans un même tableau, toute la suite des connoissances médicales. Cette méthode est du plus grand prix pour la science, parce qu'elle met plus à portée les jeunes médecins de

s'instruire et de juger des progrès faits par l'art de guérir. Cependant on ne peut encore citer comme le modèle le plus parfait d'observation en médecine, que les livres d'Hippocrate; mais pour pouvoir profiter de l'exemple et former son style, il faut étudier les livres originaux, et ne pas s'en rapporter aux traductions : le texte grec même ne suffit pas, il faut encore y joindre les manuscrits grecs; point de bonne traduction sans ce secours; c'est le jugement qu'en portent tous les sava-
vans. Afin de mériter leurs suffrages, j'ai joint aux Aphorismes, les variantes des manuscrits grecs. J'ai puisé dans ces sources précieuses et trop négligées, des leçons utiles pour éclaircir le texte et la version latine. J'ai rétabli aussi quelques Aphorismes qui manquent dans nos éditions. La septième section m'a paru surtout avoir été tronquée par les copistes. Quelques Aphorismes que j'y ai ajoutés,

et qui mettent dans un nouveau jour la doctrine d'Hippocrate , confirment la bonté des leçons des manuscrits grecs. La différence des pensées renfermées dans le seul mot *κακόν*, qui termine plusieurs Aphorismes de cette section , et qui est répété dans le latin par *malum* , mais que j'ai interprété dans un sens toujours médical , me semble donner à la septième section , un intérêt nouveau , et qui rappelle des faits de pratique , qu'il est facile à tout médecin de reconnoître. Il est impossible que dans un aussi petit volume je cite beaucoup d'autorités ni que j'accumule les preuves ; je me borne donc aux seuls manuscrits grecs et aux commentateurs qui ont écrit dans cette langue.

Les plus importantes corrections que j'ai faites au texte grec , sont : 1^o. pour l'Aphor. 23 , s. ij. J'ai démontré qu'au lieu du quatorzième jour , il faut lire le vingtième , pour la crise qui est annon-

cée le dix-septième dans l'Aph. 24 de la même section. Cet Aphorisme prouve encore qu'il est ici question particulièrement des fièvres aiguës, dont le terme ordinaire est de vingt jours; au lieu des maladies aiguës en général ou des phlegmagies qui se terminent en quatorze jours.

2^o. Pour l'Aphor. 36, sect. iv. J'ai complété le nombre des jours critiques, en ajoutant aussi avec les manuscrits grecs, le trente-septième jour, qui est indicateur, et le quarantième qui est critique dans Hippocrate, et le terme des maladies aiguës qui se prolongent.

3^o. Suivant la même leçon, l'Aph. 23 de la deuxième section est reporté dans la septième, à l'Aph. 37, et joint à l'Aph. 59 de la quatrième, répété aussi dans la septième section, dans les meilleurs manuscrits; ce qui montre avec évidence, la bonté de cette leçon, et qui prouve la vérité du sens de l'Aph. 38, sect. vij. L'on voit ainsi le

rapport qui existe entre les phlegmasies et les maladies moins aiguës, et les fièvres continues, dont le terme commun est de vingt jours. Aph. 23, section ij. Prosper Alpin indique de même dans l'index du livre de *Præsagiendâ vitâ et morte ægrotantium*, que le terme des maladies aiguës est de vingt jours: *morborum acutorum, terminus est dies vigesimus*; et il en donne l'explication, pag. 418, d'après un passage des Prognostics d'Hippocrate.

Quant à la traduction latine, une des corrections les plus importantes, est celle que je donne pour l'Aphorisme 38, section vij. *Destillationes ad ventrem superiorem in viginti diebus coquuntur*. Toutes les éditions portent *suppurantur*. Qu'on se rappelle l'Aphorisme 40, section ij, on verra qu'Hippocrate a spécifié lui-même la coction, comme terminaison de la maladie, qui, parce qu'elle attaque la poitrine, ne change pas pour

cela de nature: *si fluit ad pectus dicatur rheuma catarrhus. Ad fauces bronchus, ad nares esto coryza.* Or, on n'a pas observé que dans le coryza ou catarrhe de la membrane pituitaire, dans le catarrhe ou rhume de poitrine, et dans l'enrouement de la gorge, que l'excrétion très-abondante qui accompagne ce genre de maladie, ait pu donner lieu à la formation du pus. Il y a plus, on n'a jamais été bien sûr qu'il y ait eu suppuration, même d'après l'inspection des crachats. Prosper Alpin s'était aperçu d'un tel contre-sens; car en citant l'Aph. 38, section vij, liv. vij, cap. xix, p. 559, du livre précédent, où on lit : *Destillationes in ventrem superiorem, ad suppurationem veniunt intra dies 20.* Il ajoute : *et clarius, in lib. v, Aph. 8; de pleuriticis : quicumque morbo laterali, laborantes in diebus xij, non repurgantur, ad suppurationem vertuntur.* On voit que ce célèbre praticien a

douté du sens de l'Aphorisme. Mais lorsqu'on sait qu'Hippocrate considère la coction des crachats, comme terminaison de la maladie, il suffit de rappeler les caractères de l'excrétion critique, pour être bien convaincu que *περαιώνεται*, ne désignant que la possibilité de la coction, aurait mal convenu ici, au lieu de *εκπύσσεται*, qui marque, spécialement, que la coction est achevée, et démontre en outre la guérison de la maladie. Le véritable sens de *εκπύσσεται*, pour la maladie dont il s'agit, est expliqué par Hippocrate dans le Traité du régime dans les maladies aiguës : *πίπορα δὲ εἰσι, τὰ μὲν πύελα, ὅταν γένηται ὅμοια τῷ πύρρ.* Foës. Texte 40. *Les crachats sont cuits lorsqu'ils ressemblent à du pus.* J'ouvre un livre moderne en médecine, il confirme entièrement la pensée d'Hippocrate, dont la doctrine est exposée clairement dans l'Histoire de la médecine clinique par Mahon. On lit à

l'article d'Hippocrate , de la coction par les crachats , pag. 33 : « Quand la poitrine est affectée , c'est aux crachats qu'il faut principalement faire attention. Un crachat qui est le fruit d'une bonne coction , doit être doux , blanc , égal , d'une seule couleur , et semblable au pus d'une bonne qualité ; il doit être assez promptement chassé par une toux facile , et paroître assez abondant. » Ces signes sont sur-tout visibles dans le catarrhe ou rhume de poitrine. On peut pareillement citer pour exemple d'une coction semblable à la suppuration , l'écoulement qui est occasionné par la maladie , connue sous le nom de *hémorrhagie* , ou *catarrhe de l'urèthre*.

La même analogie existe pour les autres écoulemens muqueux , dont la source est dans l'irritation des cryptes et follicules répandus sur toute la surface des membranes muqueuses , dont l'excitation de fonction par état de maladie , donne lieu à une sécrétion plus abondante du fluide qui lubrifie ces

parties et en altère les qualités. Il change d'abord de consistance : dans le commencement de la maladie, c'est une eau limpide très-âcre , qui excorie la peau ; mais à mesure que la coction avance , l'humeur s'épaissit , prend une couleur jaunâtre , puis blanchâtre , et ressemble au pus ; alors l'écoulement diminue et se tarit entièrement. On produit à volonté un rhume artificiel , par l'inspiration des vapeurs du gaz acide muriatique oxigéné ; et on observe les mêmes phénomènes dont je viens de parler. Lorsque l'irritation continue , la maladie devient chronique , et peut durer des mois et même des années : mais on ne voit pas qu'il survienne pour cela de suppuration. Cette explication fondée sur la connoissance que nous avons des fonctions des membranes muqueuses , me dispense de tout autre *commentaire. Le catarrhe ne vient donc pas à *suppuration* dans vingt jours , mais il se termine par *coc-*
tion.

tion. La pleurésie se termine par la coction des crachats en quatorze jours, mais elle va quelquefois à vingt jours ; preuve d'autant plus manifeste que dans la première maladie, il ne s'agit que de la coction par les crachats, et non de suppuration.

Pour l'Aph. 6, sect. j, je citerai Meletius, dont le commentaire, Aph. 4, prouve que les anciens ont compris sous la dénomination de régime, non-seulement la diète, mais encore la saignée, les bains, les lavemens ; en un mot, tout le traitement des maladies aiguës.

Καὶ μὴ τις μεμψῆται τὸν ἰπποκράτην ἐπ' αἰτιᾷ τὸ τῆς διαίτης ὀνομασθέντα ἰδιώματι γὰρ παλαιῶ ἐχρήσατο καθ' ὃ πᾶσαν τὴν περὶ τὸν κάμνοντα γινομένην ἐπιμέλειαν οἱ παλαιοὶ διαίταν καλεῖν εἴωθονσαν ὥς ἐκ ἂν ἀμεάρτης φλεβοτομίαν ἢ κλυσιγῆρα ἢ

ἰπερδροχῇ ἢ ἑτέρον τι τῶν ἔτω γινομένων
 διαίταν ὀνομάζων.

Cette interprétation donnée par le philosophe grec, explique très-clairement le sens de *ἰς ἀριεῖην*, qui dit plus que *exquisite et diligentissime*; et *ad unguem adhibitæ*: car il s'agit ici de l'exactitude du choix, dans les moyens de guérir. Or, dans les maladies aiguës, les traitemens les plus prompts, sont à cause de l'exactitude, ceux qu'il faut préférer. C'est ce que désigne *ἔσχατα νοσήματα* joint à *ἔσχαται θεραπείαι*, *ad extremos morbos, summa curationes quoad rectitudinem sunt optimæ*; le contraire a lieu pour les maladies lentes: *morbi longissimi blandissime tractari expetunt, non vehementioribus irritari*. Plato in timæo. Pour prouver la vérité de cet aphorisme, il suffit de citer un fait de pratique qui ait rapport à une maladie très-aiguë. Dans la pleu-

résie , ou la pneumonie , ou l'esquinancie inflammatoire , il faut employer la saignée du bras ; mais si au lieu de ce moyen curatif , dont les effets sont très-prompts , et même subits , on préfère la saignée par les sangsues , dont les effets sont peu énergiques et très-lents , on n'a point rempli l'indication , qui consiste à abattre sur-le-champ la violence des symptômes inflammatoires , par la déplétion prompte et abondante des vaisseaux sanguins ; on commet une inexactitude dans le traitement , et celle-ci peut avoir les suites les plus funestes et même coûter la vie au malade. Dans l'esquinancie , encore qu'on ait satisfait à l'indication pour avoir employé la saignée du bras , si au lieu de donner sur-le-champ l'émétique , dont les effets sont très-prompts sur les voies supérieures , on préfère un purgatif qui n'agit que lentement sur les voies inférieures ; on commet encore une inexactitude dans le traite-

ment, et il en peut résulter les suites les plus funestes, même la mort du malade. Les maladies très-aiguës où les symptômes sont très-violens, exigent les traitemens les plus prompts, et c'est dans les maladies lentes que l'on peut attendre tout de l'expectation.

Ἰπποκράτης) ἑσχατα καλεῖ νόσήματα, τὰ κατόξια ἐσχάτην δὲ θεραπείαν. (θεραπείαν, χ 2.) τὴν λεπτωτάτην. διέτλαν σ. (διαίταν χ 2.) ἥγυν (τούλεισι χ 2. ἀσιτήαν σ. (ἀσιτίαν χ. 2.)

Le sens de ce passage, qui se trouve dans presque tous les commentateurs grecs, est que la diète la plus extrême, qu'Hippocrate désigne sous le nom de régime, dans les maladies très-aiguës, est le meilleur moyen de guérir. Mais il est impossible qu'on attende de la diète, les effets subits de la saignée du bras ou de la purgation.

Dans l'Aph. 23, sect. j, καὶ τῷτο

προεξεκρίνησαντας , *prius judicatione absolutâ hoc faciendum*, au lieu de *cautione prius diligenti adhibitâ*, qui donne une signification vague, et non pas un précepte : Hippocrate a mieux connu que personne le danger de faire la médecine du symptôme, on en a la preuve par ce qu'il a dit de la coction.

Parmi les nombreuses éditions des Aphorismes d'Hippocrate, j'ai préféré la version de Lorry, dont la dernière édition grecque et latine a été publiée en 1784. J'ai conféré le grec avec les meilleurs manuscrits, et j'ai fait tous mes efforts pour que mon édition soit correcte. Le premier auteur de la version latine que je viens de citer, est Almeloveen. Elle parut pour la première fois à Amsterdam, en 1685, d'après l'édition de Werhoofd, Lind. 1665, avec les passages parallèles de Celse et d'Hippocrate, comme on voit à la fin du dernier

volume de l'ouvrage de Henry Etienne, *artis medicæ principes*, 2 vol. in-fol. 1567.

Dans cette édition, les citations de Celse sont rapportées au-dessous du grec, mais seulement quant aux Aphorismes et prognostics.

J'ai supplée à l'édition du Celse d'Almeloveen, dont il reste à peine quelques exemplaires, par la nouvelle édition du Celse du docteur Pariset. Elle est correcte et d'un format commode pour les jeunes médecins. Cette édition se trouve aussi chez Crochard, qui réunit en petit format, les œuvres des anciens médecins. L'édition d'Almeloveen a été justement critiquée pour le grec, mais la version latine, comparée au meilleur texte, me paroît avoir la majesté, la concision et la clarté du grec. Les additions faites par le savant Lorry la rendent encore plus correcte. Enfin,

j'ai préféré la table de Verhoofd à celle de Rieger, parce que la première est méthodique, et a le grand avantage d'offrir aux jeunes médecins, une courte analyse des Aphorismes, suivant leur application médicale. C'est un petit tableau de médecine clinique.

Dans mon édition, je n'ai fait usage ni des abréviations, connues vulgairement sous le nom de *ligatures* dans l'écriture grecque, ni des *jonismes* en particulier, à mon grand regret; mais voulant épargner la peine et le travail des jeunes médecins, à qui je consacre mes veilles et mes études, je serai bien récompensé si j'ai pu contribuer à leur faire aimer la lecture des ouvrages des médecins grecs. Le plan que j'ai adopté dans mon premier ouvrage, a reçu l'approbation de la Faculté de Médecine de Paris. Voyez son Rapport du 9 juin 1808, annexé au synopsis des

fièvres, 1 vol. in-8°. , imprimé chez Valade. J'ai cru rendre service à la science, en publiant dans les trois langues, les Aphorismes d'Hippocrate, qui doivent être connus de tous les médecins. La moindre inexactitude est d'une telle conséquence dans l'interprétation des livres de médecine, surtout pour les Aphorismes, qui concernent spécialement la pratique de l'art, qu'on ne peut se passer absolument du texte grec. Dans un ouvrage dont le style est d'une aussi grande concision, le latin même est souvent embarrassant ; j'ai donc ajouté le français ; d'ailleurs cette langue exprime plus clairement les idées et ne souffre point les mots souvent équivoques du latin. En publiant ce travail, mon intention a été surtout de rappeler plus que jamais en médecine, l'étude des anciens auteurs. *Le synopsis des fièvres*, a été composé sous le double point de vue d'offrir à la méditation des

jeunes médecins, plusieurs observations de maladies les plus connues, dont l'histoire avec le texte grec, a été puisée dans Hippocrate, Galien et Palladios, afin de faire mieux sentir la beauté du style d'Hippocrate; de présenter en même temps un modèle d'observation en médecine, et un sujet d'étude pour ceux qui veulent connoître le texte grec. Voulant diminuer la longueur du travail, j'ai expliqué, en donnant la définition des termes de médecine, toutes les phrases, suivant les principes de la langue grecque. Ce livre est d'autant plus utile, qu'il sert à l'explication des Aphorismes et à leur application médicale, particulièrement pour l'ordre des fièvres, dont j'ai puisé les exemples dans le premier et le troisième livre des épidémiques d'Hippocrate: telle est la matière de mon premier ouvrage. Ma tâche se trouve ainsi remplie; et si mes efforts sont secondés des savans, je pense que

bientôt on ne verra plus citer Hippocrate qu'avec le texte grec , c'est du moins le vœu que je crois le plus général et celui que j'émetts pour l'intérêt de la science.

DISSERTATION

CONCERNANT

LES MANUSCRITS GRECS.

IL existe à la Bibliothèque impériale beaucoup de manuscrits grecs des Aphorismes d'Hippocrate; je ne puis qu'en parcourir le nombre, pour citer ceux qui m'ont fourni les leçons les plus importantes. Le catalogue imprimé des manuscrits grecs en donne le tableau suivant, sous la série des numéros 36 α , 1297 β , 1883 γ , 1884 δ , 2141 ϵ , 2142 ζ , 2143 η , 2144 θ , 2145 ι , 2146 κ 1., 2149 κ 2., 2219 λ , 2255 μ , 2256 ν , 2257 κ 3., 2258 ξ 1, 2259 ξ 2, 2260 \omicron , 2330 ξ 3, 2596 π , 2140 ρ , 2261 τ , 269 υ , 2228 ϕ 1, 2296 ϕ 2, 2222 χ 1, 2223 χ 2, 2150 ψ , 2268 ω . Les n^{os}. ajoutés sont: 1^o Le 2140 ρ , cité dans l'éd. des Aphorismes en grec et en latin, par le professeur Bosquillon. Paris, 1784.

2°. Le numéro 2316. σ. cité dans l'édition grecque et latine des Aphorismes, traduction de Lefebvre de Villebrune, Constantinople, 1779. 3°. Le 2261 τ; sous ce numéro on trouve quelques Aphorismes de la cinquième section. 4°. Le 269. υ. manuscrit acquis de la Bibliothèque de Venise, depuis 1796.

Le Catalogue annonce en outre , 1°. quatre manuscrits grecs des Aphorismes, avec les Commentaires de Philothée ou Théopile, sous les numéros 2146, 2149 déjà cités : plus les numéros 2228 φ. 1., 2296 φ. 2., et je puis ajouter le numéro 2257, k 3, où l'on trouve aussi quelques pensées de Galien. Les Commentaires de Théophile ont été traduits en latin avec les Aphor., par Corrado de Mantoue, et publiés à Spire en 1581. 2°. Deux manuscrits, cotés 2222 χ. 1. et 2223 χ. 2., aussi des Aphorismes d'Hippocrate, avec les Commentaires de Meletius. L'ouvrage de Meletius a été traduit par un auteur qui garde

l'anonyme ; mais il s'annonce pour être le neveu de Gentien Hervet, personnage du premier mérite qui accompagna le cardinal de Lorraine au concile de Trente. Cette version est dédiée au prince Henri III de Lorraine, abbé de St.-Denis, et neveu du cardinal. On sait qu'elle est de Piètre, originaire de la ville de Rheims. Ainsi on peut présumer qu'elle a pu être faite vers l'an 1639. Il y a eu aussi un Petreius de Corcyre qui a traduit Meletius, *de Structura hominis, etc.* Voyez Dictionnaire de Moreri, vol. 5^e. Il est assez difficile de déterminer d'une manière certaine, le temps où Meletius et Philothée ont existé, parce qu'il y a eu plusieurs auteurs du même nom. Néanmoins Fabricius rapporte l'époque à laquelle a vécu Philothée, qu'il croit être le même que Théophile ou Philaretès, au règne de l'empereur Héraclius, c'est-à-dire, au commencement du septième siècle. Le même Fabricius

rapporte un passage grec, à l'article de Joannicius, médecin arabe, du dixième siècle, où l'on voit Meletius porté sur la même ligne qu'Hippocrate et Galien. Effectivement les commentaires de Meletius, l'emportent sur ceux de Galien, et sont bien au-dessus de ceux de Théophile, et pour l'abondance du sujet, et pour la supériorité du style; mais quant aux trois premières sections seulement; car à commencer de la 4^e, il n'y a plus de différence entre les deux ouvrages qui sont exactement une copie l'un de l'autre. D'après les conséquences énoncées précédemment, on peut croire que Meletius est auteur du texte. On cite un Méléce, savant homme qui a vécu dans le 6^e siècle. Lefebvre de Villebrune dit aussi que Meletius est antérieur à Damascius, ce qui justifie ma conjecture. Ainsi Meletius pourrait avoir joui du titre d'archiâtre à la cour de Justin ou Justinien premier, qui a régné au commencement du sixième

siècle. (Voyez Dict. Hist. de Morer. , et tom. XIII , pag. 301 et 328 de la bibliothèque grecque de Fabricius.

3°. Un manuscrit coté 2150 ψ. , aussi des Aphorismes d'Hippocrate , avec les Commentaires de Damascius , comte des archiâtres à la cour de Justin ou Justilien II , qui a vécu dans le 6^e siècle.

4°. Un autre manuscrit coté 2268 ω. , aussi des Aphorismes d'Hippocrate , avec les Commentaires de Galien. Ce numéro a été indiqué par Haller , à l'article des Aphorismes , *Bibliothèque médicale*. Berne, 1786, t. I, p. 40. Au reste, ce manuscrit est très-peu lisible à la fin , et il est mutilé en beaucoup d'endroits où l'écriture est effacée entièrement. Le manuscrit numéro 1884 , porté sur le catalogue imprimé , donne aussi les Aphorismes avec les Commentaires de Galien , mais il est beaucoup plus moderne. La traduction latine , se trouve dans l'Articelle imprimée à Venise , en 1487.

Quant aux numéros 1848, 2545 et 2250, qui font partie des dix-huit manuscrits grecs annoncés par Haller, quoiqu'on trouve à la Bibliothèque ces manuscrits, sous les mêmes numéros, ils traitent de tout autre sujet que des Aphorismes.

Le manuscrit 2545 est l'ouvrage de Théodore Gaza. Ce savant grec est auteur de plusieurs ouvrages, notamment d'une traduction en latin des Aphorismes d'Hippocrate; mais le manuscrit que nous citons, traite des principes de Grammaire. On remarque dans le chapitre intitulé, *περὶ ὀρθογραφίας τῶν ληκτικῶν τῶν ῥημάτων*, c'est-à-dire, *sur la manière d'orthographier les syllabes finales des verbes*, de nombreuses divisions adaptées au sujet, qui sont indiquées numériquement par des lettres grecques, comme les Aphorismes dans beaucoup de manuscrits. Cette circonstance n'auroit-elle pas donné lieu à une inadvertance de la
part

part de ceux qui étoient chargés du soin de vérifier les manuscrits?

Tous les autres numéros des manuscrits rapportés par Haller, sont dans le catalogue. Le même article a été copié dans la dernière édition de la Bibliothèque grecque de Fabricius, Harles 1791; où on annonce par conséquent, les manusc. cotés 1848, 2545 et 2250, qui n'ont point rapport aux Aphorismes. Mais on remarque le num. 2140, manuscrit que le professeur Bosquillon a fait connoître comme un des meilleurs. Ce manuscrit est du xii^e. siècle, et est écrit sur papier de coton; quoiqu'il soit mutilé et défiguré en beaucoup d'endroits, il est précieux à consulter, parce qu'on y trouve d'anciennes leçons et de fréquens exemples d'ionismes. Le même manuscrit et le numéro 2142, sont cités par Lefebvre de Villebrune, Préface des Aphorismes, sous les lettres A et B, pour être de l'école d'Alexandrie. Je n'ai pas remarqué dans le

manuscrit côté 2142; aucune particularité qui méritât d'être citée : seulement il est moins correct et moins ancien d'un siècle que le manuscrit 2140.

Fabricius, ce savant critique, croyoit que si l'on parvenoit à se procurer des exemplaires grecs de l'école d'Alexandrie, on pourroit avoir le vrai texte d'Hippocrate. Lefebvre de Villebrune réfute victorieusement ce témoignage, par l'autorité de Galien, qui effectivement par ses grandes connoissances en médecine, étoit à même mieux que personne, de juger de la bonté de ces manuscrits; Galien assure donc les avoir trouvés remplis de fautes les plus grossières. On peut voir dans Cicéron, Strabon, Sénèque, les plaintes que faisoient les anciens au sujet de la négligence des copistes. Mais sans nous en rapporter à toutes ces autorités, il suffit de citer pour exemple; le manuscrit que Lefebvre de Villebrune a noté comme un des meilleurs. On y remarque des fautes

très-graves par la négligence des copistes. Ainsi, on lit d'une seule phrase ἐπὶ ὀστέανουσιν τις ἀρξὶς πελιδνὴ pour ἐπὶ ὀστέων νοσῶντι σὰρξ πελιδνὴ. Aph. 7, s. v.

Ἐν ὀσέρι φθείρεται τὸ σῶμα pour σπέρμα. Ἡ'ν ὀσέρη ἐν τῷ ἰσχύῳ ἐγκυημένη διαπνύσῃ pour ἐγκυημένη διαπνύσῃ. Aph. 47, s. v.

Ἡ'ν ὀσέρη ἐν τῷ ἰσχύῳ ἐγκυημένη διαπνύσῃ ἀνάγκη ἔμετον γένεσθαι pour ἔμμοτον et διαπνύσῃ.

Les numéros 2228 et 2149, manuscrits de Théophile, donnent le même Aphorisme, avec un sens tout aussi différent et qui feroit douter si c'est une erreur des copistes. Ἐν ὀσέρι ἐν τῷ ἰσχύῳ ἐγκυημένη διαπνύσῃ ἀνάγκη ἔμετον γένεσθαι, pour ἔμμοτον et διαπνύσῃ.

Ne s'agirait-il pas ici d'une affection symptomatique de l'utérus? On sait que les commentateurs se sont beaucoup exercés pour trouver le sens assez obscur de cet Aphorisme. Je sou mets cette question aux savans. Au reste, on s'aperçoit dans le Commentaire, qu'il fal-

loit ἔμμεστον et διαπυήση, ce qui prouve qu'il faut encore lire les Commentaires pour s'assurer du texte.

Les numéros 2258, 2259, 2330, manuscrits du ^{xvi}^e. siècle, donnent l'ancien texte : le numéro 2258 est désigné spécialement avec ce titre. En marge de la toute première feuille, on trouve le mot *νενεαγσίη*, expliqué par *τῶν αἰγείων κένωσις*, contre l'assertion de Lesebvre de Villebrune, qui prétend que les Grecs n'ont jamais employé *νενεαγσίη* pour désigner la vacuité du canal intestinal : *vox νενεαγσίη hic de intestinorum inanitate est accipiendâ cum Græcis, sed nunquam de venæ sectione, quæ ipsi est semper τομή vel τῶν φλεβῶν κένωσις. Voy. ses notes latines, Aph. 2, p. 12. On trouve dans le même manuscrit un rapprochement ou suite très-utile entre plusieurs Aphor. de la 3^e sect., tel qu'on voit dans l'ouvrage de Celse, dont les passages paralleles avec les Aphoris, et les Pronostics d'Ilippo-*

crate, sont cités au-dessous du grec dans l'édition de Henry Etienne, *Artis Medicæ principes*, fin du 2e. vol.

Le numéro 2228, manuscrit de Théophile, m'a offert une particularité qui n'avoit pas encore été remarquée. Dans la première partie, qui est de papier cotton et du xii^e siècle, on trouve la leçon qui donne le quarantième jour τεσσαρακοστή, Aph. 36, sect. iv. Dans la seconde partie, qui est sur parchemin et du xiv^e. siècle, le même Aph. est répété, mais la leçon que je viens de citer, ne s'y trouve point. Cette seconde partie commence à l'Aph. 22, sect. iv; et la première finit à l'Aph. 42 : ainsi, autant qu'on en peut juger, d'après la comparaison des vingt Aphorismes qui sont répétés dans la deuxième partie, on voit que ce manuscrit est la copie de deux textes différens : les variantes le prouvent. Le texte de la première partie est plus ancien et plus authentique que celui de la seconde. Cette leçon, où il

est fait mention du quarantième jour, est encore moins précieuse que celle des manuscrits cotés 2256 et 1297, qui donnent avec le quarantième jour, le trente-septième, au nombre des jours critiques cités dans l'Aphorisme 36, sect. iv.

Le premier manuscrit, qui paroît être du xv^e. siècle, est élégamment écrit et noté dans le catalogue, pour être de Pépagomène. On connoît un Démétrius Pépagomène, auteur d'un Traité sur la Goutte, qu'il composa par l'ordre de Michel III Paléologue, sur la fin du xiii^e siècle. Ce Traité a été publié plusieurs fois, entr'autres par Henri Etienne, *Medicæ Artis principes*, t. ij, Voy. Kurt Sprengel, partie ij, année 1800. Ce médecin a donné encore un Traité sur les Faucons, publié par Rigault, Paris, 1619. Ce n'est donc point ce Démétrius Pépagomène qui a copié le manuscrit dont il est ici question.

Le manus. coté 1297 pourroit passer

pour une copie du manus. 2256 ; il est plus moderne , et du xvi^e. siècle.

Le manuscrit coté 269, a été acquis de la Bibliothèque de Venise, depuis 1796 : il a appartenu à Morrelli , qui a lui-même écrit en marge quelques mots grecs. Ce manuscrit, qui est sur parchemin, a le plus grand rapport, pour l'écriture, avec la seconde partie du numéro 2228, qui est aussi sur parchemin, et que nous avons dit être du xiv^e. siècle.

Celui que nous citons , est un très-gros vol. in-fol., qui contient les OEuvres d'Hippocrate , à l'exception du Traité des Airs, des Eaux et des Climats ; lequel est joint aux Aphor. dans le manuscrit coté 2255, qui est du xv^e siècle ; l'écriture est fine , mais très-lisible. Ce traité se trouve encore dans un autre manuscrit : mais ce qu'il y a de bien remarquable , tous les manuscrits que j'ai vus , ceux même qui

sont les plus complets, l'omettent en entier.

Il suffit d'avoir indiqué ces généralités, pour pouvoir prendre soi-même connoissance des variantes que je joins ici aux Aphorismes. Mais quoique je les aie toutes recueillies, je ne donne que les leçons les plus importantes. Avant de terminer cette Dissertation par des renseignemens succincts sur l'état actuel des manuscrits, je dois donner les preuves authentiques de la bonté des leçons dont j'ai fait usage.

LES DEUX LEÇONS

DES MANUSCRITS,

PROUVÉES PAR L'AUTORITÉ

D'HIPPOCRATE.

VOULANT être très-concis dans mes preuves, je ne puis m'appuyer que de la seule autorité d'Hippocrate; elle suffit pour justifier le choix des deux leçons les plus importantes que j'ai adoptées dans mon édition : 1^o. pour l'Aphorisme 23, sect. 11, qui, par l'erreur des copistes, a été transféré de la deuxième section dans la septième, Aphorisme, num. 39, manuscrit coté 269.

Τὰ ὀξεία τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν ἡμέ-
ρησιν εἴκοσι.

« *Les fièvres aiguës sont jugées en 20 jours.* » Les manuscrits que l'on peut citer comme les meilleurs et les plus complets, répètent dans la septième section, l'Aph. 59 de la 1^{re}. *τριταῖος ἀκριῆς κρίνεται ἐν ἐπὶὰ περιόδοις τὸ μακρότατον.*

« *La fièvre tierce vraie, est jugée en sept accès au plus.* » Vient après l'Aph. 23 de la seconde section, texte de nos éditions.

Τὰ ὀξέα τῶν νευσημάτων κρίνεται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι. « *Les maladies aiguës sont jugées en quatorze jours.* » L'Aphor. qui suit est le numéro 37, sect. vii, texte de nos éditions. Κατάρροι ἐς τὴν ἄνω κοιλίην ἐκπυῶνται ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

« *Les catarrhes ou fluxions d'humeurs âcres, sur le ventre supérieur ou la poitrine, se terminent par coccition en vingt jours.* » On voit, sans qu'il soit besoin de l'indiquer, le rapport qui existe entre la fièvre tierce

vraie, *vernale* ou *inflammatoire*, et les phlegmasies, qui se terminent en quatorze jours, et le catarrhe de poitrine, qui est une maladie moins aiguë, qui se termine en vingt jours. Au contraire, l'Aphor. 23, sect. II, texte de nos éditions, qui annonce que les maladies aiguës sont jugées en quatorze jours, fait un contre-sens choquant avec l'Aph. 24 de la même section, dans lequel il est fait mention du *dix-septième jour*, qui est indicateur de la crise qui a lieu pour le *vingtième*. Sans citer les commentateurs grecs, tels que Meletius et Théophile; Prosper Alpin qui étoit un célèbre praticien, a admis, sans aucune restriction, que les maladies aiguës se terminent dans le terme absolu de vingt jours. *Morborum acutorum terminus est dies vigesimus*. Index libri de *præsagiendâ vitâ et morte ægrotantium*, pag. 418. Ici on s'aperçoit qu'il s'est déclaré pour le vingtième jour, préférablement au

quatorzième. Ὑποσκέπτεσθαι δὲ χρὴ εὐ-
 θέως τὰ περὶ τῆς ἀποστάσιος, ἣν· εἴκοσιν ἡμέ-
 ρας ὁ πυρετὸς ἔχων, ὑπερβάλλη. « Il faut
 conjecturer quelque abcès dans ceux qui
 sont attaqués d'une fièvre continue aus-
 sitôt qu'elle passe le vingtième jour. »

Pron. Foës. Texte 57. On a la preuve éga-
 lement dans le passage suivant, tiré aussi
 du livre des Prognostics, que la fièvre
 continue doit se terminer absolument
 dans 20 jours, et qu'il faut craindre la
 suppuration, si la fièvre passe ce terme.

Κεφαλῆς δὲ ὀδύнай ἰσχυραὶ τε καὶ ξυ-
 νεχέες ξὺν πυρετῷ ἦν μὲν τι τῶν θανατωδέων
 σημείων προσγίγνοιτο, ὀλέθριον κάρτα. εἰ δὲ
 ἄτερ τῶν τοιούτων σημείων ἡ ὀδύνη ὑπερβάλ-
 λοι εἴκοσιν ἡμέρας ὁ, τε πυρετὸς ἔχοι, ὑποσ-
 κέπτεσθαι χρὴ αἵματος ῥῆξιν διὰ ῥινῶν, ἢ
 ἄλλην τινὰ ἀπόσασιν, ἐς τὰ κάτω χωρία.

« Les douleurs violentes de la tête et
 continues avec fièvre, s'il s'y joint d'ail-
 leurs quelques autres signes mortels,
 sont très-funestes. Mais si sans l'exis-
 tence d'aucun de ces signes, la dou-

leur se soutient au-delà de vingt jours , il faut s'attendre à une hémorrhagie du nez ou à quelques abcès vers les parties inférieures. » Prognost. Texte 68. L'autorité de cette citation , est pleinement justifiée par le manuscrit coté 2143 , où le passage que je viens de rapporter est intitulé : *περὶ πυρετῶν*.

On ne peut douter effectivement qu'il ne soit question ici d'une fièvre aiguë essentielle et continue , durant laquelle il survient une céphalalgie plus ou moins violente , et d'autres symptômes funestes ; car la douleur de tête qui accompagne la phrénésie , qui est une phlegmasie essentielle et une maladie très-aiguë , *κρόζον* , donne la mort le 7^e jour ou auparavant. Hippocrate a déclaré que les maladies aiguës se terminent en quatorze jours. Lorsqu'il fait mention des tumeurs des hypocondres , et qu'il annonce la suppuration dans le terme de vingt jours , il faut savoir également que cela a rapport aux fièvres continues ;

car de même que pour les douleurs de tête, il commence par annoncer les bons et mauvais signes, concernant l'état des hypochondres, et il dit au sujet de l'enflure et de la tension à laquelle il faisait tant d'attention dans les fièvres continues : Οἴδημα δὲ ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ σκληρόν τε εὖν καὶ ἐπώδυνον, κάκιστον μὲν, εἰ πᾶρ ἅπαν εἴη τὸ ὑποχόνδριον. εἰ δὲ εἴη ἐν τῷ ἑτέρῳ μέρει, ἀκινδυνότερόν ἐστιν ἢ ἐν τῷ ἐπ' ἀριστερά. σημαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ἐν ἀρχῇ μὲν θάνατον ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι. ἢν δὲ ὑπερβάλλῃ εἴκοσιν ἡμέρας ὁ, τε πυρετὸς ἔχων καὶ τὸ οἴδημα μὴ καθιστάμενον, ἐς διαπύξιν τρέπεται.

« Si l'enflure de l'hypocondre est dure et douloureuse, c'est un très-grand mal, surtout si elle entreprend toute la région de l'hypocondre; mais si elle a lieu dans l'un des côtés seulement, il y a moins de danger, surtout pour la partie gauche. De semblables tumeurs dans le commencement de la maladie, indiquent une mort très-prochaine;

mais si la fièvre qui ne quitte point le malade, passe vingt jours, et que l'enflure ne se dissipe point, la tumeur prend la voie de la suppuration.» Prognost. Texte. 18.

On voit donc que le terme de vingt jours qu'Hippocrate désigne dans l'Aphorisme 23, sect. 11, sous le num. 39 du manuscrit coté 269, concerne spécialement les fièvres continues; et que l'Aph. 23, sect. 11, texte de nos éditions, qui annonce que les maladies aiguës sont jugées en quatorze jours, a rapport exclusivement aux phlegmasies essentielles. Les Aphorismes 23 et 24, sect. 11, sont réunis dans tous les manuscrits. Ceux qui sont les meilleurs et les plus complets, répètent dans la septième section, l'Aphorisme 23 de la deuxième, lequel appartient effectivement à la septième; mais il falloit une leçon qui prouvât authenti-

quement que ce sont deux Aphorismes différens.

Foës remarque dans son *Æconomia*, *Hipp. breves notæ in S. II*, pag. 363, que l'Aphorisme 23 est répété dans les Prénotions de Cos; mais qu'il se trouve aussi dans le livre des Crises, avec cette addition, *ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Ut plurimum*. Quelques manuscrits ajoutent de même, à la fin de l'Aphorisme, *ὡς μακρότατον. Ad summum, quam lectionem ad Vaticanas etiam membranas permanasse ex calvo satis patet*.

C'est une première preuve que ce sont deux Aphorismes différens dont il s'agit. En effet on trouve dans le manuscrit coté 269, le 20^e jour, qu'il rapporte à l'Aphorisme 39 de la septième section.

Τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν εἴκοσιν ἡμέρησιν. In diebus viginti.

Cette leçon est la véritable; elle met

en toute évidence, l'erreur des copistes, suivant laquelle l'Aphorisme a été transporté dans la 7^e section ; et la répétition uniforme du n^o. 23 de la 2^e section , dans tous les manuscrits , vient à l'appui de cette valable et dernière preuve.

En effet, dans le manuscrit que je viens de citer, en admettant la simple transposition de l'Aph. 39 de la 7^e section , au n^o. 23 de la seconde , on rétablit un Aphorisme qui n'a jamais été connu dans nos éditions, et qui naturellement se trouve lié à l'Aph. 24 ; dont on voit clairement le but ; tandis que l'un et l'autre Aphor. dans le texte vulgaire , font absolument un contre-sens. Suivant la même leçon, l'Aph. 23, sect. II du manuscrit et de nos éditions, transporté de la deuxième section dans la septième, avec l'Aph. 59, sect. IV, selon les manuscrits, est la preuve que le genre de la maladie dont il est particulièrement fait mention , a rapport exclusivement aux phlegmasies essen-

tielles, qui sont des maladies aiguës, dont le terme ordinaire est de 14 jours, tandis que l'Aphorisme que je rétablis dans la deuxième section, concerne spécialement les fièvres aiguës, dont la durée commune est de vingt jours. Comme je l'ai annoncé, les numéros 23 et 24, sect. II, sont réunis dans tous les manuscrits; or, quel sens trouver dans une sentence annonçant qu'il faut remarquer le 17^e jour qui précède la crise, pour le 20^e, tandis qu'on a lu auparavant, que des maladies aiguës sont jugées en *quatorze* jours.

Ceci suffiroit déjà pour autoriser la leçon du manuscrit; mais comme pour corriger un texte il faut avoir d'autres preuves que des conjectures, quelque heureuses qu'elles soient, je ferai parler Hippocrate. Il nous donnera lui-même l'explication des Aph. 23 et 24 de la deuxième section, et nous verrons effectivement qu'il les a réunis: seulement au lieu des jours critiques, il fait

mention selon le même ordre numérique, des périodes des fièvres aiguës, dont il détermine lui-même la durée dans 20 jours.

Οἱ τε γὰρ εὐηθέστατοι τῶν πυρετῶν, καὶ ἐπὶ σημείων ἀσφαλεστάτων βεβῶτες, τεταρταῖοι παύονται, ἢ πρόσθεν· οἱ τε κακοηθέστατοι, καὶ ἐπὶ σημείων δεινοτάτων γινόμενοι, τεταρταῖοι, κτείνουσιν ἢ πρόσθεν. ἡ μὲν ἔν πρώτῃ ἔφοδος αὐτίων εὖτω τελευτᾷ· ἡ δὲ δευτέρη, ἐς τὴν ἐβδόμην περιάγεται· ἡ δὲ τρίτη, ἐς τὴν ἐνδεκάτην· ἡ δὲ τετάρτη, ἐς τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην· ἡ δὲ πέμπτη, ἐς τὴν ἑπτα καὶ δέκατην· ἡ δὲ ἕκτη, ἐς τὴν εἰκοσὴν· αὗται μὲν ἔν ἐκ τῶν ὀξυτάτων νοσήματων διὰ τεσσάρων εἰς τὰς εἰκοσιν, ἐκ προσθέτιος τελευτῶσιν.

Traduction.

Les fièvres du meilleur caractère et dont le cours est accompagné des signes les plus avantageux, cessent le quatrième jour ou auparavant ; mais celles dont le caractère est le plus mauvais,

et qui sont accompagnées des signes les plus dangereux, donnent la mort le quatrième jour, ou auparavant. C'est donc ainsi que se termine la première période de l'invasion des fièvres. La seconde se prolonge jusqu'au sept; la troisième jusqu'au onze; la quatrième jusqu'au quatorze; le cinquième jusqu'au dix-sept; la sixième jusqu'au vingt. Ainsi les périodes des maladies les plus aiguës (des fièvres), se terminent au vingt, en croissant par nombre quaternaire. Progn. Texte 51. Ce même ordre se continue jusqu'au 40^e jour; après quoi les maladies se terminent plutôt par des abcès ou des apostases, que par de véritables crises: et les jugemens n'ont plus lieu que de vingt en vingt jours, à raison de la foiblesse des organes, jusqu'au 120^e inclusivement. Ce terme passé, il ne faut plus compter que par mois et ensuite par années.

Il résulte des observations, que lorsque dans les jours indicateurs, il se

manifeste des signes de coction, la maladie se juge communément le jour critique qui suit, et *vice versâ*; lorsque ces signes paroissent un jour critique, la maladie se termine fréquemment le jour indicateur suivant. Ces phénomènes se remarquent dans les maladies non compliquées d'affection gastrique, jusqu'au 40^e jour, avec cette différence que la troisième et la sixième période septenaires commencent le même jour de la période septenaire antécédente, c'est-à-dire, le quatorzième jour et le trente-quatrième. (Tortelle, Elémens de médecine pratique, tom. 1, p. 118.) Ainsi le vingtième jour est indicateur du vingt-septième qui annonce le trente-quatrième; et celui-ci le quarantième. Il ne devoit donc y avoir que ces trois termes d'exprimés dans l'Aph. 36, sect. iv, s'il étoit vrai, que passé le vingtième jour, on ne dût plus compter que par période septenaire. Au contraire, dans le texte de nos

éditions , Aph. 36, sect. iv, on voit qu'il est fait mention du vingt et unième jour, pour la crise qui a lieu le vingt-septième, mais laquelle peut aller au trente et unième, au trente-quatrième, au trente-septième et au quarantième. Le vingt-quatrième est omis dans ce nombre , quoiqu'il fasse essentiellement partie des jours critiques ; et on cite le vingt et unième , qui n'est ni indicateur, ni critique , qui , au contraire, est compté au nombre des jours vides , ou intercalaires, c'est-à-dire , ceux dans lesquels il n'arrive rien, ou de mauvaises crises.

Le vingtième jour, comme je l'ai prouvé précédemment, est essentiellement critique. Hippocrate a observé, seize crises arrivées le vingtième jour : dix furent heureuses , une incomplète , et cinq mauvaises. Il ne parle que d'une seule arrivée au vingt et unième jour , et qui fut perniciieuse. Le vingtième, lorsqu'il n'est pas critique, est indicateur du vingt-quatrième ; et ce dernier,

lorsqu'il n'est pas critique, est indicateur du vingt-septième, et successivement les autres jours se comptent par période quaternaire jusqu'au quarantième. Nous avons ajouté que lorsque la fièvre passoit le quarantième jour, elle pouvoit aller au soixantième, au quatre-vingtième, au centième, et au cent-vingtième, qui sont tous des multiples du vingtième; et il est le seul qui jouisse de cette prérogative; les multiples des autres jours ne sont point décroîtaires. Mais, ainsi que l'observe Hippocrate, lorsque la fièvre passe quarante jours, elle s'éloigne de plus en plus du type de continue, elle a des rémissions, puis des intermissions, et se change par apostase, en fièvre quarte, qui peut durer ensuite des mois, un an et plus.

Ces remarques sont le fruit de l'observation du vieillard de Cos; il les a consignées dans les histoires des maladies qu'il rapporte dans le 1^{er} et le 3^e livres des Epidémiques. Il a vu les ma-

lades, et il a été témoin des différens genres de crises, soit pour la santé, soit pour la mort. Par le mot crise, il faut entendre le jugement de la maladie, d'après des évacuations quelconques, opérées par l'art ou par la nature, et à la suite desquelles la maladie change constamment, et se termine en tout ou en partie. L'homme qui demouroit dans le jardin de Déalcés est jugé par les sueurs le 40^e jour; Chérion est jugé par les sueurs le 20^e; Nicodème d'Abdère est jugé le 24^e; Anaxion éprouva des sueurs critiques le 27^e. Il sua de nouveau, et il fut jugé complètement le 34^e. Hermippus le Clazoménien eut un mouvement de crise le 31^e jour pour le 34^e. Cléanactide, après le 40^e jour, éprouva de la rémission; le 60^e jour la fièvre eut des intermissions, et elle fut jugée complètement le 80^e. Hérophite éprouva de la rémission le 80^e jour; le 100^e la fièvre fut jugée complètement. Enfin le fils de Parion meurt le 120^e jour. Ces

observations sont puisées dans les liv. 1^{er} et 3^e des Epidémiques.

Je me borne à rappeler des faits irrécusables servant tous à prouver que les Aphorismes sont le corollaire des livres historiques : de telles autorités, suffisent pour constater l'authenticité des leçons des manuscrits, et pour rétablir suivant la doctrine d'Hippocrate, les jours indicateurs et critiques qui sont récapitulés dans l'Aph. 36, sect. iv. Certains manuscrits, notamment ceux de Théophile, suivent pour cet Aphorisme l'ordre des jours critiques impairs qui, dans le 1^{er} liv. des Épidémiques, sont le 3^e jour, le 5^e, le 7^e, le 11^e, le 17^e, le 21^e, le 27^e et le 31^e. Hippocrate admet également dans ses Prognostics, le 3^e jour, le 5^e, le 7^e, le 9^e, le 11^e et le 14^e, et il en donne l'explication suivante. « Si la douleur commence le 1^{er} jour, et qu'elle augmente surtout le 4^e, la maladie est jugée le 7^e. Communément, lors-

que la douleur commence le 3^e, et qu'elle augmente le 5^e, elle finit le 9^e ou le 11^e jour : si au contraire elle commence le 5^e, et que d'ailleurs il s'y joigne d'autres symptômes favorables , la maladie finit le 14^e. » Liv. des Prognost. Foës. Texte 78. Il n'est pas difficile de prouver encore par le témoignage d'Hippocrate, Aph. 64 et 71, sect. iv, que la douleur étant l'accident le plus urgent de la fièvre, est citée ici pour la fièvre elle-même : « ceux dont la maladie doit se terminer le 7^e jour, rendent au 4^e. une urine rougeâtre , etc. ; l'ictère qui survient dans la fièvre le 7^e. le 9^e. le 11^e jour ou le 14^e, est un bon signe. » Passé cette époque , la maladie est moins aiguë, et on ne compte plus que par période quaternaire. Le 14^e est indicateur du 17^e, qui annonce la crise pour le 20^e ; puis le 24^e, pour le 27^e et successivement jusqu'au 40^e jour ; tandis que dans l'Aph. 36, sect. iv, on cite le 21^e, puis le 27^e, le 31^e et le 34^e ;

conséquemment il y manque encore le 24^e. Au lieu du 21^e, il faut le 20^e, et ajouter, d'après les conséquences énoncées précédemment, le 37^e jour et le 40^e, qui complètent l'Aphorisme.

Le manuscrit 2228, première partie, et la seconde, Aph. 36, sect. iv, donnent le 20^e jour. *είκοσι* au lieu du 21^e; puis le 27^e et le 31^e. Corrado a lu sur son manuscrit le 34^e; mais ce jour manque dans les manuscrits de Philothée. Le même manuscrit, coté 2228, première partie, ajoute au 31^e, le 40^e *τεσσαρακοστῇ*. On ne trouve point cette leçon dans la seconde partie, où le même Aphorisme est répété.

Les manuscrits 2256 et 1297 ajoutent au 34^e jour, *καὶ τριακοστοὶ ἐξόδοι καὶ τεσσαρακοστοὶ*, c'est-à-dire, le 37^e et le 40^e. Cette leçon ne se trouve que dans ces deux manuscrits. Enfin le manuscrit n^o. 2222 de Meletius, donne au nombre des jours critiques *τετάρτῃ καὶ εἰκοσῇ*, le 24^e. Avec ces

preuves il m'a été facile de rétablir le texte de l'Aphor. en entier : car le 20^e, lorsqu'il n'est pas critique, est indicateur du 24^e; vient après le 27^e, puis le 31^e, puis le 34^e, le 37^e et le 40^e. Je ne dirai pas, avec Prosper Alpin, que Galien a estimé approximativement le 20^e jour et le 40^e comme étant les deux termes communs des maladies aiguës. J'ai déjà prouvé que le 20^e jour étoit le temps qu'Hippocrate avoit fixé pour les fièvres aiguës; et que la durée de 14 jours a rapport exclusivement aux maladies aiguës ou phlegmasies.

Maintenant il s'agit de fixer un terme pour toutes les maladies aiguës en général : Hippocrate le porte à 40 jours, pour que la maladie se termine complètement par coction, lors même que l'inflammation est aiguë, ainsi que cela est exprimé dans l'Aph. 49, s. v. « Les attaques inflammatoires de goutte se dissipent par résolution ou *détumes-*

cence , en *quarante jours* : le terme de 40 jours est absolu ; et lorsqu'une maladie aiguë ne se termine point par une véritable crise , soit le *quatorze* ou le *vingt* , on voit survenir des abcès , qui ne sont pas toujours critiques ; car la pleurésie qui ne s'est point terminée par les crachats en 14 jours , se change par apostase dans l'empyème ; et encore que cette dernière affection ne soit pas essentiellement aiguë , comme elle se juge aussi par une évacuation critique ; le terme de la guérison est fixé encore à 40 jours. « Ceux, dit Hippocrate , qui sont attaqués de la pleurésie , et qui ne sont point purgés du pus par les crachats en 40 jours , la maladie se change en phthisie. »

On voit ainsi , que passé le 40^e jour , la maladie qui est aiguë par *décadence* , *ἐν πεντηκάτῳ* se change en chronique ; mais que pendant les 40 jours , elle peut se terminer à l'aide des évacuations critiques , telles que l'hémorra-

gie du nez, les sueurs, les crachats, les selles, le vomissement : c'est pourquoi Hippocrate a dit au sujet des maladies aiguës en général. Εὐπνοίαν δὲ χρὴ νομίζειν κάρτα μεγάλην δύναμιν ἔχειν εἰς σωτηρίην ἐν ἅπασι τοῖσιν ὁξέσιν νοσήμασιν ὅσα ζὺν πυρετοῖσιν ἐσσι καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρησιν κρίνεται.

« Il faut regarder la respiration facile comme ayant un très-grand pouvoir pour la certitude de la guérison de toutes les maladies aiguës, et de celles qui sont avec fièvre, et qui se terminent en 40 jours. » Progn. Texte 17. Je n'insisterai pas davantage sur l'authenticité de cette leçon. Les jours critiques n'ont pas été imaginés par Hippocrate ; c'est la nature elle-même, qui, plus agissante dans les maladies aiguës, telles que les fièvres continues, qui sont un genre particulier de maladie, suscite dans un ordre périodique certains mouvemens réguliers, suivant lesquels elle opère la coction

de l'humeur morbifique , détruit le spasme , et guérit la maladie. Dans les fièvres continues , il peut y avoir un ou deux paroxysmes ou redoublemens , dans le même jour ; ou seulement il n'y a que des accès périodiques , comme dans les fièvres intermittentes : ici la nature est moins active. On sait que la fièvre tierce fait éprouver des accès alternativement tous les deux jours ; et que, si les accès se prolongent , la maladie se change en fièvre continue rémittente-tierce ; donc il y a des jours impairs. Dans la fièvre quarte , dont les accès ont lieu tous les quatre jours , en y comprenant deux jours d'intermission, celui de l'accès fini et celui qui recommence ; si pendant ces deux jours la fièvre augmente , et que les accès se prolongent , elle devient fièvre double-quarte ; donc les accès ont lieu tous les jours pairs. Le type de tierce appartient particulièrement à la bile , et le type de quarte à l'atrabile ; le type quotidien à

la pituite , d'après les anciens médecins. Les maladies de la 2^e constitution des épidémiques d'Hippocrate étoit de nature pituiteuse ; et les ardentes de la 3^e constitution , étoient de nature bilieuse. L'observation des jours critiques me semble donc prouvée par ces deux circonstances.

Septième Section.

Les manuscrits donnent les Aphorismes que j'ai ajoutés et qui sont tous marqués d'un astérisque. Je n'ai pas voulu changer l'ordre des numéros , afin de ne pas apporter de confusion dans la citation des Aphorismes. Ceux que j'ai pris dans les manuscrits comme tous ceux qui sont répétés dans la septième section, et qui sont empruntés des sections précédentes , sont néanmoins utiles , parce qu'ils servent le plus souvent à rendre plus clair le sens de l'Aphorisme , soit à cause du sujet qui précède

précède ou qui suit, soit à cause de la phrase elle-même, qui est ainsi rendue plus complète. Mais une question qu'il n'est pas indifférent de traiter, c'est relativement à la prétendue liberté qu'on a d'admettre ou de ne pas admettre *κατόν* à la suite de plusieurs aphorismes de cette section: j'en citerai que les sentences les plus remarquables. Quelques manuscrits suppriment le mot *κατόν* à la suite de plusieurs Aphorismes, ou le retranchent tout-à-fait; d'autres manuscrits le répètent pour tous les Aphorismes, depuis la septième section jusqu'au numéro 27. Il n'y a que la pratique seule qui puisse éclairer sur cette question, dont la solution n'est point, comme on pourroit le croire, soumise entièrement à la volonté et à l'opinion.

Le manuscrit coté 2255, dont le texte est le même que celui de nos imprimés, passe *κατόν*. Il s'agit ici des signes prognostics: et si on retranche ce

mot, n'est-ce pas ôter à l'Aphorisme tout l'intérêt qu'il peut avoir?

Le manuscrit 2228 ajoute κακόν, et les manuscrits 2256, 2149, 2143, omettent ce mot particulièrement à la fin des Aphor. 15 et 16, qui sont ainsi presque toujours réunis, dans la plupart des manuscrits. Quant à l'Aphor. 24, tous les imprimés suppriment κακόν, qui vaut souvent, comme ici, ὀλέθριον καρτὰ et θανατωδεις; et ailleurs, ἐπικινδύον, ce qui assurément ne peut être rendu en latin par *malum*. L'Aph. que je cite est incomplet, si on n'y ajoute pas le mot κακόν. En effet, Hippocrate, après avoir annoncé précédemment, Aph. 14, sect. vii, que la stupeur ou le délire occasionné par une plaie de tête, est un mauvais signe; il confirme la vérité de son pronostic, par l'Aph. 24, qui est ainsi conçu : « dans la diacope du crâne, la stupeur ou le délire, si la blessure est pénétrante : on s'attend bien que l'Aph. ne se termine pas là; aussi

les manuscrits cotés 2228 et 2149, ajoutent θανατῶδες, c'est-à-dire, un *signe mortel*, en sous-entendant le mot σημείον *signum*; on en a la preuve par les manuscrits, comme dans l'exemple suivant, Aph. 2, sect. viii: ὁκόσοισι δὲ ἄνευ προαιρέσεως (οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύουσιν, κακόν (σημεῖον 36, 2184), et au lieu de κακόν, πονηρόν 269.

« Aph. 15 et 16, après le crachement de sang, le crachement de pus; après le crachement de pus, la phthisie et la diarrhée; dès que les crachats sont arrêtés, les malades meurent. » (*Traduct. française de Lefebvre de Villebrune.*)

Cette interprétation n'est point exacte ni celle du numéro 78, quoiqu'elle soit conforme à nos éditions, car si on reconnoît pour l'Aph. 15 qu'il faut y ajouter le mot κακόν; il en sera de même pour l'Aph. 16 et 78, en voici les preuves.

La phthisie peut être accidentelle, et alors elle succède effectivement au crachement ou au vomissement de sang;

mais cela n'arrive pas toujours. Il y a plus ; quelques personnes , même se portant bien , crachent du sang , et elles éprouvent du soulagement de cette évacuation. Chez les hémorrhoidaires et les femmes dont le flux sanguin est supprimé , cela est plus manifeste. En employant la saignée du bras et surtout les sangsues , soit à la vulve , soit à l'anüs , pour suppléer au flux hémorrhoidal et au flux menstruel supprimés , on peut espérer d'arrêter le crachement de sang. Mais la cure n'est jamais radicale , tant que l'évacuation naturelle n'est point entièrement rétablie , ou qu'elle ne se fait point en quantité relative aux forces et au tempérament. Si une cause telle que la grossesse , l'époque de la cessation des menstrues se joint à des dispositions individuelles , telles qu'une constitution délicate , une poitrine étroite ; il est à craindre que le crachement de sang ne soit suivi du crachement de pus et de la phthisie ; sans ces circons-

tances , on peut espérer la guérison , et elle peut être radicale , quand le crachement de sang ne dépend que de la pléthore sanguine accidentelle. Il en est ainsi pour le vomissement de sang , mais celui-ci peut survenir chez les personnes les plus robustes ; être accompagné de fièvre , et alors il est excessivement dangereux. Les saignées du bras doivent être multipliées ; enfin on emploie les rafraîchissans , et les astringens , comme le conseille Hippocrate , Aph. 37 , sect. VII ; *Ἑραπεύειν δὲ τοῖσι ψυχρικοῖσι , καὶ τοῖσι συλητικοῖσι.*

J'ai vu un homme bien constitué , jouissant d'une bonne santé , qui sans cause connue , vomit plus de cinq livres de sang en moins de quelques heures. J'arrêtai le vomissement par de fortes saignées du bras. Je conseillai au malade de se faire saigner aussitôt qu'il sentiroit une petite toux avec irritation au bas du larynx , (ce qui est le signe ordinaire du crachement et du vomis-

sement de sang, provenant du poumon.) Le malade jouissant d'une bonne santé, s'absenta pendant quatre ans. Il éprouva deux fois un léger crachement de sang. Il négligea de se faire saigner; enfin il ne fut plus possible d'arrêter les progrès du mal. La poitrine devint malade, les crachats furent épais et purulens; l'hydropisie ascite survint, et le malade mourut avec une émaciation si extrême de la poitrine et de toute la partie supérieure du tronc, que la peau même sembloit avoir fait place aux os.

J'ai vu un autre vomissement de sang être occasionné par une chute de tout le corps, d'un lieu élevé. J'obtins une guérison complète, à l'aide de plusieurs saignées du bras. Il est certain qu'on peut guérir le vomissement de sang, à plus forte raison le crachement de sang est-il curable. J'ai vu un homme bien constitué, d'un bon tempérament, qui éprouva, un crache-

ment de sang occasionné par la pléthore sanguine; je le guéris par la saignée du bras.

Il est indubitable qu'on guérit en pareille circonstance le crachement de sang, sans qu'il y ait la moindre crainte de phthisie pulmonaire; lorsqu'au contraire le crachement de sang survient, et que la poitrine est affectée d'une toux violente et sonore, avec des crachats très-épais, qu'il s'y joint une fièvre habituelle, des sueurs considérables, et la diarrhée; on peut regarder alors que la phthisie est déclarée; soit qu'elle soit occasionnée par la répercussion de la sueur, ou d'une humeur quelconque, supprimée ou arrêtée fortuitement, à dessein, ou autrement; le crachement de sang, qui survient dans cet état de la maladie, est absolument incurable, de même que dans la phthisie, qui est primitive, originaire ou essentielle. Et dans le cas contraire, comme j'en ai cité l'exemple, on peut guérir le crachement,

et le vomissement de' sang; donc il faut ajouter aux Aph. 15 et 16, et au premier paragraphe de l'Aphor. 78, le mot *κακόν*, parce que dans ces Aphorismes, il est fait mention seulement de la possibilité de la phthisie, ainsi que pour la vomique du poumon, comme cela est prouvé par l'Aph. 15, sect. v. Si dans quarante jours la matière s'évacue par les crachats, la maladie guérit: donc il n'arrive pas toutes les fois qu'on crache du pus, qu'on est attaqué de la phthisie; donc il faut le mot *κακόν*.

Je conclus enfin pour les Aphor. 15 et 16, et le commencement du n^o. 78, qu'Hippocrate a désigné les accidens qui peuvent donner lieu à la phthisie; tandis que dans la presque totalité de l'Aphor. 78, il a décrit les progrès de la maladie à son dernier degré: partant il y a encore eu ici erreur des copistes; et voici comme je conçois que l'on peut rétablir le texte. La première partie du paragraphe du n^o 78 donne

un Aphorisme, lequel doit être placé avant le n° 15, dont celui-ci est la suite; le n° 16 donne deux Aphorismes qui dépendent des deux premiers : enfin, j'unis les deux paragraphes du n° 78, pour un seul Aphorisme. J'évite ainsi les redites et la confusion que l'on trouve dans la rédaction de l'Aphorisme 78.

1. Εἰς αἵματος ἑμέτω, αἵματος πύσις (κακόν).

2. Εἰς αἵματος πύσει πύς πύσις κακόν.

3. Εἰς πύς πύσει φθίσις καὶ ρύσις κακόν.

4. Εἰς πύς πύσει φθίσις καὶ ρύσις κακόν.

N°. 78. Εἰς αἵματος πύσει, πύς πύσις, καὶ ρύσις, καὶ φθίσις, καὶ τῶ πύς κάταρσις ἀνω. Εἰς φθίσις ρεύμα ἐκ τῆς κεφαλῆς. Εἰς τῶ ρεύματι διάρροια. Εἰς διάρροια σχέσις τῆς ἀνω καθάρσιος. Εἰς τῇ σχέσει θάνατος.

1. Si l'hémoptysie succède au vomissement de sang, c'est un mauvais signe.

2. Si le crachement de sang est suivi du crachement de pus, c'est un mauvais signe.

3. Dans le crachement de pus , lorsqu'il survient la phthisie et la diarrhée , c'est un mauvais signe.

4. Si les crachats s'arrêtent , les malades meurent.

Nº. 78. Au crachement de sang succède le crachement purulent , la diarrhée , la phthisie , l'expectoration du pus.

Dans la phthisie , il survient la chute des cheveux , la diarrhée abondante , la suppression des crachats ; et cette suppression est suivie de la mort.

Relativement au nombre des Aphorismes contenus dans la septième section , on trouve une différence remarquable dans les manuscrits ; ceux de Théophile , tels que le nº. 2228 , 2^e partie , 2146 et 2296 , termine la 7^e section à l'Aphor 59 ; le 2149 finit à l'Aph. 60 , et le 2257 à l'Aphorisme 61. Là se terminent aussi les Aphorismes dans les manuscrits cotés 2222 et 2223 de Meletius , et 2150 de Damascius.

Le manuscrit coté 2219 ne va que jusqu'à l'Aph. 35; mais ce manuscrit est-il complet? Quatre feuilles manquent au commencement, et il est probable qu'elles contenoient la première section et la deuxième jusqu'à l'Aph. 35, où commence le manuscrit. Le n^o. 2316 finit à l'Aph. 8, sect. v; les commentaires manquent depuis la 4^e sect. Ne seroit-ce pas ce qui nous reste de Pélopos, dit Lefebvre de Villebrune? Le n^o. 2260 ne donne que la première section avec un commentaire; le n^o. 2596 finit à l'Aph. 11, aussi de la première section : enfin le n^o. 2261 ne donne que quelques fragmens concernant une douzaine environ d'Aphorismos de la 5^e sect. Mais les manuscrits qui sont les plus complets, tels que les nos. 2140, 36, 2144, 2145, 2143, 2141, 2256, 2258, 2259, 269, 2255, portent tous le nombre des Aphorismes contenus dans la 7^e section à 85. Cela provient de ce qu'on a pris les six pre-

miers Aphorismes de la 8^e sect., pour ajouter aux 79 de la 7^e, ce qui a été suivi particulièrement dans l'édition des Aldes, de Froben, de Foës.

Il est à remarquer dans la Bibliothèque grecque de Fabricius, Harles, 1791, vol. 2, pag. 538, qu'on a cité le manuscrit 2144, pour la 8^e section, laquelle je puis affirmer n'exister dans aucun manuscrit. C'est donc bien gratuitement qu'on paroît refuser à Musa Brassavolo, le mérite de la découverte de cette section, qu'il déclare avoir mise au jour le premier, pages 1138 et 1139 de ses Commentaires sur les huit sections des Aphorismes, vol. in-fol., Basle, 1541.

On cite de même le manuscrit coté 2254, comme ayant rapport aux Aphorismes; ce qui est encore inexact. Une telle méprise vient de ce qu'on n'a pas fait attention que le professeur Bosquillon, n'a cité ce manuscrit, comme le meilleur, que relativement aux pré-

notions de Cos ; car on n'y trouve ni les Prognostics , ni les Aphorismes ; mais seulement le 1^{er}. et le 2^e. livres des Prorrhétiques ; les Prénotions avec d'autres petits Traités , et les sept livres des Epidémiques , qui sont indiqués à la fin du manuscrit. Je ne dirai pas qu'on s'est trompé sur beaucoup d'autres manuscrits rapportés dans cette édition , notamment au sujet du n^o. 2144 , qui est cité pour donner la 8^e. section. Que veut-on dire , lorsqu'on assure encore que le manuscrit 2142 donne des leçons , ajoutées par un grec moderne , et qu'on ne trouve que dans ce manuscrit. On a voulu sûrement parler du manuscrit précédent , où on lit un commentaire marginal seulement pour les deux premières sections ; car pour la troisième , il finit à l'Aphorisme 17.

On trouve encore çà et là quelques mots ajoutés indolitairement dans le texte , mais cela n'a rien de bien im-

portant, et qui soit digne d'être remarqué.

TRADUCTIONS.

Les premières traductions qui ont été faites à la cour des Califes, soit en syriaque, soit en arabe, soit en hébreu, ne peuvent avoir tout le mérite qu'on leur avoit supposé, comme le remarque très-judicieusement le savant Renaudot, qui a dit à ce sujet : *Tanta vero fuit interpretum istorum sive ignorantia, sive negligentia, ut si quis veterum Avicennæ versionem cum fonte conferat, vix agnoscat auctorem, nedum in aliis scriptoribus.* Voyez son Epître, adressée à M. André Dacier, *Bibl. grec. de Fabric.*, tom. 1, pag. 861.

On cite comme la version la plus ancienne, celle qui fut faite en syriaque, par un moine Arménien, nommé Sergius, lequel a vécu dans le 7^e siècle. On croit assez généralement que les

premières traductions qui suivirent , furent copiées sur cette version qui est très-imparfaite. Ben-Abisadek, fils d'Abou-Sadek , médecin arabe, a publié des Commentaires sur les Aphor. ; mais la traduction que l'on cite comme la plus fameuse , est celle d'Honain, fils d'Is-hak. On prétend qu'il fut aidé par son fils Ishak-ben-Honain ; et par son neveu Hobaisch. Honain fut médecin du Calife Motawakkel , l'an de l'hégire 232 , de J. C. 847. Voyez Bibliot. Orient. d'Herbelot , pag. 453 et 457.

Le sentiment de Renaudot est, qu'Honain a traduit d'après Sergius ; c'est aussi l'avis de M. Freind.

Michel Casiri, auteur de la Bibliothèque arabe-espagnole, de l'Escorial , Madrid, 1760, in-fol. , pag. 238 , accuse hautement Renaudot, d'ignorer les langues orientales, et particulièrement l'arabe ; et il soutient que la version d'Honain ne doit sa supériorité, que parce qu'elle a été faite sur le grec.

Il ajoute pour preuve de son assertion, que plusieurs Traités de Galien ont été publiés d'après cette version, laquelle, dit-il, on a copiée pour la traduction latine, qui a été conférée depuis sur les manuscrits grecs. S'il m'étoit permis de porter un jugement en pareille circonstance, je ne balancerois pas à dire, qu'il est impossible que toutes les traductions fussent parfaites, comme on le croit, attendu que les auteurs souvent se copient, et ne prennent pas la peine de consulter les manuscrits ; enfin que c'est une nouvelle carrière qui se présente pour les médecins qui aiment l'avancement de l'art, et une belle occasion de faire cesser les controverses qui existent encore au sujet de la doctrine d'Hippocrate ; car on ne peut douter qu'elle a été altérée par des copistes ignorans. Les fautes ont passé dans la traduction, toutes les fois qu'on n'a pu se procurer les moyens de vérifier les endroits douteux, et il est impossible

impossible de les rectifier sans les secours que l'on peut tirer des manuscrits grecs. Mais en travaillant sur nouveaux frais, la mine est riche et facile à exploiter par l'abondance des matériaux.

Les versions hébraïques, n'ont-elles pas encore été copiées sur l'arabe ? Quoi qu'il en soit, on distingue celle d'Amathée Nathan. Voolf. Bib. héb., tom. iij, pag. 1217, dit qu'il a fait des efforts inutiles pour découvrir, d'après des caractères symboliques, l'année de cette version. Mais on a su qu'elle a été achevée le 22 février 1292.

Quant aux traductions latines, elles ont eu aussi pour origine la fameuse traduction d'Honain. Il est bien prouvé, que la version de Constantin, surnommé l'Africain, lequel vivoit en 1070, a été faite sur l'arabe : (Voyez Maittair). Mais on cite, pour l'auteur original, Abou-Gzafari, ou Ebou-Gazari, qui a vécu dans le neuvième siècle. La version de Constantin a été impri-

mée à Venise en 1493, et à Bâle en 1536.

Marc-Antoine Gaiot a publié une version en hébreu ; en grec et en latin. Rome, 1647. Il prétend être plus exact que Foës.

Je crois devoir rappeler ici comme une preuve certaine, que les manuscrits grecs furent consultés et traduits fidèlement, à l'époque où les arts de la cité d'Athènes devinrent communs à l'Italie par la prise de Constantinople. Théodore Gaza, savant grec, se rendit surtout célèbre par plusieurs ouvrages d'histoire naturelle et de médecine, qu'il traduisit de grec en latin, entr'autres les Aphorismes, unprimés à Pavie, en 1512, in-fol., par les soins de Jacques de Forly.

Fabius Calvus donna aussi sa traduction latine, collationnée sur deux manuscrits grecs du Vatican : elle fut achevée l'an 1530 ; mais elle n'a été imprimée à Rome qu'en 1549, 1 vol. in-fol.

Parut ensuite la version latine de Jean Cornarius, de laquelle le savant Coray fait le plus grand cas. Elle a été imprimée pour la première fois à Bâle, en 1543, in-fol.; à Venise, en 1545; et à Paris, en 1546; c'est celle-ci que Van-der-Linden a adoptée dans son édition, la meilleure que nous ayons pour le grec.

Mercuriali, Foës, Chartier, se sont ensuite illustrés en suivant la même carrière. Les manuscrits grecs ont été successivement étudiés; mais étant tous dispersés, on pense bien que la tâche n'est point encore remplie.

Les premières éditions grecques d'Hippocrate sont d'Alde Manuce, 1526; mais il y a beaucoup de fautes. L'édition de Froben, qui a paru à Bâle, en 1538, est un peu plus correcte; elle est belle, corrigée par Jean Cornarius.

L'édition de Mercuriali, en 1588, vaut mieux que les précédentes. Celle de Foës, 1595, est la meilleure; mais au

jugement de M. Freind , critique très-érudit , elle n'est pas exempte de fautes.

La première belle édition grecque de Galien a été imprimée à Venise , chez les Aldes , en 1525. Cependant elle est moins bonne que celle de Bâle , 1538. Ces fameux imprimeurs ont donné nombre de livres précieux , notamment la collection des médecins grecs.

On doit au laborieux et infatigable Chartier , professeur au collège royal de chirurgie , en 1617 , les différens Traités d'Hippocrate et de Galien. Il passa à , faire imprimer les OEuvres de ces deux grands maîtres , la presque totalité de sa vie ; sa fortune même fut sacrifiée à cet utile et important travail. Les neuf premiers volumes furent publiés du vivant de l'auteur , en 1639 et 1649 ; mais les quatre derniers vol. ne parurent qu'en 1679 , plus de 20 ans après la mort de Chartier : l'ouvrage fait en tout treize gros volumes in-fol. , en grec et en latin. Le grec a

été conféré sur plusieurs manuscrits , et la version latine corrigée d'après le grec en beaucoup d'endroits. C'est un travail immense; et malgré les sévères critiques qu'on a faites de cet Ouvrage , c'est le plus beau monument qui soit élevé à la science :

Ergo ubi plura nitent in carmine , non ego paucis
Offendar maculis , (HOR. *Art Poét.*)

On a donné encore séparément les différens Traités d'Hippocrate; mais il n'en est point qui ait été aussi souvent traduit, publié et commenté, que le livre des Aphorismes : c'est un travail, rien que de décliner les noms des auteurs qui ont exercé leur plume sur cette matière. Il suffit que j'aie indiqué les sources les meilleures, et qu'on puisse consulter encore les auteurs les plus connus.

Gorter a publié successivement, en six ans, les Aphorismes, avec des Commentaires, réunis en 2 vol. in-4^o, année 1755. Ses Commentaires sont rédigés

entièrement dans l'esprit de la doctrine d'Hippocrate.

Rieger a publié, en deux vol. in-8^o, année 1767, un *Commentaria variorum*, très-utile à consulter; on y trouve l'opinion des meilleurs auteurs.

L'édition grecque et latine du professeur Bosquillon est très-importante par l'élégance et la correction du grec. Nous devons à ce savant helléniste la connoissance de plusieurs manuscrits, et les Commentaires d'Oribaze.

L'édition grecque et latine de Lefebvre de Villebrune, quoique très-inférieure à toutes celles que j'ai citées, offre aussi quelque intérêt à cause des anciens manuscrits grecs, hébreux ou arabes, et des recherches de cet érudit, à qui il ne manquoit que d'être un bon praticien.

Enfin, la dernière version de Lorry, Paris, 1784, est celle que j'ai adoptée.

Je termine là ma dissertation; elle suffit pour justifier l'importance d'une

tâche aussi pénible, et les continuels efforts qu'il m'a fallu surmonter, pour ne pas être le plagiaire de tant de sçavans qui ont enrichi de leurs observations le Traité des Aphorismes. Enfin, si j'ai pu mieux réussir que ceux qui m'ont précédé, je n'ai pas pour cela plus mérité qu'eux : *Vitavi denique culpam non laudem merui.*

VARIANTES

DES MANUSCRITS GRECS.

Pour éviter la confusion dans la citation des manuscrits, et l'inconvénient encore plus grave de se tromper, le plus souvent en rappelant pour toutes les variantes le numéro de chaque manuscrit, nous y avons substitué les lettres grecques selon l'ordre alphabétique. Voulant aussi éviter de répéter plusieurs fois les manuscrits dont les leçons sont à peu près les mêmes, ou qui passent pour être du même auteur, nous avons compris sous une seule et même lettre plusieurs numéros; nous avons donc distingué les Aphorismes par les lettres grecques comptées numériquement. Le D. est mis pour *delineatur*. Tel est le plan que nous avons suivi pour la classification des variantes.

Τμήμα πρῶτον.

Ἀφορισμοί.

α. Ἐαυτὸν ποιεῦντα ξ. 1. ἑαυτὸν. ξ. 2.
καὶ τὰς νοσῆστας K. 1.

β'. Ἦν μὲν οἷα δεῖ γίνεσθαι γίγνων-
ται. φ. 1. K. 2. οἷη γίγνηται. γίγνοιτο.
K. 3. ο. ἔτω καὶ τῶν ἀγλείων κένωσις.
ξ. 1.

γ'. Ἐν τοῖσι γυμνασικοῖσι. αἱ ἐπ' ἄκρον
πληρώσιες εὐεξίαι. ο. ἐπεὶ δ' ἔτι δύ-
ναντες. φ. 1. Εἵνεκην λαμβάνη. α. β. υ. ut
fere omnes scripti. ἀναπαύσιος. ξ. 1. η.
α. D. ἀναβλέψιος. ξ. 2. ἀναλήψεις. β. γ.
ν. υ. ἀναλήψιας φ. 1. ἀναθρέψεις. ξ. 2. iv.

δ'. Ἐν τοῖσι ὀξέσι πάρεσιν. β. 5. α. νο-
σήμασιν φ. 1. ὃ μὴ ἐνδέχεται. οὐδετέρως
ξ. 1. ο. χαλεπαί α. β. ἐν τῇ ἐσχάτῃ. φ. 1.

ε'. Βλάπτονται βλάπτοντο. πᾶν γὰρ ὃ
εἰάν γίνηται μέγα γίνεται μᾶλλον ἢ ἐν τῇ τι-
λεπτῇτι. α.) ut fere omnes scripti. ὅτι τὰ
ἀμαρτοντά χαλεπώτερος ξ. 1.

ς'. Ἐσχάτως πόνως, τόνως K. 3.

ζ'. Εἰ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ. α) τῇ νῆσῳ

καὶ τὴν ἀκμὴν τῆς νύκτε καὶ πότερον ἀπαυ-
 δήσει πρότερος. ξ. 2. ρ. ο. υ. ἀπαυδήσειε
 κεῖνος. α.) ἐξαρκέσοι. η. πρὸς τὴν ἀκμὴν
 ἀρχὴν. α. πρὸς νόσον. ξ. 1. ἐξαρκέσι. α.
 Κ. 2. ξ. 2. υ. φ. 2.

ι. Πιωτέρως πλείστοτέρως γ.

ιβ'. Δηλῶσιν. γ.) ξ 1. ἀνταποδόσεις α.
 μ. ξ 2, υ. ε. ἀντεπιδόσαις ξ 1. καθ' ἡμέριν.
 καὶ παρ' ἡμέριν. γ. ἰδρῶτα. β.

ιε' Πλέον ἔχουσι ἔχει. α. δέονται. δεῖ-
 ται ν. ο.)

ισ'. Διαιτᾶσθαι—διαιτεῖσθαι. β. Κ. 2.
 ν. ο.)

ιζ'. Καὶ πλείονα καὶ ἐλάττονα φ. 1.
 πλείον, ἐλάσσω. α. 1.

ιθ' Μηδὲν, θροφήν μὴ διδόναι. β.)

κα. Μήτ' ἄλλοις ἐρεθισμοῖς ἀλλ' ἐᾶν
 διάγειν, ὅκου ἂν μᾶλλιστα ῥέπει ἡ φύσις
 ταύτῃ ἄγειν. α.) ῥέπη ἡ φύσις β. ν.

κβ'. Τὰ δὲ πλείστα ἐκ ὀργᾶ. τὰ δὲ
 πολλὰ. β. 1. ν. ο. υ.

κγ'. Εἰσαρκέση—ἐξαρκέη. ρ. ἐπ' ἄγειν
 ἄχρι. ξ. 2. χρῆσθαι. α. καὶ τῷτο προεξευ-
 κρινήσαντος. α.—σαντα. Κ. 3. σαντες φ. 1.

Τμήμα δεύτερον.

γ'. Υ'πνος ἀγρυπνίῃ ἀμφοτέρα γίγνομένα μᾶλλον τῆς φύσεως. ν.

ζ'. Ἐπανατρέφειν. ἐπανατρέφειν. α. φ. ι.) σώματα. D. υ.) δεῖ D. α.

ή'. Σώμα χρήται. α. χρή εἶδέναι D. σημεῖον K. 2.

θ'. Καθαίρειν-καθαίρεσθαι K. 3. υ. καθαίρεισθαι α.)

ι'. Τὰ μὴ καθαρὰ τῶν σαμάτων τρέφῃς τὰ σώματα τρέφῃς. υ. ὁκόσον ὁκίσῃ. β.)

ιδ'. Μετάδολλη-μεταδόλλοι β. ν. φ. ι.

ιέ'. Τῷ σώματι τῷ σώματι. β. ν. τοῖσι τῶν ὑγαινόντων. K. 3.

ιζ'. Νῆσον ποιέει-νεσοποιέει. α. υ. πλείον ἐσέλθῃ K. 2. φ. ι.

ιή'. Τῶν τρεφόντων τρεφόμενων. α. η. ζ. ι. ζ. 2.

ια'. Ἀσφαλέες αἱ προαγορεύσεις, σ. K. 3. προσαγορεύσεις. ν. ἀσφαλές. φ. ι.

κ'. Πρεσβυτέροισι γινόμενοισι. ἀπογηράσκουσι. β. θ. η. ξηραί-θερμαί β.

κδ'. Ἐτέρης ἐδομάδος ἡ ὀγδόη ἀρχὴ ἀπὸ τῆς δευτέρης. β. γ.

λ. Ἀσθενέστερα - ἰσχυρότερα. ἀσθενέστατα ἰσχυρότατα. α. γ. ξ. 2. ξ. 3.

λέ. Καθάρσιος-καθάρσεις γ.

λς'. Οἱ ὑγιεινῶς ὑγιεινὰ. γ.

λζ. Φαρμακεύεσθαι-ἐργάζεσθαι. ἐργάζεσθαι. φ. 1.

λθ'. Πολλὰ νοσέουσιν, πλείστα, ἥττον, ὀκτώσα. β. γ.

μ'. Πρεσβύτησιν-γενομένοισιν. φ. 1.

μγ'. Καταλυομένων-καλυομένων. α.)

μέ. Αἱ μεταβολαὶ τῆς ἡλικίης καὶ τῶν ὁρέων καὶ τῶν τόπων. α. β. ὠραίων. φ. 1. χώρων. γ. χωρίων D. α. φ. 1.

ν'. Τὰ συνήθεια ἥσπον ἐνοχλεῖν εἴαθε, εἴωθασιν. ξ. 1. δεῖ δὲ ἔν καὶ ἐς τὰ ἀσυνήθη. γ.

νά. Τὸν ἐξ ἐτέρου ἐφ' ἕτερόν μεταβαίνειν εἰς μεταβαίνειν α. εἰς ἕτερόν. β.

νβ'. χεῖρον ἀπαλάσσει χεῖρον φ. 1.

νδ'. Μεγέθει μεγέθη. K. 2. φ. 1. αἰδέσθαι αἰδέσθαι. β. ἐννεάσαι ἐγγραῖσαι ἐννεῶσαι ἐγγραῖσαι. ξ. 1.

Τμήμα τρίτον.

α. Καὶ κατὰ λόγον, ἢ ἄλλε τινὸς τῶν
ἄλλων οἷον ὑγρότητος ἢ ξηρότητος ἢ πνευ-
μάτων ἢ ἀπνοιῶν. καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λόγον
ἔτως. ν.

β'. Καὶ τῶν νούσων. ζ. 2. υ.

δ'. Οἷόνταν ὁπόταν. Κ. 3. γίνεται
ποίει. ν. ποίει. Κ. 3.

ε. Αἰχλυάδες. η. αλυάδεις. ε.) ἔτοι
δυνασεύωσι. ν. Κ. 3. ἐν τοῖσιν ἀρρώσίσιν. ἐν
τῇσιν ὥρῃσιν. Κ. 3. οὗτος δυνασεύη. ν. υ.

ζ'. Τοιᾷτέον ἐὼν οἶν τὴν-τοιᾷτον ὀκοῖον
καὶ τὴν λ. ὀκοῖν καὶ τὴν β. Κ. 2. Κ. 3. ν.
φ. Ι.

η. Ἐν καθέσεῳσι καθεσαόσι. ν.

Καὶ αἱ ὥραι εἰς τὰ ὥραῖα ἀποδιδῶσιν
εὐκρινέσατοι γίνονται. β. Κ. 3. ν. εὐκρινέ-
σεται. λ. Κ. 2. φ. Ι. εὐκρινέες. υ.

θ'. Οἷύτατοι-οἷύταται. Κ. 3.

ια. Ἀνάγκη τῷ θέρους πυρετῶς ὀξείας.
γίνεσθαι τῷ θέρους πυρετῶδες εἶναι. καὶ
δυσεντερίας γίνεσθαι-ἐγγίνεσθαι. λ. τοῖς

τῶν ἀνδρῶν. D. υ. τοῖσιν ὑγροῖσι τὰς φύσεις.
υ. ἔχουσι. K. 3. τοῖσιν ὑγράς ἔχουσι τὰς
φύσεις. ν. K. 2. K. 3. τοῖς ἀνδράσι τοῖς
ὑγροτέροισιν. λ.

ιβ. Εὐδιος εὐδιενὸς ξ. 2. εὐδινὸς φ. 1.
ἔυδιός. K. 3. ἦσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ. ὁ
τόκος. ν. πρὸς ἔαρ. K. 3. αἱ δ' ἂν τέκωσιν.
ὅσαι τέξωσιν, αἱ ἀπόλυσθαι α. νοσῶδη K. 2.
νεωτέροις K. 2. φ. 1. καθάρροιαι α. δύσειτε-
ροίαι. α. συντόμως ἀπολλύντες. αὐτίκα. K. 3.
ἀπολλύμενοι. υ. ἀπολλύσαι. ξ. 2.

ιγ'. Κεφαλαλγίαι ἰσχυραί. β. κ. 3. ν.
ἐνίοισι δέ-φθίσιες. ἐνίοιδέ. α.

ιδ'. Τοῖς μὲν ὑγροῖς τὴν φύσιν σύμφορον.
β. ν. συμφέρει φ. 1. τοῖς μὲν ὑγροῖς τὰς
φύσεις. τοῖσι δὲ λεπτοῖσιν. κ. 3. χροῖαι. ν.
φ. 1. D.)

ιε'. Ηῖστον ἦσον. κ. 3. θανατῶδες. φ. 1.

ισ'. Τοῖσιν ἐπομοθριοῖσιν. λ. ξ. 2. φθινά-
δέες ὀφθαλμιαί. η. ξ. φθινάδες. α. λ. ξ. 2.
φθινάδεα. υ. ὀφθαλμοίαι. α.

ιζ'. Συνιστάσι-συνιστάσι. α. φ. 1. καὶ ἦν
τι πᾶ προὔπαρχη. λ. ὅματα. ξ. 1. ῥάρακα.

ν, φ. 1. καὶ ἐν τοῖσιν ὀμμάτιν δυσκινήσιν.
λ. καὶ ἐν τῷ σώματι. κ. 2. ἐμποιέσιν. β.

ιβ'. Πάσαι μὲν νοῦσι ἐν πάταις ὥραις. φ. 1.
κατὰ τῆ δὲ θέρεος ξυνεχέες ἤγουν σύνοχοι.
κ. 3. τριταῖοι (πλείστοι. β. κ. 3. λ. ν. D.)
πυρετοί. υ. τριταῖοι πυρετοί, καὶ τεταρ-
ταῖοι. α. (τεταρταῖοι. ν. φ. D.) καὶ φθόαι
ὀφθαλμιαί. ν. ἰδρῶτες. λ. ἰδρῶταρια. κ. 3.
αἰδίων. φ. 1.

κγ'. Λήθαργοι. κ. 3. ξ. 1. φ. 1. D.

κδ'. Ἐν δὲ τοῖσι ἡλικίοισι συμβαίνει
νεογνοῖσι νεογνήσι. ν. ὀμφαλῆ φλεγμοναί·
ὀφθαλμῶν. β. ν. ὀδοντοποίειν μάλιστ' ὅταν. β.
ν. κοιλίας ἔχουσι. ν. οὖσιν ἔχοντας φ. 1. καὶ
μάλιστ' ὅταν φέρωσι. ε. η. ἄγωσι. υ.

κε'. Οὔδαζασμοί. κ. 3. ὀδαξυσμοί. β. ν.)
ὀδαξησμοί. υ.

κε'. Πρεσβύτησι γιγνομένοισιν. ν. ξ. 1.
ξ. 2. ἰσάσιες. υ. ἔλμινθαι. η. ἔλμινθοί. α.
σαφυριασμοί. κ. 2. μάλιστ' αὖτὰ προειρη-
μένα. α. D. περὶ ἐτέρων τινῶν. β. ν.

κη'. Τὰ δὲ πλειστα, πολλὰ. ν.

κά. Λήθαργοι. α. ζ. κ. 3. πρεσβυτέροις.

κ. 3. ν. φ. ι. Δυσουρίαι. υ. D. Κατάρ-
 ροι. Κατάρροιοι. ε. η. πρεσβυτέρησι. λ. ν.
 φ. ι. ξυσμοὶ τῷ σώματος. κνήσμοι. κ. 3. ν.

Τμήμα τετάρτον.

α. Παρὰ δὲ ταύτας. α. ξ. 1. ξ. 2. ἄχρις.
 ν. ἥσσειον. φ. ι. τετράμηνα. σ.

ε. Τὰς ἄνω καὶ τὰς κάτω ὑπὸ κύνα
 καὶ πρὸ κυνὸς ἐργάδεες αἱ φαρμακεῖαι. ρ.

ς. Τὰς δὲ δυσέμέας καὶ μέσας εὐσάρ-
 κες κάτω θέρεος. τοὺς δὲ φθινάδεας ὑποσ-
 τελλομένους. κ. 2. ἐπὶ τὰς ἄνω φαρμακείας
 ἰδεωσὶ ἄξεις. β.

θ. Τὰ ἐναντία προστιθῆς. φ. ι.

ια. Μεθ' ὑπὸ μεθ' ἄλλως. κ. 3. λ.

ιβ. Πρὸς τοὺς ἐλλέβορους. κ. 2. κ. 3.
 υ. D.. δι' ἐλλέβορου. η. ἀναπαύσει. D. ι.

ιδ. Μὴ κινήσας. ν. τὰς ἀκινήσας. β.
 κ. 2. λ. ν. φ. ι.

ιζ. Ἀ πυρέτῳ, πυρετῳ. λ. καθαίρειν ση-
 μαίνει, ὅπόσα κάτω. ξ. I. ξ. 2. πικρῶμενον. α.

ιη. Τὰ ὑπὲρ τῶν φρενῶν ὀδυνήματα
 (ὅπόσα καθαίρειος δέονται. α. κ. 3. υ. ξ. 2.
 φ. ι. D.) ἄνω φαρμακεῖν σημαίνει. υ. δίδιδαι.

Φ. Ι. ἄνω φαρμακείῃ ὅσα δὲ κάτω Φ. Ι. κάτωθεν. λ.

κβ. Ὑποχωρή-μέλαινα. οἷον αἷμα. α. ἦν φαίνεται. β. γ. οἰονεί. ξ. 2. (αἷμα μέλαν. D. κ. 2. Φ. Ι.) ἀπὸ τῆς αὐταυμάτου. υ. καὶ ὁκόσοις ἂν τι χρώματα. α. ὁκόσοισιν. λ. ξ. 2. καὶ ὁκόσα-ἂν χρώματα ποιηρότερα ἦ, (Φ. Ι. (ἂν χρώματα ποιηρὰ. υ.) καὶ ὁκόσα ἂν πλείω χρώματα ἔ ποιηρὰ. υ. ἔ ποιηρὰ χρώματα. Φ. Ι. καὶ ὁκόσαν. α. καὶ ὅσα τὰ τῶν ὑποχωρήματων πλείων. καὶ ὅσα ἂν πλείονα χρώματῃ ἢ ἔ ποιηρὰ. λ. καὶ πλείω χρώματῃ. ξ. Ι.

κβ'. Ἡ'ν χολὴ μέλαινα ἐπέλθῃ, ὑπέλθῃ. κ. 3. λ. ξ. 2. υ. ὑπέλθῃ. κ. 2.

κγ', Οἰκόσοισιν ἐκ νοσημάτων ἢ ἄλλαις πᾶσι D. Φ. Ι. ξ. 1. ξ. 2. λελεπτυσμένων ἐπέλθῃ. ι. ὑπέλθῃ. γ. λελεπτυσμένοις ὑπέλθῃ. Φ. Ι. υ. λεπτυνομένων. ξ. 2. χολὴ μέλαινα ὁκόσον αἷμα μέλαν. Φ. Ι. κ. 2. υ. γ.

κδ. Αἷμα ἄνω μὲν ὁκόσον ἂν ἦ κακόν. κάτω δὲ (ἀγαθόν β. D.) ἁμαρτον. β. τὰ μέλαινα ξ. 2. ἃ μέλαινα διαχωρήματα κακόν. α. ι. ξ. Ι. λ. αἷμα ἄνωθεν μὲν ὁκόσον ἂν εἴη. κ.

3. λ. τὰ μελλόντα. λ. ὑποχωρόντα κ. 3. φ.

1. οἰκείον. φ. 1.

κς'. Η'ν ὑπὸ δύσειν. ἔχομε. οἶον σάρκεις
ὑποχωρήσωσι. ὁκοῖον λ. αἱ. υ. ὁκοῖαι ἄν. ξ.

1. ξ. 2. ὑποχωρέσει. λ.

κζ'. Αἰμορράγιη πληθὺς τούτων. φ. 1.

κη'. Ο'κόσοισι-παύεται-παύονται. φ. 1.

κθ'. Η'ν ἐκτέουσιν γίγνεται. φ. 1.

λ'. Ο' πυρετός. ξ. 2. υ. εἰς λάδοι. κ. 3.

φ. 1.

λβ'. Πονέει πονήσει. φ. 1. πονήση. λ. φ. 1.

λδ'. Η'ν ὑπὸ πυρετῷ ἔχο-πνίξ ἐπισῆ.

κ. κ. 2. ξ. 2. υ. φ. 1. Ut ferè omnes scripti.

λέ'. Ἐπιστραφῇ ἀποστραφῇ. α. ξ. 2. ἐν τῷ
τραχήλῳ. υ. φ. 1. Ut ferè omnes scripti.

λς'. Ἐννατάιοι, καὶ ἐβδόμη καὶ εἰκοσῆ.

φ. 1. D. καὶ τριακοσῆ τετάρτη. D. ξ. 1. ξ.

2. α. υ. φ. 1. καὶ (εἰκοσο πρωτκῖοι. ξ. 2.

λ. ξ. φ. 1. κ. 2. D. εἰκοσῆ. χ. 2. εἰκοσοι.

φ. 1. εἰκοσαῖοι. φ. 2. τετάρτη καὶ εἰκοσῆ χ.

2. καὶ τριακοσῖοι πρῶτοι καὶ τριακοσῖοι ἐβ-
δομοὶ, καὶ τεσσαρακοσῖοι. β. ν. τεσσαρακοσῆ.

φ. 1. μῆκος νῆσος καὶ ὑποστροπιασμὸν. κ. 3.

φ. 1. ὑποστροφὴν τῆ νουτημάτος. φ. 1.

λή. Καὶ ὅκου ἀν ἤ. ν.

μ'. Ἡν χρώμα γίγνηται δείκνυται. α.

ξ. Ι. ξ. 2. γένηται. κ. 2. γίγνοιτο. β. ν.

μά. Τινὸς αἰτίης ἐτέρης. α. ξ. Ι. ν.
 χρῆσθαι. φ. Ι. χρήται. υ. Ι. ἀνευ προηγη-
 σαμένην αἰτιού. θ. τῷτο πάσχη, δεῖται τὰ σώ-
 ματα λ. ν. τὸ σῶμα δεῖσθαι φ. Ι.

μβ'. Ελάσσαν, νῆσον, μείζων, ἐλάττων. β.
 λ. ξ. 2. πλείω. ν. πλέον, ἐλάσσαν, νῆσον. φ. Ι.

μγ'. Οἰκόσοισι, οἰκόσοι, πυρετοὶ μὴ δια-
 λείπωσι, ἀκίνδυνοι. α.

μδ'. Φύματα ἢ πόνοι. κ. φ. Ι. D. 2. ἐκ
 πυρετῶν μακρῶν. ν. κ. 3. χρῶνται. ν.

με'. Ἐμπίπλη λ. ἀσθενεῖ ἤδη τῷ σώματι.
 κ. 2. φ. Ι.

μζ'. Δυσώδεις. υ. D. χολώδεις. ν. D.
 καὶ κατὰ τὴν διαχώρησιν. ν. διὰ τῶ ἰώως
 τῶν ν. ὑποχωρεύουσαι. φ. Ι.

μθ'. Τοῖσι μὴ διαλείπωσι πυρετοῖσι. υ.
 φ. 2. ἰόντος. D. φ. Ι. τῶ κάμνοντος. ν. τῶ
 σώματος. D. υ.

νβ'. Οἰκόσοισι, ἀτοπώτερον, ἀτοπώτα-
 τον. α. ν.

νδ'. Βηχες ἰσχυραί. α. ἐρεθίζουσαι ἐρε-

θίζουσιν. γ. ἐπὶ πολὺ. γ. D. ἐν πυρετῷ καυ-
σώδη. γ.

νζ. Ἐπὶ καύσῃ. γ. ἀπὸ. κ. 2. ἐχωμένῳ
γίνεται. D. γ.

ξ. Τὰ ἐν ἀρτίῃσι κρινόμενα δύσκριτα καὶ
φιλυπόσροφα. κ. 2. γ. ξ. 2. υ. φ. I.

ξα. Οἵόσοι δ' ἂν οἱ πυρετοὶ παύονται
μῆτε σημείων γενομένων· λυτηρέιης μῆτε ἐν ἡ-
μερῇσιν κρισίμοισιν ὑποσπύρας προσδέχουσ-
θαι δεῖ. γ. μ.

ξβ. Ἡ'ν μὴ ξυνδόσεις. λ. D. καθ' ἡμέ-
ριν. φ. I.

ξγ. Ἡ'ν τῇ ἐνδεκάτῃ. γ. D. τὸ δεξιὸν
σκληρότερον γένηται. β. λ. γ. ξ. 2. ἔκ ἀγαθὸν
κακόν. ξ. 2. γ.

ξδ. Οὖρα παχέα. D. φ. I. ἐπέλθον.
ἐλθόν. κ. 2. φ. I. διὰ παχέων. α. I. ξ. I.
κ. 2. υ. φ. I. ἀπυρέτλουσι. φ. I.

ό. Οἷον ὑποζυγίων, ὑποζυγίῃ. φ. I.

οβ. Φρενιτικοῖσι, νεφρίτικοῖσι. φ. I. ἐπι-
φαίνεται, ἐπιγίγνεται. υ. ἐπιγίγνονται. α.
ξ. I. ξ. 2.

ογ. Τετρείοισι αὐτοῖσι. φ. I. πλῆθος
λεπῶν ἔρων. η. κ. I. ἐπέλθη, ὑπέλθη.

ξ. 2. υ. φ. 1. ὑπέλθοι. ν. ἐν δὲ πυρετοῖσι
ταῦτα. D. λ. ἐπὶ. κ. 2.

οσ'. Οὔρον πολὺ. D. υ. κάρθα παχύ.
α. 1. υ. πολλὰ κάρθα. ξ. 2. κοπιώδεσι.
ξ. 1. ξ. 2. τάχυ ταχέως. ν.

οσ'. Ἐκκρίνεται, ἢ ἔκκρισις γίνεται. α.
ξ. 2.

οζ'. Ξυνεξέρεται. — εἴται. α. ξυνεξέρ-
χονται. κ. 2. φ. 1.

οθ'. Ἐν τῷ ἔργῳ. τοῖσι ἔργοις. φ. 1. ἡ
κύσις λιθιδᾷ καὶ οἱ νεφροί. K. 2. φ. 1.

π'. Θρόμβος καὶ βοθρόως. ν. ξ. 2. εἰς
καὶ τὸν κλένα. ξ. 2. καὶ τὸν κλένα καὶ τὰ
περίναιον. β. εἰς τὸν κλένα καὶ τὸ ὑποχόν-
δριον καὶ τὸ περίναιον, τὰ περὶ τὴν κύσιν
πονέειν σημαίνει. κ. 2. φ. 1. πρὸς τὸ ὑπο-
γάστριον καὶ τὸν κτένα καὶ τὸ περὶν. τὰ περὶ
τὴν κύσιν πονέει. κ. 3.

πδ'. Διαπυήσαντα καὶ ἐκράγντα. κ.
3. ν. — διαποιήσαντος. κ. 2. φ. 1.

πγ'. Οὔρησις ἐκ νύκτωρ σμικρὰν ἔσσεσθαι-
ὑποχώρησιν, σημαίνει. φ. 1.

Τμήμα πέμπτον.

- α. Σπασμός - θανάσιμον -- θανάσιμος.
 κ. 2. φ. 1. τρώματι, τραύματι. κ. 3.
 γ. Αἵματος πολλῷ ρυέντος κάτω. υ.
 ξ. 1. ξ. 2. πολλοῦ. D. α.
 ι. Ἡ'ν μὴ πυρετός ἐπιλάβῃ, ἐπιλάβ-
 ραι. κ. 3.
 ε'. Τέτλαρσιν διαφύγωσιν, διαφύγοιεν.
 κ.) ξ. 1.
 ζ' Τὰ ἐπιληπῇ. ὁκόσοις ὁποῖα. φ. 1.
 ὁπόσα. κ. 2. τουτέοις τὰ πολλά. D. κ. 1.
 η'. Εἰς ἐμψυήματα καθίσανται. ξ. 1. ξ.
 2. κ. 3. καθίσταται. α. ἐπίσανται. κ. 2.
 φ. 2. μεθίσταται. υ.
 θ'. Φθίσεις γίνονται. κ. 2. φ. 1. πέντε
 καὶ τριήκοντα ἑτέων. υ.
 ι'. Εἰς τὸν πνεύμονα τρέπονται. λ. ἦν,
 κῆν. ξ. 1. ξ. 2. τουτέοις. φ. 1. καὶ αὐτέοις.
 κ. 3. λ. υ. αὐτοῖς. φ. 1. φ. 2. τρέπον-
 ται. λ.
 ιά. Ἡ'ν τὸ πλύσμα ὅπερ ἂν, ὅ, τί ἂν.
 β. κ. 2. λ. υ. φ. 1. ὀχλυμένοις. λ. θανα-
 τώδεις. φ. 1.

ιγ'. Αἷμα ἀναπλύσσι, ἰμέεσι. φ. Ι. τοιαύτη. D. φ. Ι.

ιδ'. Μεδίσανται, μεδίσαται. υ. φ. Ι. λύονται. κ. 3.

ις'. Χρεομένοισι Χρεομένον. κ. 2. φ. Ι. χρεομένω. α. υ. κ. 3. αὐτα οἷσι. κ. καὶ οἷσι ταῦτα θάνατος. η.

ιθ'. Θερμὸν φίλιον καὶ ἐκποιητικόν. ι.

ιθ'. Πλὴν ὅσα αἰμορράγειν μέλλει. κ. 2. μέλλει. β. φ. Ι. πλὴν ὅποσα αἰμορράγειν μέλλει ἔλκεσι. Ι.

κ'. Ἀνεκποίητον. υ. φ. Ι. ἀνεπύητον. ξ. 2. μελασμοὺς μελαίνει. β. κ. 2. ξ. Ι. ξ. 2. υ. πυρετώδη. κ. 2. ἐμποίει ξ. 2.

κά'. Θέρεος μέσθ' ἀνευ ἔλκεως. κ. 3.

κβ'. Ἐπυητικόν. α. ἐκποιητὸν. ξ. Ι. ξ. 2. ἐκποιητικόν. κ. 2. παρηγορητικόν. κ. 3. κατήγματα. ξ. Ι. κατηγμένα. η. κ. 3. πρήγμασι. α. ἀπὸ ψύξεως. φ. Ι. ψυχροτήτος. ξ. Ι. καθεάγμασι. κ. 3. μαλάσει. κ. 3. ἔδρα αἰδοίης. ν. αἰδίοις. β. καὶ αἰδεῖ; θερμὸν φίλιον. α. β. ν. ξ. Ι. ξ. 2. υ.

κγ'. Δεῖ τῷ ψυχρῷ κρῖσθαι, μὴ ἐπ' αὐτα ὅθεν αἰμορράγειν μέλλει ἔλκεσιν αἷμα.

φ. 1. ἄλλα περὶ αὐτὰ ὅθεν ἐπιρρέει. β. κ. 2.
καὶ ὁκόσα φλεγμαίνει. α. β. γ. δ. βλέποντα.
β. (βλάπτει-θανατοῖ. α.) 1. ξ. 2. θάνατον.
φ. 1. ξ. 2.

κδ'. Τῷ σήθει-σήθους. γ. αἰμορροϊκὰ
αἰμορραγικά. κ. 2. φ. 1.

κε'. Ποδαλγικά. β. πάλιν ραΐζει. κ. 3.
πολύ. κ. 3. καὶ ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιεῖ.
κ. 2. ὀδύνης-ὀδύνας. γ. ληκτικὸν ἤ. α. ληκ-
τική. κ. 2. κ. 3. ξ. 1. ξ. 2. υ. D. (λυητική.
β. — ληκτική. υ. λυτική. λ.

κε'. Ψυχόμενον-ψυχραίνόμενον. γ.

κς'. Ὀκόσοισιν ὕδωρ πιεῖν ὀρέξεις του-
τέοισι. φ. 1.

κη'. Γυναικείων ἀγόνων. κ. 2. ἐνεποίει
ἐμποίει. α. ἐποίει ἐποίη. υ. πολλακῇ. α.

λ'. Θαναλώδης. α. θαναλώδες. φ. 1.

λβ'. Εἰ φλεβοτομηθῇ. β. ἢ φλεβοτο-
μειθῇ. γ.

λγ'. Ἐκλιπόντων. κ. 3. αἷμα ἐκ τῶν
ρίνων ῥυέη. φ. 1.

λδ'. Ὑσέρικα. β. γ. ὑσέρειαν. κ. 3.

λε'. Ὁ δεξιὸς ἰσχνός, γένηται. β. φ. 1.
ἀριστερὸς ἕτερος. φ. 1.

μέ. Τιτθὲς μαδὲς. κ. 2. φ. 1.

μά. Α' δείπων ἐξή. α. ν. υ. D. δοῦναι. υ.
δίδου. K. 2. ν. καὶ εἰ μὲν περὶ κοιλίην. κ. 2.
φ. 1. σπρόφος αὐτὴν-ἴσχει. ξ. 1. κὴν πῆρ
σπρόφος αὐτὴν ἔχει. α. η.

μγ'. Εἰρυσίπελας ἐν τῇ γαστρί. K. 3.
κύση. ξ. 1. κύσει. ξ. 2.

μδ'. Ἐκτιτρώσκουσι δίμηνα πρὶν ἢ πα-
χυνθῆναι. η. υ. οὐ κύσει πρὶν ἢ παχυνθῆναι.
η. κ. 2. ν. οὐ κύϊσκουσι. ξ. 2. φ. 1.

μέ. Ταυτῇσιν αὐτῶν. κ. 2 φ. 1. αἱ
κοτυληδόνες τῆς μήτρης μύζις μεσαί εἰσιν.
K. 2. μύξη. ν. ταυτῇσι. φ. 1. ἀλλὰ ἀπορ-
ρήγνυται. υ.

μς'. Καὶ πλὴν τῆτο. K. 2. φ. 1. λεω-
τῶναι. κ. 3.

μζ'. Εὔγειμένη-Εὔκυεμένη. ε. ζ. η.
ῆ. κ. 1. διαπυήση-διαπλυήση. θ. η. ἢ καὶ
διαπνήση ἀναγκαῖον ἔμελον γένεσθαι. κ. 2.
φ. 1. ἔμοτον. λ. ἤμητον. α.

μῇ. Ἄρσενά ἐν δεξιούϊς ὡς θερμότερα καὶ
ὡς τῷ ἥπατγειτνιοτά. α. τὰ δὲ θήλυα.

μθ'. Γυναικὶ ἐν γαστρί ἔχουση τεινεσμός
ἐπιγενόμενος ἐκτρώσιν ποιέει. α. β. ι. ν. ρ.
φ. 1. ἐκτρώσαι. η.

μθ'. Ὑστέραων ἐκπλώσιος. υ. πταρμικοί
προσθεῖς. α. φ. 1. προστιθεῖς. καὶ ἐπιλάμ-
βανει. φ. 1. Οὐ περὶ ὑστέραων ἀλλὰ περὶ τὰ
καλούμενα χόρια τε καὶ ὑστέρα ἅτινα ἢ σικύ-
τηδέφια (α.)

ν'. Γυναῖκος ἦν βέλη. κ. 2. φ. 1.
κατάσχειν. α.

να'. Τουτέιοις τὸ σῶμα τῶν ὑσέρων ξυμ-
μύει. β. κ. 2.

νγ'. Ἐκ τῶν μαζῶν μαθῶν. β. κ. 2.
φ. 1. οἱ μαθοὶ οἱ τιτθοί. Κ. 2. η. 1. ὑγιει-
νότερον ὑγιεινόν. κ. 2. ῥυέη. φ. 1.

νε'. Ἰσχυαίνονται θερμαίνονται. κ. 3.
φ. 1.

νζ'. Γίγνονται συμβαίνουσι. φ. 1. δοκίει
διὰ τοῦ σώματος. α. β. ν. υ. ἐαυτήν υ. φ. 1.

νθ'. Τοῖσι φθείρειν μέλλουσας. α. η. υ.
τῆσι. μέλλεσι β. οἱ μαθοὶ ἰσχυοὶ γίγνονται.
κ. ὁκόσαι δὲ θυμεία κάτω διὰ τε λιθωνω-
τοῦ καὶ σμύρνης καὶ στέρακος καὶ τῶν εὐα-
δῶν. α. δοκίη. α.

νθ'. Εἰ συλλήψεται. φ. 1. δοκίει. κ. 2.
φ. 1. διὰ τοῦ σώματος. α. β. υ. ἑαυτήν.
κ. 2. υ. φ. 1. κάτωθεν. κ. 1.

ξ'. Καθάρσεις ἣν πορεύονται πολλάί. ζ.

ξδ'. Καὶ αὐτὰς ἔχουσιν ὁμοίως. ξ. ι.

φ. ι. οὐ κυίσκονται αὐτῶν ὁ γόνος. κ. 3.

κεικαυμένας. ξ. 2. περικεκαυμένας. κ. 2. ν.

φθείρεται τὸ σῶμα. λ. ἐπίτεκται. υ.

ξγ'. Παρεμπίπτειν τῷ σώματι τὸ σπέρμα. κ. 2. φ. ι.

ξδ'. Γάλα διδόναι κεφαλαλγικοί. υ.

κακὸν ὑποχωρήσεις πυρεταίνουσι. φ. ι. καὶ

πυρέτλουσιν κακόν. κ. 3. καὶ οἷσιν ὑπόχον-

δρια βόρβορυζ-βληχράδεσι μηδενὸς ὧν ση-

μείων παρεόντος καὶ τοῖς παρὰ λόγον ἐκτε-

τηκόσιν. ε. κ. 3. κακὸν δὲ καὶ τοῖσι χολω-

δεσίρας ἐτέρας ὑποχωρήσιαις ἔχουσι. ξ. 2.

ἐνὸξέσι πυρετοῖσι ἔχουσι. η. ὑποχωρήσεις. υ.

διαχωρήσεις. ν. τὸ γάλα ἄλλα μὴ τοῖς λίην

πολλῷ πυρέσσουσι. α. ι. ὁκόσον προεῖρηται

συνεδρεύοντος σημείων παρεόντων. ξ. ι. ξ. 2.

συνεδρεύοντος. η. μηδενὸς ὁκόσων προειρήται

συνεδρεύοντος τῶν σημείων παρεόντων. α. η. ι.

ὧν προειρήται. ν. υ. παρεόντος. β. υ. οὐ

μᾶλλον δὲ τῶν ἐκτετηκότων. ξ. ι. ἢ καλὸν

δὲ τῶν ἐκτετηκότων α. η. ἢ ἄλλον. ρ. παρὰ

λόγον ἐκτετηκότων. υ. τῶν παρεόντων παρὰ

λόγως ἐκτετηκότων. κ. 2. φ. 1. καλὸν δε
τῶν ἐκτετηκότων. 1.

ξέ. Οἰκόσοις οἰδήματα μὴ φαίνεται. φ. 1.
ἰκπύησις. ν. ἢ ἐρυθρὰ μᾶλλον ἢ τὰ οἰδή-
ματα. α. ξ. 2. 1.

ξς'. Οἰδήμα μὴ ἐπιφαίνεται, τραυμάτων
πονηρῶν ἐόντων. υ. φ. 1. μέγα. D. ἰσχυρῶν.
D. φ. 1.

ξζ'. Τὰ ἔνωμα κακὰ κακόν. υ.

ξη'. Ἐν τῷ μετώπῳ φλέψ ὀρθία. φ. 1.
ὀρθίον. ν. ὀρθή. κ. 2.

ξθ'. Καὶ ἀνδράσιν, ὅπιοθεν τῷ σώματος
οἶον πηχέων μηρῶν ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα
ἀραίον δηλοῖ δὲ ἡ θρίξ. υ. ἀτὰρ καὶ τοῖσι
ἀνδράσιν ἐκ τῶν ὅπιοθεν. κ. 3. δὲ μᾶλλον
ἢ ἔμπροσθεν τῷ σώματος οἶον πηχέων. κ. 2.
φ. 1.

ο. Οἱ ἀλυσχόμενοι ἐχομένοι καὶ ἐτῇ.
φ. 1. ἐπιγένηται τεταρταῖος παύεται. κ. 2.

οά. Οἷσι δέρμα. φ. 1. περιτείνεται
παρφὰ καὶ ξηρὰ. κ. 2.

Τμήμα ἐκλόν.

α'. Οἰζυρεγμία. β. οἰζυρευγμία. μ. πρό-
θιν. κ. 2. φ. 1. μὴ εἰούσα. β.

β'. Νοσηλότερον. κ. 3. φ. 1. νοσηρό-
τεροι. 1. νοσηλότεροι ὑγιεινότεροι. ν. ρ. υ.

ς'. Τὰ νεφρικά καὶ ὁκόσα ἀλγήματα
κατὰ τὴν κύστιν δυσχερῶς ὑψιάζεται καὶ
μάλιστα τοῖσι πρεσβύτησι. β.

ζ'. Ἀλγήματα καὶ εἰδήματα. α. κ. 2.
τὰ. β. λ. ι. κουφὰ. α. ξ. 1. υ. κουφότατα
ισχυρότατα. φ. 1.

ή'. Τὰ γίνόμενα, ἔλκεα. α. υ. D. τοῖς.
σώμασι ἔλκεα. κ. 2. φ. 1.

ια'. Οἷσι νεφροικοῖσι τοῖς διὰ λιθίασιν.
α. ξ. 1. ξ. 2.

ιβ'. Ἰηθέντι ἰαθέντι. κ. 2. ν. ἢν μὴ
μεῖν ἀπολειφθῇ μία. β. υ. διαφυλαχθῇ.
κ. 3. καταλειφθῇ. α. ξ. 2.

ιγ'. Λύσει τὸ νόσημα. κ. 2. φ. 1.

ιδ'. Οἰσθαλμιῶντι. β. μ. ν. κατασχι-
θέντι. α. ξ. 1. ξ. 2. καλόν. ξ. 1. ξ. 2.

ιε'. Ἀκρόποδις αὐξάνεται. β. υ.

κ'. Χυθῆ ἔμπυηθῆναι. ι. ξ. ι. ξ. 2.

κβ'. Ῥήγματα καὶ ἀλγήματα. β. ι. γ.
ρήγματα. κ. 3. D. ἀλγήμα. κ. 3. Κατα-
βαίνει μεταβαίνει. β.

κγ'. Πολὺν χρόνον διατελέσῃ. κ. 3.
ἔχοντα. β. δυσφημίη. β. ἐν τῷ αὐτῷ μελαγ-
χολίης σημείον ἐστί. α. ι. ξ. ι. ξ. 2.

κδ'. Εὐλέρων τῶν λεπτῶν. ξ. 2.

κε'. Εὐρυσίπελας καταχεόμενος. ξ. ι.
κατασχεόμενον. υ. ἐπιχεόμενος. β. γ. φ. ι.
καταχεόμενον. μ. ἔξωθεν καταχύθεν. κ. ι.
καὶ εἴσω τρέπηται. γ. ἢν εἴσω τρέπηται.
κ. 2. ἢν τρέπηθῃ. υ.

κς'. Καύσοισι καυσώδεσι πυρετοῖσι. β.
γ. κ. 3. φ. ι.

κζ'. Οὐκόσοισι. κ. 2. τετέοισι. κ. 2. γ.
ἀθρόως. φ. ι. ἀπάντες. κ. 3.

κθ'. Καταμήνια αὐτῆς. κ. 2. ἐκλιπῇ. γ.

λ'. Πρὸ τῆς ἀφροδισιασμῆς ἀφροδισιάζειν.
κ. 2. φ. ι.

λγ'. Οὐκόσοισι φαλακροῖσι ἐοῦσι. υ. δα-
σεῖς. κ. 3.

λέ'. Τοῖσι ὑδρωπικοῖσι-τὸ δὲ προγεγε-
νέναι ἀγαθόν. α. β. γ. φ. ι.

λς'. Τὴν φλιδέα. ν. βλίδω. β. (τὴν εἶσω
φλίδω τὰς εἶσω τῶν χειρῶν φλίδας φήσιν.)
κ. 3.

λζ'. Οἰδήματα γένεσθαι ἐν τῷ βρόγχῳ
ἔξω ἀγαθόν. α. βρόγχῳ ἔξω. μ. ξ. 2. υ.

λη'. Πλείω πολύν. ξ. 1. ξ. 2. πολλόν. υ.
ἀποτελοῦσι. ν. διασελῶσι τάχιον. κ. 3.

λθ'. Σπασμοὶ γίνονται. ξ. 1. ξ. 2. ἔτω
δὲ γίνεσθαι καὶ λυγμός ἢ ὑπὸ πληρώσεως
ἢ ὑπὸ κενώσεως. υ.

μ'. Πόνος γίνεται. κ. 2. φ. 1.

μά'. Διασημαίνει ἀποσημαίνει. φ. 1.
ἀποσημαίνει. κ. 2.

μς'. Ἦν γένηται. κ. 2. ν.

μγ'. Λειέντως υ. ἐπιγίγνεται οἱ τῷτοι.

μδ'. Πυρετοῦ. κ. 2. ὕδωρ. ξ. 1. ξ. 2. υ.

μέ'. Γίνονται. ξ. 1. ἴσχει. κ. 2. φ. 1.
γίγνεσθαι εἶναι. φ. 1. ἀπόλυνται τελευ-
τῷσι. φ. 1.

μς'. Τουτέοισιν. κ. 2. Χρῆ. κ. 2. ν.
φ. 1. εἶρος. κ. 3.

μθ'. Ἡμέραις. φ. 1. ἀποκαθίσταται. υ.

νά'. Διακοπῇ ἢ ἐμφραχθῇ. ζ. ἐξέφνης.
κ. γίνονται κεῖνται: α. μ. καθίσταται. ξ. 1.

ιβ'. Πονεόντι-ιόντι. κ. 3. φλαῦρον.
φαῦλον. φ. 1.

ιγ'. Αἰσφαλέσται. κ. 2. ἐπισφαλί-
σται. κ. 2. φ. 1 αἱ δὲ μετὰ κλαυθμοῦ.
β. υ.

ιδ'. Οἷσι παθήμασι. β. κακόν. κ. 2.
λ. ξ. 2. φ. 1.

ιε'. Τὰ παθῆ καὶ τὰ μακικά. ξ. 2. ὡς
ἐπὶ τὸ πολὺ. D. ξ. 1. ξ. 2. υ. μετοπάρου.
κ. 2.

ισ'. Αἰσπωληξίην ἀσπωληξίν. κ. 2.

ιη'. Αἰσσοσπῆναι καὶ ἀσσοπέσειν. β. ι.
φ. 1.

ιθ'. Ἐχομένοι. ξ. 2. ἐπιγίγνεται. φ. 1.

ξ'. Φθίνει τὸ σκέλος. κ. 2. κ. 1. φ. 1.
σκέλλος. φ. 1. ἐπιγίγνεται ἐγγίγνεται.
κ. 2. κ. 3.

Τμήμα ἐξδόμον.

β'. Ἐπὶ ὁσπεῶ νοσημάτων. β. νοσησάντι.
λ. υ. φ. 1. νοσῶντι. α. ὁσπέων νοσησάντων. ν.

γ'. Ἐπὶ ἔμετα. η.

δ'. Ἐπὶ ἐν νουτῷ πολυχρονίῃ. κ. 2. ν.

ἀσιτίη καὶ ἄκρητοι ὑποχωρήσεις. κ. 3. χο-
χολώδης ὑποχωρήσις α. ἀσιτίη καὶ ἄκρητοι
ἔμετοι καὶ ἄκρητοι ὑποχωρήσεις. ε. υ.
χολώδεις κακόν. ζ. 1. ζ. 2.

ή. Εἰς ῥήξει φύματος. α. ν. ζ. 2. ἐπὶ
φύματος ῥήξει ἔκκρισις αἵματος καὶ λιπο-
θυμία γίνεται. ν. λειποθυμία. α. η.

ιά. Εἰς πλευρίτιδι περιπλευμονίη. ζ.

2. υ.

ιβ. Εἰς περιπνευμονίη πλευμονίη. υ.
πλευρίτιδι φρεϊτίς. ζ. 1. ζ. 2.

ιγ. Εἰς καύμασιν ἰσχυροῖσι ὅ, τι εἰάν
ἐπὶ καυσάδει πυρετῷ σπασμὸς ἢ τέτανος
γένηται κακόν. κ. 3. διὰ τὸ ἐπὶ ξηρότητι
γίνεσθαι. κ. 3.

ιδ. Εἰς πληγίς. α. πληγίς. κ. 2.

ιε. Εἰς αἵματος πύσει. (κακόν.) Εἰς
πύσ-πύσει, (κακόν.) D. α. β. η. λ. ν. υ. κ. 3.
D. πύελον. σίελον. μ. ζ. 1. ζ. 2. υ. σύε-
λον. α.

ις. Εἰς φλέγματις τῆς ἥπατος λύξ
βήξ. η.

*. Εἰς λήθαργον τρομὸς κακόν. α. β. η.
κ. 2. ζ. 1. υ. ζ. 2. φ. 1.

κ'. Καὶ ἔκλανσις κακόν. ξ. 1. ν. D.

κά. Αἰμορραγίαὶ (κακόν. D. υ. β. ν.

κγ'. Διὰ ὑποχαρῆσει. κ. 3. ν. κακόν.

D. α.)

κδ'. Καὶ ἔκπληξις ἦν εἰς κενεὸν λάσῃ.

α. β. κ. 2. ν. ξ. 1. θανατῶδες. κ. 2. φ. 1.

ἦν παρακῶπῃ. α. ν. ἦν εἰς κενέον. ν.

κή. Α'ποκοπῇ-διακοπῇ ἢ γναθοὶ. β. ν.

ἐν τῷ σώματι. D. ν. ἔχ ὑγιάζεται. ἔτε αὐ-

ξέται ἔτε φύεται. ξ. 1. ξ. 2. υ. η. ι. ἔκ αὐξέ-

ται. κ. 2. φ. 1. ξυμφίεται. ν. D.

λ'. Φλέγμα ἀποκαθαρρέει. κ. 3.

λά. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσι. κ. 2. κ. 3. φ. 1.

σημαίνουσι. ξ. 1. ξ. 2. υ.

λσ'. Ὑπόσασις γίνονται. κ. 2. ξ. 2.

λγ'. Ταραχὴ ἰσχυρὴ ἐστὶ γίνεσθαι. β. κ. 2.

φ. 1.

λδ'. Α'φίστανται. κ. 2. φ. 1. σημαίνει.

β. κ. 2. φ. 1. ἔσεσθαι. D. β. ἐπιγένεσθαι.

α. ὀξείην τὴν ἀρρώσιν. φ. 1.

λέ. Ἐπίσασις ὑπόσασις. κ. 2. κ. 3.

φ. 1. καὶ ὀξείην τὴν ἀρρώσιν ἔσεσθαι. β.

λ. ν.

λς'. Τὰ προειρημένα σημεία σημαίνει.

δ. γ. ῥάχιος καὶ πόνοι τε ὀξείας. β. κ. 2. γ. καὶ γίγνεται. κ. 2. ξ. 1. ξ. 2. καὶ τὰ ἀποσημακτα προσδέχου ἕξω ἔσμενα καὶ τὰ ἀποσημακτα προσδέχου εἴπω. κ. 3.

ζ. Τριταῖος ἀκριδῆς. αφ. νθ'. τριημε. τεταρ. α. η. 1. υ. ξ. 1. ξ. 2.

η. Τὰ ὀξεία τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν ἑξοκτιν. ἡμέρησι. υ. τεσσαρεσκαίδεκα. α. η. 1. ξ. 1. ξ. 2.

θ. Καὶ σφαλγυρή ἔχη. α. η. 1. μ. υ. καὶ ὁδὸν ἐμπίπτει ἐς τὸ περίναιον καὶ κλίνα καὶ τὴν κύσιν, νθ'τον σημαίνει. α. κ. 2. ξ. 2. υ. τὰ περὶ τὴν κύσιν νοσίστι. μ.

ι. Μεταγχολικὸν τὸ πάθος. α. υ. τὸ τοιῆτον γίνεσθαι. γ.

κα. Πρεσβύτερον ὑπερκαθαιρομένον. β. κ. 2. κ. 3.

μα. Ὑφαιμον. D. β. κ. 2. γ. δυσῶδες. ξ. 1. D. περιγίγνεται ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πῦρ τοιούτοις ἐστίν. εἰ δὲ ὁμοῖον ἀμόργη φύη ἀπὸλλυται. ξ. 1. ξ. 2. ἢ τέμνεται. φ. 1. κατὰ φύην καὶ λευκὸν. φ. 1. ἀμοργῆς. υ.

μς. Οἰδύνας ὀφθαλμῶν. β. γ. υ. ἀκρητοποσίη, ξ. 2. ἀκροτοποσίη ἢ λατῖρον ἢ πυρίη

ἡ φλεβοτομή ἵηται. α. φαρμακοποσίη ἀκρά-
τον πωλίτας καὶ λείωτας. β. ν.

μζ'. Ἐὰν βῆξ ἔχη. β. η. ν. ξ. 2.

να'. Ὑγραινόμενα ὑγρῶ κενῶ πληρυνόμενα
αὐτῶ. υ.

νβ'. Ὅκόσοι ἦ' παρ' περιοδυνέουσιν τέ-
τοισι. κ. 3.

νγ'. Τελείοισι ἐὰρ: χρή. μ. ἀφαίρειν. ξ. 1.
συμφέρι. β. υ.

νδ'. Ὑποκείται ἀποκλείεται τραπέντος
τρεπομένων. ν. φ. 1. ἔδ' εἰς ἐτέρην. ν. ξ. 2.
οἷσι ἔδ' εἰς. κ. 3. τῆς νεύου πυρετῶ. β. ν.

νε'. Ἐμπληθῇ εἰς τὸν ἐπίπλεον. κ. 2. φ. 1.
εἰς. υ.

νη'. Ἦν ὑπὸ πυρετῶ ἐχομένῳ οἰδήματος μὴ
εὐόντος ἐν τῇ φάρυγγι πνίξ ἐξαίφνης ἐπιγίνη-
ται καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται ἀλλὰ μόλις θαι-
νάσιμον. β. ξ. 2. ρ. υ. Ut ferè omnes scripti.

νθ'. Τὸ τῶμα ξηραίνει. κ. 2. φ. 1.

ξ'. Μελαβαίνει μελαβάλλει. κ. 3.

ξα'. Πλεῖον ὑγρὸν τὸ μὲν ψυχρὸν ἀνωθεν.
β. ν. υ. ἰδρῶς πολλὸς. φ. 1. πῶλγς. υ. ση-
μαίνει πλεῖον ὑγρὸν ἀπάγειν ἢ τὸ μὲν ἰσχυρὸν
ἀνωθεν. υ. σημαίνει. κ. 3.

*. Ἰδρῶς πολὺς χεόμενος νῆσον σημαίνει. ξ. 1. ὁ ψυχρὸς πολὺν ὁ θερμὸς ἐλάσσω. β. ξ. 2. πολλὴν πῦλυσ. υ.

ξέ. Τῷ μὲν ὑγιαίνουντι ἢν ὑγία. α. ἢν ὑγίει. ι. μ. υ. ξ. 1. ξ. 2. υ.

ξς'. Οῤῥᾶν ὀρήν. β. υ. νοσῶδεςερα νοσε-
ράτερα. υ.

ξζ'. Ὑφίσανται οἶονει. ξ. 1. ξ. 2. δώσεις. μ. ξ. 1. δάτης. ξ. 2. ὑποκάθαραι. υ. ὑποκαθαρῆναι. ξ. 2.

ξη'. Οἰόσοισι ἂν ὑποχωρέη. υ. ν. α. ἢν πλείονα πλείω ἢν ἐλάσσονα ἐλάσσω. ξ. 1. ἐλάσσονος. β. μ. ξ. 2. υ. πλείονα πλείονος. α. μ. ν.

ξθ'. καὶ χολῶδες. D. ν. καλῶς κοιλῶς. ξ. 1. τι. D. ν. ἂν πῦ. ν. μὴ κεκαθαρμένῳ. ν. υ. β.

ό. Βάλειαι βούλη. α. κάτω εὔροα ποίειν ὑγρῆναι τὴν κοιλίην. α. υ. βέλει. ξ. 2.

οά. νῆσος κακόν. ν. ξ. 2.

* Οὐ πλησμονὴ ἔχει λιμὸς οὐκ ἀλλ' ἔδεν ἀγαθὸν ὅ, τι ἂν μᾶλλον τῆς φύσεως ἔη. α. η. ξ. 2.

οδ'. Καὶ δίψα ἔχη. υ. ἔχει. α.

ογ'. Τετέων τῶν σημείων. η. ξ. 2. υ.

οσ'. Ἐπιγίνεσθαι. υ. D.

οζ'. Σφακελισμῶ-σφακελῶ. β. υ. α. γ.

οή'. Ἐπὶ ἔμειψι καὶ καθαρίσι ἄνω. α. β. υ.
ἐπὶ αἵματος ἔμετρε ἐπιγίνεσθαι φθόη· καὶ πύς
καθάρσις ἄνω ἐπίσῃ φθόη. δ. ἐπὶ διασχέσει
η. γ. ζ. 2. Διασχέση. α. τῇ διασχέσει. υ.
(Ἐπὶ αἵματος πλύσει πύς πλύσις καὶ ῥύσις
ἐπὴν δὲ σιάλον ἴσχηται ἀποθνήσκουσιν. α. β.
γ. υ. D.)

οθ'. Ἡ'ν δὲ πουλλύ, πελλῇ. α. τοιῦτο.
πελύ. υ.

Τμήμα ὀγδόον.

α'. Ὅκόςσι. γ. D.

β'. Ὅκόςσισι ἀγαθόν. σημείον. α. κακόν·
σημείον. α. δ. ζ. I. πονηρόν. υ.

ς'. Κρισίμησιν ἡμέραις σφοδραὶ καὶ τα-
χείως. β. α. καὶ πολλοὶ σφόδα. υ.

ς'. Οὐκ μὴ. α. ζ. I.

ERRATA.

IN VARIIS.

Τμῆμα α. αφορ, έ. lege in τῇσι λεπτῇσι η. D. α.
 αφορ. 5. leg. ζ. post ἄχρι αφ κδ'. Τμῆμ. Γ. - αφ. ιθ -
 leg. λά. οδοῦ ποιεῖν, αφ κδ', leg. κέ. αφ. λ et λά. Τμῆ.
 δ'. - αφ. 5' post hunc adde. αφ. ζ, ή. αφ. ία. μετ' ἄλ-
 λως leg. μετ' ἄλλως - αφ. ιβ'. leg. ιγ'; id. ιδ'. leg. ιή. ;
 id. - αφ. ος'. leg. οδ'. - αφ. π'. ὑποχονδριον lege ὑπο-
 γαστριον. κ. 2. φ. I. Τμῆ. έ. - αφ. λά. ἐν ελιφοδομειδῇ,
 leg. ελιβοτομειδῇ. - αφ. ιξ'. δοκίει διὰ τοῦ σώματος
 lege in ιθ'. διὰ τοῦ σώματος. cum eodem ὁκόσαι
 δὲ θυμία κάτω. Τμη 5'. - αφ. λγ'. leg. λδ'. id. - αφ.
 ιά. ἴ τμῆ ή. αφ. 5'. leg. δ' καὶ σφόδρα σφόδρα.



ἸΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

Α' ΦΟΡΙΣΜΩΝ

Τμήμα πρῶτον.

α' **Ο** Βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πείρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ ὁ μόνον ἑαυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιέοντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τὰς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

1. VITA brevis, (1 ars longa, (2 occasio præceps, (3 experientia fallax, judicium difficile. (4 Oportet autem non modò seipsum exhibere quæ oportet facientem, sed etiam ægrum, et (α præsentes, et externa.

1. La vie est courte, l'art est long, l'occasion passe vite, l'expérience est trompense le jugement est difficile. Le médecin doit non-seulement faire ce qui convient; il doit encore faire concourir le malade, et ceux qui l'entourent, et les choses externes.

β'. Ἐν τῇσι ταραχῇσι τῆς κοιλῆς, καὶ τοῖσιν ἐμίτοισι, τοῖσιν αὐτομάτως γινομένοι-

σιν, ἢν μὲν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέρει τε, καὶ εὐφώρας φέρουσιν· ἢν δὲ μὴ, τὸναντίον. ἕτω δὲ καὶ ἡ κενεαγωγείη, ἢν μὲν οἷην δεῖ γίγνεσθαι, γίγνηται, συμφέρει τε, καὶ εὐφώρας φέρουσιν· ἢν δὲ μὴ, τὸναντίον. ἐπιβλέπειν ἔν δεῖ καὶ χόρην, καὶ ὥρην, καὶ ἡλικίην καὶ νέσους, ἐν ἷσι δεῖ, ἢ ἔ.

2. (1 In perturbationibus alvi, et vomitibus (2 spontè ortis, (3 si quidem, qualia oportet purgari, purgentur, confert, et facillè ferunt : sin minùs, contrà. (4 Sic et vasorum evacuatio, si quidem, qualem fieri decet, fiat, confert, et facillè ferunt : sin minùs, contrà. (5 Respicere igitur oportet et regionem, et tempestatem, et morbos, (α in quibus convenit, aut non.

2. Lors des évacuations du ventre et des vomissemens qui ont lieu spontanément, s'il n'y a de purgé que ce qui doit l'être, cela est utile, et on le supporte aisément : autrement il arrive le contraire. Il en est de même de la déplétion de tout vaisseau : si elle a lieu telle

qu'elle doit être, elle est utile, et on la soutient bien; autrement mal. Il faut donc observer le pays, l'âge, la saison, les maladies dans lesquelles les évacuations conviennent ou non.

γ'. Εὐν τοῖσι γυμναστικοῖσιν αἱ ἐπ' ἄκρον εὐεξίαι, σφαλεραί, ἣν ἐν τῷ ἔσχάτῳ ἔωσιν, ἔ γὰρ δύνανται μένειν ἐν τῷ αὐτέῳ, ἔδὲ ἀτρεμέειν· ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀτρεμέουσιν, ἔδὲ τι δύνανται ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται ὅν ἐπὶ τὸ χεῖρον· τουτέων ὅν εἵνεκα τὴν εὐεξίην λύειν συμφέρεται μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναθρέψιος λάσῃ τὸ σῶμα. μὴ δὲ τὰς συμπτώσεις ἐς τὸ ἔσχατον ἄγειν. σφαλερὸν γὰρ· ἀλλ' ὁκοίη ἂν ἡ φύσις ἢ τῷ μέλλοντος ὑπομένειν, ἐς τῆτο ἄγειν. ἀσπύτως δὲ καὶ αἱ κενώσεις αἱ ἐς τὸ ἔσχατον ἄγχσαι, σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ ἀναθρέψεις αἱ ἐν τῷ ἔσχάτῳ ἔσται, σφαλεραί.

3. In gymnasticæ disciplinæ deditis (1) (a boni habitus ad summum progressi, periculosi, si in extremo steterint : (2) non enim possunt in eodem statu manere, neque quiescere. Cum verò non quiescant, neque ultrà possint in melius

proficere, reliquum est ut in deterius ruant. Horum igitur causâ, bonum habitum solvere confert haud cunctanter, quò rursus nutritionis principium sumat corpus. Neque confidentiæ ad extremum ducendæ : (3 periculosum enim : sed qualis natura fuerit ejus qui perferet, eò usque ducendæ. (4 Sic et evacuationes ad extremum ducentes, periculosæ. Et rursus refectiones, cùm extremæ fuerint, periculosæ.

3. L'embonpoint, dans ceux qui se livrent aux exercices du corps, ou à la gymnastique, est dangereux s'il est extrême; car il ne peut rester au même point dans un parfait équilibre. Or, ne pouvant ni demeurer dans l'équilibre, ni recevoir un accroissement salutaire, il doit empirer. Il est donc nécessaire de diminuer promptement cet embonpoint, afin d'obliger le corps à reprendre de nouveau le principe de la nutrition. Mais on évitera de porter la chute au dernier degré, car alors il y aurait du danger : on ira seulement jusqu'au terme dont est susceptible la nature de celui qui doit soutenir *cette diminution*. Car de même que les déplétions pous-

sées à l'extrême sont fâcheuses; réciproquement toute réplétion, portée au même point, est dangereuse.

α'. Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δίαιται, καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσιν αἰεὶ πάθει, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσι ἢ μὴ ἐπιδέχεται, σφαλεραί· καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔσχατον λεπτότητος ἀφιγμέναι δίαιται, χαλεπαί. καὶ γὰρ αἱ πληρώσεις αἱ ἐς τὸ ἔσχατον ἀφιγμέναι, χαλεπαί.

4. (1 Tenuis et severiori normæ adstrictus victus, et in longis morbis semper, (2 α et in acutis, ubi non convenit, periculosus. (3 Et rursus ad extremum tenuitatis progressus victus, difficilis. (4 Nam et repletiones ad extremum progressæ, difficiles sunt.

4. Un régime peu substantiel et trop strict est toujours dangereux dans les maladies longues, et même dans les aiguës où il ne convient pas; pareillement la diète poussée à un extrême degré de sévérité, est fâcheuse; car la réplétion elle-même parvenue au dernier point, est dangereuse.

ε'. Εἴ τι λεπτοῖσι διαίτησιν ἀμαρτάν-

νοῦσιν οἱ νοσέοντες · διὸ μᾶλλον βλάπτονται.
 πάν γὰρ τὸ ἁμάρτημα, ὃ ἂν γίνηται, μέγα
 γίνεται μᾶλλον (ἐν τῇσι λεπτοῖσι) ἢ ἐν τῇσιν
 ὀλίγων ἀδροτέρησι διαίτησι. Διὰ τῆτο καὶ τοῖ-
 σιν ὑγιαίνουσι σφαλεραί αἱ πάν λεπτὰ καὶ
 καθεσθηκυῖαι καὶ ἀκριβέες δίδονται, ὅτι τὰ
 ἁμαρτανόμενα χαλεπώτερον φέρουσι. Διὰ
 τῆτο ἔν αἱ λεπτὰ καὶ ἀκριβέες δίδονται σφα-
 λεραί ἐς τὰ πλείεστα τῶν μικρὸν ἀδροτέρων.

5. (1 In tenui victu delinquant ægri :
 (2 ob id magis læduntur. Omne enim de-
 lictum, quod admittitur, multò majus
 fit (in tenui) quàm in paulò pleniore
 victu. Propterea etiam sanis periculosus
 est valde tenuis, ponderatus et exqui-
 situs victus ; quia delicta graviùs tole-
 rant. Ob hoc igitur tenuis et exquisitus
 victus periculosus magis, quàm paulò
 plenior.

5. Les malades sont trompés *dans leur at-
 tente* par un régime trop austère, et ils en re-
 çoivent d'autant plus de dommage ; car toute
 faute qui en naît, devient plus grave par une
 diète sévère, que par une nourriture un peu

plus substantielle. En outre un régime mince, trop strict et toujours régulier, est même dangereux aux gens en santé ; car ils soutiennent ainsi avec plus de peine, les écarts qu'ils peuvent faire. Un régime peu substantiel et trop strict, est donc en général plus dangereux qu'un régime un peu plus nourrissant.

5'. Ες δὲ τὰ ἑσχάτα νοσήματα, αἱ ἑσχάται θεραπεῖαι ἐς ἀκριβεῖν κράτισται.

6. (α Ad extremos morbos, summæ curationes, quoad rectitudinem, sunt optimæ.

6. Dans les maladies très-aiguës, les traitemens les plus prompts sont, à cause de l'exactitude, ceux qu'il faut préférer.

Ζ'. Ὅκ᾽ ἐν ᾧ κατόξυ τὸ νόσημα, αὐτίκα τῆς ἐσχάτης πόνος ἔχει, καὶ τῇ ἐσχάτως λεπιοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρέεσθαι. Ὅκ᾽ δὲ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδροτέρως διαιτᾶν, τοσοῦτον ὑποκαταβαίνειν, ὅσον ἂν ἡ νῦντος μαλθακώτερη τῶν ἐσχάτων ᾖ.

7. (1 Ubi igitur peracutus est morbus, (2 statim extremos habet labores, et (α extremè tenuissimo victu uti necesse est. Ubi verò non, sed plenius cibare licet,

tantum à tenui recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit.

7. Lorsque la maladie est très-aiguë, elle a sur-le-champ les symptômes les plus violens ; il est alors nécessaire de faire usage de la diète très-exacte ou très-tenue. Mais lorsqu'il n'en est pas ainsi, et qu'il est permis de nourrir avec plus de liberté, on se montrera indulgent à proportion que la maladie est plus éloignée de l'extrême degré.

ή. Ο'πόταν δέ ακμάζη τό νόσημα, τότε καὶ τῇ λεπιοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρῆσθαι.

8. (1 *Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse est.*

8. Quand la maladie est dans toute sa vigueur, employez la diète la plus exacte ou très-tenue.

θ'. Συντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέοντα, εἰ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆς νόσου, καὶ πρότερον ἐκείνος ἀπαυδῇσει πρότερον, καὶ εἰ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ, ἢ ἡ νόσος πρότερον ἀπαυδῇσει καὶ ἀμβλυνεῖται.

9. Considerare oportet etiam (α *ægro-*

tantem, num ad morbi vigorem victu sufficiet, (1 (*b* et an prius ille deficiet, et victu non sufficiet, an morbus prius deficiet, et obtundetur.

9. Mais il faut aussi savoir conjecturer par rapport au malade, si par son régime il pourra soutenir la violence de la maladie, ou s'il sera obligé de céder le premier, et ne résistera point au régime; ou bien la maladie cédera-t-elle, et s'affaiblira-t-elle la première?

Ι. Οὐκ ὅσοισι μὲν ἔν αὐτίκα ἡ ἀκμὴ, αὐτίκα λεπτῶς διαιτᾶν· ὁκὼσοισι δὲ ἐς ὕστερον ἡ ἀκμὴ, ἐς ἐκεῖνο καὶ πρὸ ἐκείνου μικρὸν ἀφαιρετέον. Ἐμπροσθεν δὲ πιωτέρας διαιτᾶν, ὡς ἂν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

10. (*a* (1 Quibus igitur statim vigor morbi adest, statim tenuiter alendi. Quibus verò in posterum vigor, (2 his ad illud, et paulò ante illud *tempus* subtrahendum. Ante verò uberius alendum, ut sufficiat æger.

10. Lorsqu'une maladie se montre tout à coup avec violence, employez la diète exacte ou tenue; mais si la violence doit avoir lieu

plus tard ; dans ce temps-là , et un peu avant , retranchez des alimens ; au commencement insistez davantage sur la nourriture, afin de soutenir le malade.

ια. Ἐν δὲ τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποστέλλεσθαι χρή· τὸ προστιθέναι γὰρ, βλάβη. καὶ ὅσα κατὰ περιόδους παροξύνεται, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποστέλλεσθαι χρή.

II. (I In exacerbationibus cibum (a subtrahere oportet. Exhibere enim , noxium est. Et quæcunque per circuitus exacerbantur, in exacerbationibus subtrahere oportet.

II. Dans le temps du paroxysme retranchez toute nourriture, car il serait alors nuisible d'en donner ; il faut de même la supprimer dans les exacerbations des maladies dont les accès sont périodiques.

ιβ'. Τὰς δὲ παροξυσμὸς καὶ τὰς καταστάσεις δηλώουσιν αἱ νύκτες, καὶ αἱ ἡμέραι τῆς ἔτεος, καὶ αἱ τῶν περιόδων πρὸς ἀλλήλας ἐπιδόσεις, ἥν τε καθ' ἡμέραν, ἥν τε παρ' ἡμέραν, ἥν τε καὶ διὰ πλείονος χρόνου γίγναι.

ται. ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἐπιφαινομένοισιν, οἷόν ἐν πλευριτικοῖσι πτύελον, ἢν αὐτίκα ἐπιφαίνεται ἀρχομένου, βραχύνει· ἢν δ' ὕστερον ἐπιφαίνεται, μηκύνει. καὶ ἔρα, καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρώτες, καὶ εὐκριτα, καὶ δύσκριτα, καὶ βραχέα, καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα, ἐπιφαινόμενα δηλοῖ.

12. (α(1 Exacerbationes autem et constitutiones indicabunt morbi, et anni tempora, et periodorum ad invicem collata incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive longiore fiant tempore. Sed etiam iis quæ *mox* apparent *eadem* indicatur, velut (2 in pleuriticis sputum, si statim appareat veniente *morbo*, eum abbreviat; si verò postea appareat, producit. Et urinæ (3, et alvi excrementa, et sudores, cùm apparent, vel iudicatu faciles, vel difficiles, (4 vel breves, vel longos morbos fore indicant.

12. Or, les maladies ainsi que les saisons de

L'année et les accroissemens des accès périodiques, comparés les uns aux autres, soit qu'ils aient lieu chaque jour ou de deux jours l'un, ou à de plus longs intervalles, feront connaître les paroxismes et leur constitution. Cela est aussi indiqué par les épiphénomènes, comme les crachats qui surviennent dans la pleurésie ; s'ils paraissent dès le commencement de la maladie, ils l'abrègent ; mais s'ils se montrent plus tard, ils la prolongent. Pareillement les urines, les déjections, les sueurs, annoncent la facilité ou la difficulté de la crise, la longueur ou la courte durée de la maladie.

ιγ'. Γέροντες εὐφρότατα νοσήειν φέρουσι· δεύτερον, οἱ καθισθηκότες· ἥμισθα, μειράκια· πάντων δὲ μάλιστα, παῖδιά· τέτων δὲ αὐτέων, ἅπερ ἂν τύχῃ αὐτὰ ἰαυτῶν προθυμότερα εἶόντα.

13. Senes facillimè jejunium ferunt, secundò (a) ætate consistentes, minimè adolescentes, (b) omnium minimè pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.

13. Les vieillards sont ceux qui supportent

le plus aisément la diète ; puis après eux , les hommes d'un âge fait ; mais les jeunes gens la supportent moins bien , surtout les enfans , et parmi ces derniers , moins encore ceux qui ont le plus de vivacité.

ιδ'. Τα αὐξανόμενα πλείστον ἔχει τὸ ἔμφυτον θερμόν· πλείστης ἔν δέϊται τροφῆς· εἰ δὲ μὴ, τὸ σῶμα ἀναλίσκεται. γέρονσι δὲ ὀλίγον τὸ θερμόν· διὰ τῆτο ἄρα ὀλίγων ὑπεκκαυμάτων δέονται· ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσθέννυται· Διὰ τῆτο καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρονσιν οὐχ ὁμοίως ὀξέες· ψυχρόν γὰρ τὸ σῶμα.

14. (1 Quæ crescunt , plurimum habent calidi innati : plurimo igitur egent (a alimento : sin minùs , corpus consumitur. (b Senibus autem paucus calor : propterea paucis fomitibus indigent , à multis enim extinguitur. Idcirco (2 etiam febres senibus non similiter acutæ. Frigidum (3 enim est corpus.

14. Ceux qui croissent ont beaucoup de chaleur naturelle ; c'est pourquoi ils ont besoin d'une grande quantité de nourriture , autre-

ment le corps se détériore. Les vieillards ont besoin de moins de nourriture, parce que la chaleur naturelle qui est moins grande, seroit éteinte par des alimens trop copieux; c'est aussi pourquoi, dans les vieillards, les fièvres ne sont point aiguës au même degré, car le corps est froid.

14. Αἱ κοιλίαι χειμῶνος καὶ ἡρος θερμότεραι φύσει, καὶ ὕπνοι μακρότατοι. ἐν ταύτησιν οὖν τῇσιν ὥρησι καὶ τὰ προσάρματα πλείω δοτέον. καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμὸν πλεῖον ἔχουσι· τροφῆς οὖν πλείονος δέονται. σημείον, αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ ἀθληταί.

15. (1 *α* Ventres hyeme et vere naturæ sunt calidissimi, et somni longissimi. (2 *In* his igitur temporibus etiam alimenta plura exhibenda. Innatum enim calorem majorem habent. Nutrimento igitur copiosiore indigent. Indicium sunt, (*b* ætates et (*c* athletæ.

15. L'estomac est naturellement très-chaud en hiver et au printemps, et le sommeil est très-long. Il faut donc prendre plus d'alimens dans ces deux saisons, car la chaleur naturelle étant plus grande, on a besoin de

plus de nourriture : témoins les jeunes gens et les athlètes.

15'. Αἱ ὑγραὶ δίδονται πᾶσι τοῖσι πυρεταίνουσι ζυμφεύρουσι· μάλιστα δὲ παιδίοις καὶ τοῖσιν ἄλλοις τοῖσιν οὕτως εἰθισμένοις διατᾶσθαι.

16. (α (1 Victus humidus febricitantibus omnibus confert, (2 maximè verò pueris, et aliis tali victu uti consuetis.

16. Le régime humectant convient à tous les fébricitans, mais surtout aux enfans, et à ceux qui sont habitués à ce régime.

17'. Καὶ οἷσιν ἅπαξ, ἢ δὶς, καὶ πλείω, ἢ ἐλάττω, καὶ κατὰ μέρος, δοτέον δέ τι καὶ τῷ ἔθει, καὶ τῇ ᾠρῇ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἐλικίῃ.

(17. (1 Et quibus semel aut bis, et plura vel pauciora, et per partes offerri conducat, videndum. (2 (α Concedendum autem aliquid et consuetudini, et tempestati, et regioni, et ætati.

17. Et si l'en doit prescrire par jour une ou deux fois des alimens, soit abondamment, soit

en petite quantité , soit par petites portions ; il faut avoir égard à l'habitude et à l'âge du malade ; à la saison et au pays.

ιή. Θέρεος, καὶ φθινοπώρῃ, σιτία δυσφορώτατα φέρουσι χειμῶνος, ῥηίστα. ἤρος, δεύτερον.

18. Æstate (α et autumnno cibos difficillimè ferunt : (1 hyeme facillimè , deinde vere.

18. Dans l'été et l'automne on digère difficilement : au contraire , on digère très-bien en hiver , puis au printemps.

ιθ'. Τοῖσιν ἐν τῇσι περιόδῳσι παροξυσμοῖσι, μηδὲν δίδόναι, μηδ' ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῶν προσθεσίων, πρὸ τῶν κρίσιων.

19. His qui per circuitus exacerbantur (α nihil dare oportet, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante iudicationes.

19. Durant les accès périodiques, il ne faut rien donner, ne rien forcer , mais soustraire des alimens avant la crise , ou vigueur du paroxysme.

κ. Τὰ κρινόμενα (α), καὶ τὰ πεκνυόμενα ἀρτίως, μὴ κινέειν, μηδὲ νεωτεροποιεῖν, μήτε φαρμακείησι, μητ' ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, ἄλλ' ἐᾶν.

20. Quæ judicantur et judicata sunt perfecte, neque movere oportet, neque (1 innovare, sive purgantibus, sive aliis irritamentis, (2 sed sinere.

20. Lorsque la crise se fait, et lorsqu'elle est faite, il ne faut rien exciter, ne rien innover, soit par des médicamens, soit par d'autres irritans, mais laisser tout en repos.

κα. Α" δεῖ ἄγειν, ὅπου αὐτὰ μάλιστα πέ-
πη, ταύτῃ ἄγειν, διὰ τῶν ὑποφερόντων χω-
ρίων.

21. Quæ ducere oportet, (1 quò maximè vergant, eò ducenda, (2 per loca convenientia.

21. Les humeurs à évacuer, doivent être dirigées particulièrement vers les lieux où elles tendent, et par les voies convenables.

κβ. Πύσινα (α) φαρμακεύειν, καὶ κινέειν, μὴ ὡμά, μηδὲ ἐν ἀρχῇσι, ἢ καὶ μὴ ὀργᾷ. τὰ δὲ πλείστα ἐκ ὀργᾷ.

22. (1 Concocta purgare et movere oportet, (2 non cruda, (3 neque in principis, (4 nisi turgeant. Plurima verò non turgent.

22. L'on ne doit purger et émuouvoir que *les humeurs qui ont subi la coction*, et point celles qui sont crues; ni dans le principe, à moins qu'il n'y ait turgescence: mais ordinairement il n'y a point turgescence.

κγ'. Τὰ χαρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' ὡς ἂν χαρὲν οἷα δεῖ, καὶ φέρει εὐφώρας. καὶ ὅς δεῖ μέχρι λειποθυμίας ἄγειν, καὶ τὸτο ποιεῖν, ἣν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

23. (1 Quæ prodeunt non copiâ sunt æstimanda, sed si prodeant qualia oportet, et facile tolerat. (2 (α Et ubi ad animi deliquium ducere oportet, hoc (3 etiam faciendum, si æger sufficiat.

23. Les évacuations ne doivent pas être jugées d'après leur quantité, mais si elles ont lieu comme il convient, et si on les supporte aisément. Lorsqu'il est besoin de les porter jusqu'à défaillance, il faut le faire, si les forces du malade peuvent y suffire.

κδ'. Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν ὀλιγάκις,
καὶ ἐν ἀρχῇσι, τῇσι φαρμακείησι χρέεσθαι,
καὶ τὸτο προεξευκρινήσαντας ποιεῖν.

24. (1 In acutis affectionibus raro, et
in (2 principiis, purgante utendum,
atque hoc (3 diligenti prius adhibitâ
cautione faciendum.

24. Il faut purger rarement dans les mala-
dies aiguës, même dans les commencemens, et
ne le faire que d'après un jugement bien établi
auparavant.

κε'. Ἡν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαί-
ρωνται, συμφέρει τε, καὶ εὐφόρως φέρουσι
τὰ δι' ἐναντία, δυσχερῶς.

25. Si, qualia purgari oportet, pur-
gentur, confert et facile tolerant : si verò
contraria, difficulter.

25. Si l'on évacue ce qui doit l'être, cela
est utile ; et on le supporte aisément : mais
difficilement si c'est le contraire.

NOTAE
IN APHORISMOS
HIPPOCRATIS,

*Qui difficiliores nec adeo obvii sensus
sunt.*

SECTIO PRIMA.

APHOR. I. (1 LOC. in Hom. l. 1. = (2 Loc. in Hom. liv. 1. — II. Præd. xxix, 8. — I. Morb. iv, 1, 2. = (3 Humor. j, 6, 7. — Artic. ix, 7. = (4 I. Epidem. ij, 93, 94. — VI. Epid. ij, 78, ad 82. = (a Cels. iij, c. 2, s. 3, p. 151, l. 24. = (b Cels. vj, c. 3, s. 1, p. 20, l. 10. = *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 53-54, edit. Paris.

Ἀφορισμὸς aphorismus. Ab ἀφορίζω deducitur: quod verbum significat *finio, termino*; item *distinguo et discerno*; nec non *separo ac divido*; et *definio ac breviter rem concludo et expolio* docent lexica. A tertia significatione arabes *divisorum sermonum* libros, alii *divisiones aphorismos* sunt interpretati.

Ἀφορίζω significat etiam *eligo*; ex qua significatione aphorismus appellatur sententia selecta continens in se magnam vim. Sanctor.

APHOR. II. (1 I. Prædict. xx, 8. — Verat. 9. — (2 I. Epid. ij, 47. — (3 Aphor. vj, 15. — Aphor. j, 25. — (4 Humid. Us. v, 11. — Vict. Acut. v, 24. xvj, 5. — (5 Aphor. j, 17. — Humor j, 14 ad 19. — II. Morb. Mul. iv, 1, 11. — Epist. Democ. ad Hipp. 30 ad 34. — Orat. Thess. filii, 130. — I. Diæt. ij, 12, 13 et sequ. — (a Cels. j, præf., p. 23, l. 4. — (b Cels. iij, c. 2, s. 2, p. 142, l. 20. — (c Cels. v, c. 2, s. 3, pag. 309, l. 14. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 82, 346, 434, 472, 671; tom. iij, p. 100.

APHOR. III. (1 Epistol. Hipp. ad Damag. ij, 209. — (2 IV. Morb. x, 15, 16. — (3 Aph. ij, 51. — (4 Aphor. ij, 22, 51. — Vet. Medic. xvij, 1. — Vict. Acut. xvij, 10. — (a Cels. ij, c. 1, s. 1, p. 58, l. 16. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 137, 420; tom. ij, pag. 385, 613.

Ἐνέξια est *virium excessus*, plethoram per se inducens, nisi retundatur. Hoc enim verbo non omninò optimam sanitatem intelligit Hippocrates. Sic etiam sub nomine gymnasticæ, non exercitium salubre, est intelligendum, sed diligens illa corporis cura, quâ, spretis officiis civilibus, qui abutebantur, jure ab antiquis Philosophiæ præceptoribus explosi sunt, unde

non in exercitantibus scribendum erat, sed in gymnasticæ deditis.

APHOR. IV. (1 Aph. j, 5. — Præcept. xj. 4. = (2 Vict. Acut. xx, 6, 7. = (3 Aph. j, 3: ij, 51. = (4 Aph. vj, 39. — Æginet. lib. j, c. 32. = (a Cels. iij, c. 2, s. 6, p. 169, l. 20, et p. 171, l. 20. — Vide van-Swieten, t. ij, p. 98, 503; t. iij, p. 344.

Tenue, exquisitè tenue, summè tenue, tria sunt victûs genera quæ distinxit Hippocrates, pro vehementiâ morbi ad vires dimicantis Naturæ comparatâ, in libro *de Victûs ratione in Morbis acutis*. Sic autem est intelligendus hic aphorismus. *Diætâ exquisitè tenuis in morbis longis semper, in acutis, ubi non convenit, periculosa est. Insuper omnis diætâ ad tenuitatis extremum deducta semper officit. Sed et repletio nimia non caret incommodis.*

APHOR. V. (1 Aph. j, 4. = (2 Vet. Medic. xv, 9 ad 14. — Vict. Acut. xx, 6, 7, 11. — Vide van-Swieten, tom. ij, p. 98, 503, tom. iij, p. 343.

Virium prostratio, acrium accumulatio, humorum putredo, tria sunt severe nimis diætæ incommoda, quibus graviora nulla vel ab ipsâ ingurgitatione pertimescenda sunt. Ars enim vacuare potest, replere verò solius

est naturæ. -- *Vide* Boethaav., Inst. Med., § 756, 757.

APHOR. VI. (a Cels. ij, c. 2, s. 2, p. 102, l. 1. — (b Cels. IV, c. 1, s. 7, p. 271, l. 23. — Loc. in Hom. xxvj, 14; lv, 7 ad 11. — Articuli. j, 9. — *Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 420; tom. ij, p. 613; tom. iij, pag. 67, 569.

APHOR. VII. (1 Aph. 4. 10. = (2 I. Epid. iij, 29, 33. — II. Epid. j, 24. = (a Cels. iij, c. 2, s. 4, p. 158, l. 2. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 64, 100, 330, 411.

APHOR. VIII. (1 Viet. Acut. xvij, 11; xv, 1 ad 6. — Aph. ij, 29. — Gal. de Opt. Sect. ad Thirasy. cap. 39. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 23; tom. ij, p. 66, 100.

Hippocr. de vict. acut. n^o. 17. ἀναίξει τὸ ἔσσημα, morbus est in vigore, dicitur, quando morbus est in eo temporis puncto, quod vocatur *status*. Sciendum enim est, quod numerentur in morbis tempora potissimum quatuor: *principium* ἀρχή, quando sanitas et morbus incipit, qui animadvertitur per aliqua symptomata; 2^o. *augmentum* sive *incrementum*, item *progressus*, et *adscensus*, ἀύξσις, ἐπιδόσις, ἀναάσις, ἑπάρμη. Quando morbus magis magisque ingravescit, se per symptomata exerens aut vehementiora, aut frequentiora; 3^o. *status* morbi vel *vigor* et

summa vehementia, item *ῥαθυμία*, ubi morbus pro aliquod tempus, augmento facto, manet, estque maximus; post quod tempus vel moritur æger vehementia morbi victus, vel morbus declinare incipit; 4^o. *declinatio*, seu decrementum, *παράμειν, κατάσκασις*, comprehendit omne illud tempus, quod est ab *ἄκμῃ*, ad imminutionem seu ad finem morbi; cuius nempe vehementia se remittit, omniaque symptomata mitiscunt, usque dum vita existat maxima; morbus minimus.

APHOR. IX. (1 Viet. Acut. xix, 5 ad 10. — Aph. j, 23. — Humor. iij, 87. = (a Cels. iij, c. 2, s. 2, p. 143, l. 1. = (b Cels. ij, c. 2, s. 2, p. 95, l. 16. = (c Cels. iij, c. 2, s. 4, p. 156, l. 9. = (d Cels. v, c. 2, s. 7, p. 341, l. 13. = (e Cels. iij, c. 2, s. 2, p. 142, l. 24. — Van-Swieten, tom. ij, pag. 98.

APHOR. X. (1 Viet. Acut. xix, 8, 9. = (2 Affect. xlij, 3. = (a Cels. iij, c. 1, s. 1, p. 135, l. 22. — Vide van-Swieten, tom. ij, p. 100.

APHOR. XI. (1 Aph. j. 19. — de Naturâ Human. xvij, 31. — Humor. iij, 82. — Loc. in Hom. xxxix, 1. — Affect. xlij, 3; lij, 14. — Viet. Acut. x, 2. = (a Cels. iij, c. 2, s. 2, p. 145, l. 28, et p. 150, l. 15. — Coelius Aurelianus de Morb. Acut. l. ij, pag. 29. — Vide van-Swieten, tom. ij, p. 91, 503. •

Περίοδος seu *circuitus* est quo morbus aliquis ab uno puncto ad idem redit punctum; ut si hodiè ab hora prima te invadat febris, et redat post biduum, vel circa eandem vel aliam horam, vocatur totum illud tempus *periodus*. Periodus in duas partes principes, in accessionem et remissionem, dividitur. *Accessio*, seu invasio, quæ etiam irritatio et paroxysmus dicitur, in febribus tempus difficillimum totius periodi, continet partes seu tempora quatuor; 1^o. principium, quod ἀρχή et ἐπισήμασιαν vocant græci, cum primum incipit frigere corpus; et hæc pars propriè *accessio* dicitur; 2^o. inæqualitatis tempus, quando partim friget, ut in exterioribus, partim etiam calet in interioribus; 3^o. augmentum, quando totum corpus calet, et præcipuè circa pectus; 4^o. ἑκστασις seu ἀκμή, quando est jam in summo vigore et quasi stat. Remissio ὑνεσις, aliquando habet partem unam, aliquando duas. *Eras.* vide Σύνοψις πυρετῶν, περὶ τῆς πυρετῆς τρίταις, pag. 119.

Vide in omnes hosce Aphorismos de victu in acutis luculentissima Th. Glass, Medici Angli, Commentaria, Comm. v. in quo optimè, et ad exquisitam, tum Hippocratis doctrinam, tum Recentiorum theoriam, rem omnem Vir sagacissimus exposuit.

APHOR. XII. (1 II. Epid. j, 26 ad 30. = (2 Aph. v, 8, 15. — Prænot. xij, 1, 12; xiv, 11. — Coac. Pr. iij, 132, 143. — III. Morb. xxj, 33, 34. — Affect. viij, 19. — Vict. Acut. vij, 1. = (3 Aph. iv, 71. — Coac. Pr. v, 82. — I. Epid. iij, 10. = (4 Vict. Acut. vj, 6, 7. = (a Cels. iij, c. 2, s. 2, p. 145, l. 24.

Singula et universa hæc signa præcipuum constituunt Prognoseôn Hippocraticarum argumentum, quæ in capita distribuere daretur et, dilucidius adhuc, sed propriis observationibus non adeo dives Prosper Alpinus, lib. *de præsagiendâ vitâ et morte ægrotantium*. Lege hic attentè quidquid de hoc aphorismos scripsit in notis, doctè ut solet, Cl. de Villebrune.

APHOR. XIII. (a Cels. j, præf., p. 23, l. 28, et p. 24, l. 1, et p. 1, l. 7. = (b Cels. j, præf., p. 23, l. 28. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69; tom. ij, p. 99.

Senes ad existentiam solam aluntur; ætate consistentes etiam ad robur; pueri verò ad existentiam, robur et incrementum. In rigido sene languens vitalis circuitus paucissima absumit.

APHOR. XIV. (1 Art. xij, 2. — I. Diæt. xxvij, 5, 6, 7. — Natur. Hum. xxiv, 7, 8. = (2 Aph. iij, 27. — I. Morb. xx, 15, 16; xxj, 16. = (3 I. Diæt. xvij, 9, 10, 11; xxvij, 20. — I. Morb.

xx, 14, 24. — Morb. Sac. x, 10. = (a Cels. j, c. 1, s. 14, p. 39, l. 11. = (b Æginet. j, 23. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69; t. ij, p. 99, 733; t. iij, p. 70.

Languet in senibus vis circuitûs et impetus humorum. Secretiones crudæ sunt et glutinosæ. Hinc senes frigent et ad sensum et ad thermometer.

APHOR. XV. (1 Humor. v, 4. — Aer. Aq. Loc. ij, 2. = (2 Aph. j, 18. — Salub. Diæt. j, 2, 26. — IV Morb. xvij, 9. = (a Cels. j, præf., p. 2, l. 1, et p. 39, l. 23. = (b Cels. j, præf., p. 23, l. 28. = (c Cels. j, præf., p. 24, l. 3. *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 101.

Ventres hyeme ad thermometer calidiores non sunt. Sensus verò docet ventriculum hyeme ad capescendos cibos plus alacritatis et appetitûs experiri. Leviores sentimur, licet gravitas ad stateram aucta sit; somno longiori et placidiori quimur; æqualior sit succorum nutrientium applicatio; vires organorum autæ alimenta validiora sibi postulant, non copiam eorum majorem. Juvenes et exercitati plus absumunt, plus ergò alendos se postulant.

APHOR. XVI. (1 Insomn. xv, 13, 15, 16, 17. — III. Morb. xxij, 11. — Loc. in Hom. xxxix,

1. = (2 Salub. Diæt. ij, 5 ad 11. = (a Cels. iiij, c. 2, s. 4, p. 155, l. 21. — *Vide* Boerhaav. Aphor. practici, 587. Van-Swieten. tom. ij, p. 92, 196.

In febre major solidorum tensio, celerior humorum agitatio; hinc liquidissimi expressio, reliqui incrassatio, sitis, caloris productio, victum humidum postulant.

APHOR. XVII. (1 Vet. Medic. xvij, 4, 5, etc. — Viet. Acut. v, 19, 20; xix, 6. = (2 Aph. ij, 49, 50. — I. Diæt. ij, 10 ad 21. — III. Diæt. j, 10, 13 ad 15. — Natur. Hum. xvij, 30 ad 34. — Humor. j, 14; viij, 23. — Sal. Diæt. ij, 10. = (a Cels. j, c. 1, s. 4, p. 29, l. 23; iiij, c. 2, p. 142, l. 19; et iiij, c. 2, s. 3, p. 150, l. 21, 26. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 101.

APHOR. XVIII. (1 Aph. j, 15. — Humor. viij, 24. = (a Cels. j, c. 1, s. 14, p. 40; l. 7, 15. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 101.

APHOR. XIX. Aphor. j, 11. — Hum. iiij, 82. = (a Cels. iiij, c. 2, s. 2, p. 145, l. 26; iiij, c. 2, s. 3, p. 150, l. 1, 5; iiij, c. 2, s. 4, p. 157, l. 15.

APHOR. XX. (1 Humor. iiij, 83. — Natur. Hum. xix, 8. — II. Epid. j, 17. = (2 Aphor. ij, 29. — *Vide* Authores de Crisibus passim. — Van-Swieten, tom. ij, p. 53, 81 et 369.

Crisis seu *judicatio*, item *judicium spiritus*

(*a nō ipso judico, secerno*) dicitur subita, seu repentina, certo tempore contingens, permutatio morbi, sive in melius, sive in deterius, in sanitatem vel in mortem. Morborum insignes mutationes, seu in melius, deteriusve fiant, judicia nominantur, quibus videlicet jus dici solet de controversiis naturæ adversus morbos. Bagliv., p. 251. *Judicari* (*ζῆναι*) *in morbis est, quum morbi augeantur, aut marcescunt, aut in alium morbum transeunt, aut desinunt.* Hipp. de affect., n°. 8. *Judicatio verò morbi dissolutio est.* Præcept. n°. 12. Indè crisis generatim sumta morbi, judicationem quamlibet significat, vel per medicamenta apta, sive mutata est quoad molem figuram, cohæSIONEM, mobilitatem, inertiam, materia morbi aut minus recedat a statu salubri, minus lædat, adeoque impetum morbi imminuat. Cocta jam appellatur (*πεπρω*) status autem morbi ille, quo hæc ita fiunt, appellatur *coctio, maturatio* vel *πεπασμός*. Cognoscitur ille status morbi et materiæ 1°. ex quiete morbi, ejusdem que decremento, viribus vitæ interim constantibus, vel et incrementibus. 2°. A sedatione imminutioneque symptomatum, concomitante vitæ robore. 3°. A restitutione functionum in integrum. 4°. Ex similitudine humorum circulantium, secretorum, excretorum, excrementorumque, cum naturalibus.

Boerh. J. M. S. 992. seq. conf. Hippoc. de Vict. Med., n. 32 et seq. (c) Vid. Σύνοψις πυρετῶν, (κρίσις.) Pag. 22.

Turgere, ὀργάνῳ undē ὀργασμὸς *turgescencia*, vel *turgencia*, propriè dicitur de animalibus libidine titillatis, quando ob concubitus desiderium, impetuosiore agitationem ac commotionem humorum, intensioremque corporis æstum patiuntur. quam ut stare loco queant. Et hac voce huc translata videtur Hippocrates designare voluisse motum aliquem subitaneum in humoribus, qui inflantur et exitum querunt, vel sunt sese præcipitaturi ad partem aliquam, quales sunt valdè mobiles acres biliosi: Quod cognoscitur si ægri mox in principio morbi sint inquietissimi cum summa præcordiorum angustia, nausea ructibus nidoris, conatu vomendi ac dejiciendi, dolore vago totius corporis. Crisis autem stricte accepta pro felici morbi solutione habetur. Est autem evacuatio sufficiens et legitimo tempore contingens peccantis materiæ, quæ cocta se ad exitum autem rite præparata fuit. Hæc evacuatio per certâ corporis emunctoria peragitur. Solemnès viæ sunt, per sudores, alvum, urinam, sputum, hæmorrhagiam, abscessum.

ΑΡΗΘ. XXI. (1 Humor. j, 2, 24; iiij, 85. =

(2 VII. Epid. xxxij, 4. — Aphor. vij, 61. — Loc. in Hom. xxxij; iv, 11, 12. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 131, 369, 711; tom. iij, p. 102.

APHOR. XXII. (1 Aph. iv, 13. — Humor. iij, 84. — Humor. j, 3. — V. Epid. xxv, 12. — VII. Epid. xxxij, 1. = (2 Aph. vij, 68. = (3 Aph. j, 24; ij, 29. — Loc. in Hom. xxxvii, 9, 10. — VII. Epid. xxxij, 5. = (4 Aph. iv, 1, 10; v, 29. — 1. Morbor. Mulier. lxij, 11. —

Ut clarius percipiamus mentem aphorismi et expositorum ejus, necesse est, ut videamus, quid dicatur in morbis *crudum* et *cruditas coctum* seu *concoctum* et *coctio* seu *concoctio*, *turgere* et *turgentia* sive *orgasmus*. Materia morbi prædita ea mole, figura, cohæ- sione, mobilitate, inertia ut faciat, vel augeat, morbum appellatur *cruda* (*ἄστος* et *ἐνώστος*). Iste autem status morbi, in quo hæc ita se habet, dicitur *cruditas ἄστος* morbi, quod obtinet æque in morbis, ubi tota massa humorum infecta est, quam in iis, ubi una modo pars tali materie obsessa habetur. Quod idem de solidis, quatenus vitio humo- rum ægrotant, verum est. Cruditas illa co- gnosçitur. 1º. Vigore morbi durante vel in- cresçente. 2º. Ex augmento assiduo symptoma- tum. 3º. Ab exercitio functionum adhuc valdè

leso. 4^o. Omnium optimè ex recessu humorum circulantium, secretorum, excretorum et excrementorum, à statu sano, quoad copiam vel qualitates; undè in sudore, lachrymis, muco, saliva, sputo, redditis per vomitum, bile, fœce alvi, urina, ichore, pure, sanguine, menstruis, lochiis, lacte, abscessu, aphitis, etc., indicatur. Sic materia morbi priùs cruda, concocta est per actiones vitæ, quod cognoscitur propria mutatione, pulsu inæquali, et rigore æstum leviter interpellante. Duplex est turgescencia alia ad molem alia ad motum. Turgent humores tum crudi tum cocti, si copia omnes vel aliquas præpediant functiones: turgere adhuc dicuntur et tunc turgent ad motum quando acrimonia et mobilitate vehementer partes stimulant et irregulares motus cieut, ut ut sæpè parca adsit quantitas. Tissot, l. c. p. 33. (α) Vide Σύνοψις πυρετῶν (πεπونا). Pag. 20.

Vocabulum φαρμακευεῖν medicari, quo utitur Hippocrates, interpretes stricte, sed male intelligunt de purgatione in specie, nam *medicationis* vox vi nomenclaturæ non præcise ad purgationem per inferiora restringenda est, sed in genere etiam omnem notabilem, per quæcunque loca convenientia faciendam aut per vomitum, aut per secessum, aut per uri-

nas,

nas, aut per sudores provocandos evacuationem innuit; in quibus omnibus cum salutari ægri successu instituendis, necessario *coctio prius expectanda est*. Etim. oper., t. 1, p. 397. *Vide* Sydenham, sect. j, cap. iv. Van-Swieten, t. ij, p. 131. Hollerium in hunc Aphorismum; Ballonium, lib. ij. Epidem. Baglivium passim; et præcipuè Th. Glass, Comment. 7º. de alvi dejectione et vomitu.

APHOR. XXIII. (1 Humor. iij, 86, 87. — Aph. j, 25. = (2 Loc. in Hom. xxxix, 9. — Vict. Acut. lij, 8, 9. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 194.

Ingens sæpè sub minimâ mole latet malignitas. Sæpè atomus pestifera totam humorum molem contaminat. Pauca quidem per vomitorium sub febrium initio tollebat Sydenhamus, sed fructu tanto, ut, si abstinuisset à medicamento, vires labefactaret diarrhœa. Quod autem spectat deliquium animi, non semper naturæ imbecillitatem arguit, si cætera secundum ordinem benè se habeant; sed sæpè actuosæ naturæ impetum, sæpè plethoræ cachochymicæ vacationem, fatiscente vasorum turgescientium tono nimio. *Vide* Sydenham, sect. j, c. 4.

APHOR. XXIV. (1 Humor. iij, 97. — Purgant. iv, 1; v, 4. = (2 Aph. iv, 10. — Aph. j,

22. — Vict. Acut. xliij, 1; xxxvj, 3 et seq. — (a
I. Morb. Mul. xxij, 9.

In acutis affectibus, vel incipiente morbo, vel absolutâ naturæ dimicatione, tantummodò locum obtinere possunt purgantia. Incipiens morbus solida nondum constrivit crethismo febrili; turgent imò sæpè materies, ruens ad effluxum. Recedente sub finem morbi crethismo, supersunt hostiles reliquiae quibus liberandum est corpus. Per purgantia hîc non intelligenda sunt quæ alvum sine irritatione subluunt, ut cassia, tamarindi, nec ipsam, Sanctorio teste, perspirationem conturbant. Horum pleraque Veteribus erant aut incognita, aut usitata parùm, forsân ideo quòd fortiora primævorum hominum corpora iis non commoverentur.

APHOR. XXV. Aph. j, 2, 23; iv, 3. — Humor. ij, 49. — VI. Epid. iv, 30. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 12; tom. iv, p. 557.

Τμήμα Δεύτερον.

α. Ε'ν ᾧ νοσήματι ὕπνος πόνον ποιέει, θανάσιμον· ἢν δὲ ὕπνος ὠφελέη, ε' θανάσιμον.

1. Quo (i in morbo (α somnus laborem facit, lethale : si verò somnus juvet, non est lethale.

Dans toute maladie où le sommeil est pénible, cela est mortel ; au contraire, si le sommeil soulage, il y a toute espérance.

β'. Ο'κου παραφροσύνην ὕπνος παύη, ἀγαθόν.

2. Ubi somnus delirium (α sedat, bonum.

2. Lorsque le sommeil appaise le délire, c'est un bon signe.

γ'. Ὑπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρα τῷ μετρίου μᾶλλον γεγόμενα, κακόν.

3. (i Somnus, (α vigilia, utraque modum excedentia, malum.

3. Trop de sommeil, trop d'insomnie, sont l'un et l'autre de mauvais augure.

δ'. Οὐ πλεγμασιονή, ἔ λιμός, ἐδ' ἄλλο ἐδ' ἐν ἀγαθόν, ὅ, τι, ἐν μᾶλλον τῆς φύσιος ἤ.

4. (1 Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, (2 quod naturæ modum excedat.

4 Ni la satiété, ni la faim, ni rien de ce qui surpasse la nature, n'est avantageux.

ε'. Κόπτοι αὐτόματοι φράζονται νόσους.

5. Spontanæ (α lassitudines morbos denuntiant.

5. Les lassitudes spontanées, dénotent les maladies.

ς'. Οἷοι πονέοντες τι τῷ σώματος, τὰ πολλά τῶν πάντων ἐκ αἰσθάνονται, τουτέοισιν ἡ γνῶμη νοσείει.

6. Quicunque aliquâ corporis parte dolentes dolorem ferè non sentiunt, (α his mens ægrotat.

6. Ceux qui ont quelque partie malade, et

qui ordinairement ne s'aperçoivent pas de la douleur, ont l'esprit dérangé.

ζ'. Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτυνόμενα σώματα, νωθρῶς ἐπανατρέφειν δεῖ· τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

7. Quæ longo tempore extenuantur corpora, lentè reficere oportet : (I quæ verò brevi, celeriter.

7. Les sujets exténués lentement, ont besoin de se refaire lentement par la nourriture; et l'on doit fortifier, peu à peu, ceux qui ont maigri en peu de temps.

ή'. Η'ν ἐκ νέσσε τροφήν λαμβάνων τις μη ισχύῃ, σημαίνει, ὅτι πλείονι τροφῇ τὸ σῶμα χρέεται· ἢν δὲ, τροφήν μὴ λαμβάνοντος, τῆτο γίγνηται, χρὴ εἰδέναι, ὅτι κενώσιος δεῖται.

8. Si à morbo cibum quis capiens non roboretur, indicat corpus uberiori alimento uti. Si verò cibum non capienti hoc eveniat, (I evacuatione opus habere nosse oportet.

8. Si un convalescent ne se fortifie pas en

proportion de la nourriture, c'est un signe qu'il prend trop d'alimens ; mais si cela arrive à celui qui ne mange pas, sachez qu'il a besoin d'être purgé.

9'. Τὰ σώματα χρὴ, ὅτε ἂν τις βέληται καθαίρειν, εὖροα ποιεῖν.

9. Corpora, ubi quis purgare voluerit, facile fluentia reddere oportet.

9. Lorsque vous aurez dessein de purger, il faut auparavant faire couler *les humeurs*.

1'. Τὰ μὴ καθάρὰ τῶν σαμάτων, ὅσους ἂν θρέψῃς, μᾶλλον βλάψεις.

10. Impura corpora quò magis nutriveris, eò magis lædes.

10. Plus on nourrit un corps rempli de cruidité, et plus on lui nuit.

1á. Ρ'ᾶον πληρῆσθαι ποτῷ, ἢ σιτίῃ.

11. Facilius est repleti potu (a quam cibo.

11. La réplétion est plus aisée par les alimens liquides, que par les alimens solides.

ιβ'. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νόσοις μετὰ κρίσιν, ὑποσπροφὰς ποιέειν εἰσθύνειν.

12. Quæ in morbis post crisim relinquuntur, (1 (α recidivas facere solent.

12. Les reliquats intérieurs dans les maladies, après la crise, occasionnent ordinairement des rechutes.

ιγ'. Οὐκόσοις ἡ κρίσις γίνεται, τουτέοισιν ἡ νύξ δύσφορος, ἡ πρὸ τῆς παροξυσμοῦ ἡ δὲ ἐπιῖστα εὐφορώτερη ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ.

13. Quibus crisis fit, his nox ante exacerbationem gravis est : (1 subsequens verò levior plerumque.

13. Ceux qui éprouvent la crise, ont la nuit qui précède le paroxysme très-laborieuse ; mais la suivante est en général plus supportable.

ιδ'. Ἐν τῇσι τῆς κοιλίης ῥύσεσιν αἱ μεταβολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελέουσιν, ἢν μὴ εἰς τὰ πονηρὰ μεταβάλλῃ.

14. (1 In alvi profluviis mutationes excrementorū juvant, (α nisi in prava mutantur.

14. Dans les flux de ventre, si les matières changent de couleur, elles causent du soulagement; à moins qu'elles ne changent en pire.

ιέ. Ὅκου φάρυγξ νοσέει, ἢ φύματα ἐν τῷ σώματι ἐκφύεται, σκέπτεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρίσεις· ἣν γὰρ χολώδεις ἔσσι, τὸ σῶμα ξυννοσέει· ἣν δὲ ἕμαιαι τοῖσι ὑγιαίνουσι γίγνωνται, ἀσφαλὲς τὸ σῶμα τρέφειν.

15. (1 Ubi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones inspicere oportet : si enim biliosæ fuerint, corpus unà ægrotat : si verò similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire.

15. Lorsque la gorge est malade et qu'il paroît des boutons sur la surface du corps, observez les excrétions; car si elles sont bilieuses, tout le corps participe au mal; mais si elles sont semblables à celles des gens en santé, accordez de la nourriture en toute assurance.

ις. Ὅκου λιμὸς, ἔδει πονέειν.

16. (α Ubi fames, non oportet laborare.

16. Avec la faim, il ne faut point travailler.

ιζ'. Οκου ἂν προφὴ παρὰ φύσιν πλείων
ἰσέλθῃ, τῷτο νῦτον ποιέει. δηλοῖ δὲ ἡ ἴησις.

17. (a Ubi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum facit. Ostendit autem sanatio.

17. La nourriture prise en plus grande quantité que la nature ne peut en supporter, est une cause de maladie ; la guérison le prouve.

ιη'. Τῶν τρεφόντων ἀθρόως καὶ ταχέως,
ταχεῖαι καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται.

18. Eorum quæ confertim et celeriter nutriunt, celeres etiam fiunt egestionēs.

18. Les alimens qui nourrissent abondamment, et que l'on digère promptement, sont suivis d'excrétions promptes.

ιθ'. Τῶν ὀξέων νουσημάτων ἔκ πάμπαν
ἀσφαλείες αἱ προδιαγορεύσεις, ὅτε τῷ Σα-
νάτου, ὅτε τῇς ὑγείης.

19. Acutorum morborum non omninò (a tutæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis.

19. Les prédictions ne sont pas absolument certaines dans les maladies aiguës, soit pour la santé, soit pour la mort.

κ'. Οκόσοισι νέοισιν ἔχσιν αἱ κοιλίαι ὑγραί εἰσι, τυχτέοισιν ἀπογυράσκει ξηραίνονται. ὁκόσοισι δὲ νέοισιν ἔχσιν αἱ κοιλίαι ξηραί εἰσι, τυχτέοισι πρεσβυτέροισι γινομένοισιν ὑγραίνονται.

20. Quibus, (a dum sunt juvenes, alvi sunt humidæ, iis senescentibus siccantur. Quibus verò, dum sunt juvenes, alvi sunt siccæ, his senescentibus humectantur.

20. Les jeunes gens qui, habituellement, ont le ventre libre, l'ont resserré en vieillissant; et, au contraire, ceux qui sont affectés de constipation dans la jeunesse, auront le ventre libre dans la vieillesse.

κα'. Αἱμὸν θάρηξις λύει.

21. (a Famem vini potio solvit.

21. Le vin pur apaise le sentiment de la faim.

κβ'. Ἀπὸ πλεσμονῆς ὁκόσα ἂν νοσή-

ματα γένηται, κένωσις ἵηται. καὶ ὅκόσα ἀπὸ
κενώσιος, πλησμονή· καὶ τῶν ἄλλων ἡ ὑπε-
ραντίωσις.

22. A (1 (a repletionem quicunque fiunt
morbi, evacuatione sanantur; et qui-
cunque ab evacuatione; repletionem : (2
et aliorum contrarietas sanat.

22. Les maladies qui proviennent de réplé-
tion, guérissent par évacuation, et celles qui
ont pour cause l'inanition, guérissent par ré-
plétion : ainsi des autres, par leurs con-
traires.

* καγ'. Τὰ ὅζ' ἐκ τῶν νοσημάτων κρίνεσθαι
ἐν εἴκοσιν ἡμέρησι.

* 23. Acutæ febres in viginti diebus
judicantur.

* 23. Les fièvres aiguës sont jugées en vingt
jours.

καδ'. Τῶν ἐπὶ τῇ τετάρτῃ ἐπίδηλος· ἐτέ-
ρης ἐξδομάδος ἢ ὀγδόῃ ἀρχή· θεωρητὴ δὲ
ἡ ἐνδεκάτη· αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη τῆς ἐτέ-
ρης ἐξδομάδος. θεωρητὴ δὲ πάλιν ἡ ἑπτα-
καδεκάτη. αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη μὲν ἀπὸ

τῆς τεσσαρισκαδεκάτης· ἐξόδοι δὲ ἀπὸ
τῆς ἑνδεκάτης.

24. Septimorum (*a* quartus est index. Alterius septimanæ octavus est initium. Notandus verò undecimus : is enim quartus est alterius septimanæ. Notandus rursùm decimus septimus : hic enim est quartus quidem à decimo-quarto, septimus verò ab undecimo.

24. Tout quatrième jour est indicateur des septièmes ; le huit commence la seconde semaine. Le onzième jour est aussi à remarquer, car c'est le quatrième de la seconde semaine ; il faut remarquer encore le dix-septième, car il est aussi le quatrième, depuis le quatorze, et le sept, depuis l'onzième.

κί. Οἱ θερινοὶ τεταρταῖοι τὰ πολλὰ γίνονται, βραχέες· οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροὶ, καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτοντες.

25. Quartanæ æstivæ (*a* plerumque fiunt breves : autumnales verò longæ. (1 et maximè quæ prope hyemem incidunt.

25. Les fièvres quartes d'Été, ordinairement sont courtes; mais celles d'automne sont longues; surtout si elles tombent à l'entrée de l'hiver.

κς'. Πυρετὸν ἐπὶ σπασμῷ βέλτιον γένεσθαι, ἢ σπασμὸν ἐπὶ πυρετῷ.

26 Febrem convulsioni (1 supervenire melius est, (2 quàm convulsionem feбри.

26. Il vaut mieux que la fièvre survienne à la convulsion, que la convulsion à la fièvre.

κζ'. Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κουφίζουσιν, ἔδει πιστεύειν, ἔδὲ φοβεῖσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παραλόγως. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοιατέων ἐσὶν ἀβέβαια, καὶ ἔπ' αὐτοῖς διαμένειν, ἔδὲ χρονίζειν εἴωθε.

27. (1 His, (2 quæ non secundum rationem levant, credere non oportet, neque timere valdè quæ præter rationem fiunt prava. Multa enim horum sunt inconstantia, nec admodum permanere, neque durare solent.

27. Il ne faut pas se fier aux soulagemens qui arrivent sans cause, ni trop craindre les maux

qui surviennent aussi contre toute raison ; car ils sont incertains pour la plupart : ils ne persévèrent pas beaucoup pour l'ordinaire , et ne demeurent point.

κγ'. Τῶν πυρεσσόντων μὴ πάντ' ἅπασιν ἐπιπολαίως, τὸ διαμένειν καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα, ἢ ἢ συντήκεσθαι μᾶλλον τῷ κατὰ λόγον, μοχθηρόν. τὸ μὲν γὰρ μῆκος νόσου σημαίνει, τὸ δὲ ἀτθένειαν.

28. Febricitantium non omninò leviter (1 permanere, et nihil remittere corpus, (2 aut etiam magis quàm pro ratione colliquefieri, (α malum est. Illud enim morbi longitudinem indicat, (β hoc verò infirmitatem.

28. Si le corps attaqué d'une forte fièvre, persiste dans le même état ; s'il ne diminue point, ou s'il maigrit excessivement, l'un et l'autre sont pernicioeux ; car le premier indique une maladie longue, et le second une foiblesse excessive.

κδ'. Ἀρχομένων τῶν νόσων, ἢν τι δοκέη κινέειν, κίνει. ἀκμαζουσῶν δὲ, ἡσυχίην ἔχειν βέλτιόν ἐστι.

29. (1 Incipientibus morbis, (2 si quid movendum videatur, move : (3 vigentibus verò , quiescere melius est.

27. Agissez au commencement des maladies , si quelque chose vous paroît devoir être excité ; mais dans le temps de la vigueur , il vaut mieux ne rien faire.

‘ λ’ Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη, πάντα ἀσθενέστερα· περὶ δὲ τὰς ἀκμὰς, ἰσχυρότερα.

30. Circa principia et fines omnia sunt debiliora : circa vigores verò , vehementiora.

30. Tout est plus foible au commencement et à la fin des maladies ; tout est plus fort dans le temps de la vigne r.

λα. Τῷ ἐξ ἀρώσλης εὐσιτέοντι, μηδὲν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

31. A morbo bellè comedenti nihil proficere corpus , malum est.

31. C'est un mauvais signe dans la convalescence, que de bien manger , quand le corps ne profite pas.

λβ'. Ὡς τὰ πολλά πάντες οἱ φαύλως ἔχοντες, καὶ ἀρχὰς μὲν εὐσιτέοντες, καὶ μηδὲν ἐπιδιδόντες, πρὸς τῷ τέλει πάλιν ἀσιτέεσιν· οἱ δὲ καὶ ἀρχὰς μὲν ἀσιτέοντες ἰσχυρῶς, ὕστερον δὲ εὐσιτέοντες, βέλτιον ἀπαλλάττουσιν.

32. Ut plurimum omnes qui malè habent, circa principia quidem benè comedentes, et nihil proficientes, ad finem rursus cibum non appetunt: (I qui verò circa initia quidem cibi omnino non appetunt, postea autem benè appetunt, melius liberantur.

32. En général, tous les malades qui d'abord mangent bien et ne profitent pas, perdent à la fin l'appétit; ceux au contraire qui dès le principe ont perdu entièrement l'appétit, mais qui bientôt désirent les alimens, se tirent mieux de la maladie.

λγ'. Ἐν πάτῃ νέσω, τὸ ἐρρῶσθαι τὴν διάνοιαν, καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς, ἀγαθόν· τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

33. In omni morbo (a mente valere, et benè

benè se habere ad ea quæ offeruntur, bonum est : contrarium verò malum.

33. Dans toute maladie, avoir l'esprit présent, et bien prendre ce qui est administré, sont de bon augure; le contraire est mauvais.

λδ'. Ἐν τῇσι νόστοισιν ἥσσον κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκεῖη τῆς φύσιος, καὶ τῆς ἡλικίας, καὶ τῆς ἔξιος, καὶ τῆς ὥρης ἢ νῆσος ἢ μᾶλλον, ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκεῖη κατὰ τι τούτων.

34. In morbis minùs perichitantur ii quorum naturæ, et ætati, et habitui, et tempori magis similis fuerit morbus, quàm ii quibus horum nulli fuerit similis.

34. Ceux dont les maladies sont plus analogues aux forces, à l'âge, à la constitution du corps, et à la saison; courent moins de dangers que ceux qui ne conservent aucuns de ces rapports.

λε'. Ἐν πάτῃσι τῇσι νόστοισι, τὸ περὶ τὸν ὀμφαλὸν, καὶ τὸ ἥτρον, πᾶχος ἔχειν, βελτιόν ἐστι· τὸ δὲ σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐντε-

τηκός, μοχθηρόν. ἐπισφαλές δὲ τὸ τοιῷ-
τον, καὶ πρὸς τὰς κάτω καθάρσεις.

35. In omnibus morbis, (*a* quæ partes ad (*a* umbilicum et in eum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est: valdè autem tenues et (*b* eliquatas ipsas habere, malum. Periculosum verò illud est, etiam ad infernas purgationes.

35. Dans toutes les maladies, il est plus avantageux que les régions ombilicales et hypogastriques conservent de l'embonpoint; au contraire, l'extrême maigreur et l'état de marasme de ces parties, sont des signes pernicieux; il seroit même très-dangereux alors de purger par le bas.

λς'. Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν τῇσι φαρμακείῃσι καθαιρόμενοι ἐκλύονται ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ χρεώμενοι.

36. Qui sana habent corpora, (*a* pharmacis purgati citò exsolvuntur, ut et qui pravo utuntur cibo.

36. Ceux qui jouissent d'une constitution

saine sont promptement abattus par les purgatifs; ainsi que ceux qui font usage d'une mauvaise nourriture.

λζ'. Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακεύεσθαι ἐργάδεις.

37. Qui benè valent corpore, (1 purgatu sunt difficiles.

37. Ceux qui ont un corps robuste sont purgés difficilement.

λη'. Τὸ σμικρῷ χεῖρον, καὶ πόμα, καὶ σιτίον, ἥδιον δέ, τῶν βελτιόνων μὲν, ἀηδεσιέρων δέ, μᾶλλον αἰρετέον.

38. Paulò deterior et potus et cibus, jucundior autem, eligendus potiùs, quàm meliores quidem, sed ingratiore.

38. Des alimens et une boisson un peu moins salubres, mais agréables, sont préférables à de plus salubres qui déplaisent au goût.

λθ'. Οἱ πρεσβύται τῶν νέων τὰ μὲν πολλὰ νοσέουσιν ἥσσον· ὅσα δ' ἂν αὐτέοισι χρόνια νοσήματα γένηται, τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκει.

39. (1 Senes ut plurimum quidem (α

juvenibus minùs ægrotant : (2 quicunque verò ipsis (*b*) morbi fiunt diuturni, plerumque commoriantur.

39. En général, les vieillards font des maladies moins fortes que les jeunes gens; mais s'ils viennent à être attaqués de quelque affection chronique, ils en meurent presque toujours.

μ'. Βράγχοι, κὲ κόρυζαι, τοῖσι σφόδρα πρεσβύτησιν ἔπιπείνονται.

40. Raucedines, et gravedines, *in* valdè senibus non coquuntur.

40. Le corysa et les enrouemens (1) ne viennent pas à maturité parfaite dans les vieillards.

μα'. Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις κὲ ἰσχυρῶς, ἄνευ φανερῆς προφάσιος, ἐξαπίνης τελευτῶσι.

41. Qui sæpè et vehementer, absque manifestâ causâ, animo linquntur, ex improviso moriuntur.

(1) Cités ici pour les affections catarrhales en général.

41. Ceux qui éprouvent souvent de fortes défaillances et sans cause manifeste, enfin, meurent subitement.

μβ'. Λύειν ἀποπληξίνην, ἰσχυρὴν μὲν, ἀδύνατον· ἀσθενέα δὲ, ἔρῃδιον.

42. Solvere (α apoplexiam, vehementem quidem, impossibile: debilem verò, non facile.

42. Il est impossible de dissiper une apoplexie forte; et très-difficile d'en guérir une légère.

μγ'. Τῶν ἀπαγχομένων, ἡ καταλυομένων, μεδέω δὲ τεθνηκότων, ἔκ ἀναφέρουσιν, οἷσιν ἂν ἀφρὸς ἦ περὶ τὸ σῶμα.

43. Ex (α iis qui strangulantur vel resolvuntur, nondum autem sunt mortui, non se recolligunt, (ι quibus spuma circa os fuerit.

43. Ceux qui sont suffoqués, et qui ont perdu tout mouvement, mais qui ne sont point encore morts, ne reviennent point à la vie si l'écume s'amasse autour de la bouche.

μδ'. Οἱ παχείες σφόδρα κατὰ φύσιν, ταχυθάνατοι γίνονται μᾶλλον τῶν ἰσχνῶν.

44. Qui naturâ (α sunt valdè crassi, magis subito moriuntur, quàm graciles.

44. Les personnes qui naturellement ont beaucoup d'embonpoint, sont plus exposées à périr de mort subite, que les personnes maigres.

μέ'. Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴν αἱ μεταβολαὶ, μάλιστα τῆς ἡλικίης, καὶ τῶν χωρίων, καὶ τῶν βίων, ποιεῖσι.

45. Epilepticis pueris, mutationes, (1 maximè ætatis, (2 et regionum, et vitæ, liberationem faciunt.

45. Chez les enfans épileptiques, le changement surtout d'âge, de pays et de genre de vie, opèrent la guérison.

μς'. Δύο πόνων ἅμα γινομένων, μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος ἀμαυροί τὸν ἕτερον.

46. Duobus doloribus simul abortis, non in eodem loco, vehementior (1 obscurat alterum.

46. De deux maux qui ont lieu en même temps, dans des lieux différens, le plus douloureux affoiblit l'autre.

μζ'. Περὶ τὰς γενέσιας τῆ πύε, οἱ πόνοι, καὶ οἱ πυρετοὶ ζυμβαίνουνσι μᾶλλον, ἢ γενομένου.

47. Circa puris generationes, dolores et febres magis accidunt, quàm ipso facto.

47. La douleur et la fièvre ont plutôt lieu lorsque la suppuration commence, que lorsqu'elle est faite.

μς'. Ἐν πάσῃ κινήσει τῆ σώματος, ὁκόταν ἄρχηται πονέειν, τὸ διαναπαύειν εὐθὺς ἄκοπον.

48. In omni (a corporis motu, quando dolere cœperit, interquiescere, statim lassitudinem curat.

48. Dans tout exercice du corps, lorsqu'on commence à éprouver de la douleur, on la fait cesser à l'instant en se reposant.

μθ'. Οἱ εἰθισμένοι τὰς συνήθειας πόρους φέρειν, καὶ ὥσιν ἀσθενέες ἢ γέροντες, τῶν

ἀσυνήθων, ἰσχυρῶν τε καὶ νέων, ῥᾶϊον φέρουσι.

49. Consueti solitos labores ferre, etiamsi fuerint debiles, (α aut senes, insuetis, robustis *licèt* et juvenibus, faciliùs tolerant.

49. Ceux qui ont l'habitude des travaux journaliers, soit même un vicillard ou un homme foible, les supportent plus aisément que des jeunes gens, ou des personnes robustes qui n'y seroient point accoutumés.

ν'. Τὰ ἐκ πολλῶ χρόνου συνήθεια, καὶ ἡ χεῖρα, τῶν ἀσυνήθων, ἥσπον ἐνοχλεῖν εἴωθε· δεῖ δ' ἐν καὶ εἰς τὰ ἀσυνήθεια μεταβάλλειν.

50. A multo tempore (α consueti, etiamsi fuerint deteriora, (b insuetis minùs turbare solent : (γ oportet igitur etiam ad insolita se vertere.

50. Les choses auxquelles on est habitué depuis long-temps, quoique moins bonnes, causent moins de trouble pour l'ordinaire, que celles dont on n'a pas l'habitude. C'est pourquoi il faut changer *de temps en temps*, même à l'égard des choses inaccoutumées.

νά. Τὸ κατὰ πολὺ, καὶ ἐξαπίνης, κε-

ἢ πληρῆν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὀκωποῦν τὸ σῶμα κινεῖν, σφαλερόν. καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. τὸ δὲ κατ' ὀλίγον, ἀσφαλές· καὶ ἄλλως, ἢν καὶ τις ἐξ ἐτέρου ἐφ' ἑτερον μεταβαίνει.

51. Multum, et derepentè (1, vacuare, (2 (a aut replere, aut (3 calefacere, (b aut (4 frigefacere, aut alio quocunque modo corpus (5 movere, (c periculosum est. (6 Enimverò omne multum (i. e. *nimum*) naturæ est inimicum. (7 Quod verò (d paulatim *sit*, tutum est : tum aliàs, et si quis (8 ex altero ad alterum transeat.

51. Il est dangereux de vider ou de remplir ; d'échauffer ou de rafraîchir beaucoup, et subitement ; enfin, d'émouvoir le corps de quelque manière que ce soit : car tout excès est ennemi de la nature. Mais ce qui se fait peu à peu, est toujours sûr : et si d'ailleurs l'on passe par gradation d'une chose à l'autre.

νβ'. Πάντα κατὰ λόγον ποιεόντι, καὶ μὴ γινομένων τῶν κατὰ λόγον, μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἑτερον, μένοντος τῆ δόξαντος ἐξ αρχῆς.

52. Omnia ex ratione (*a* facienti, et non secundum rationem evenientibus, non transeundum ad aliud, (*b* manente eo, quod visum est ab initio.

52. Si en agissant rationnellement on n'obtient pas ce qu'on en attend, il ne faut point passer à autre chose, si ce que l'on a présumé d'abord, persévère.

νγ'. Οἷοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσι, νέοι μὲν ὄντες, βέλτιον ἀπαλλάσσουσι τῶν τὰς ξηρὰς ἔχόντων. ἔς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον ἀπαλλάσσουσι· ξηραίνονται γὰρ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τοῖσιν ἀποξηράσκει.

53. Quicunque alvos habent humidus, dum quidem juvenes sunt, melius liberantur his, qui siccas habent. Ad senectutem verò, pejus liberantur: siccantur enim ut plurimum alvi senescentibus.

53. Ceux qui, dans la jeunesse, ont le ventre libre, guérissent plus aisément que ceux qui l'ont resserré; mais ensuite en vieillissant, ils guérissent plus difficilement, car ordinairement les vieillards sont plus resserrés.

νδ'. Μεγέθει δὲ σώματος ἐννεάσαι μὲν,
ἐλευθέριον καὶ ἔκ ἀειδές. ἐγρηράται δὲ, δύσ-
χρησον, καὶ χεῖρον τῶν ἐλασσόνων.

54. Procero corpore (α) juventutem quidem degere, liberale est, nec de-
forme : insenescere verò, incommo-
dum, est parvis deterius.

54. Une belle taille a quelque chose de no-
ble et d'avantageux dans les jeunes gens ; mais
ensuite elle se déforme chez les vieillards , et
leur est moins avantageuse qu'une petite taille.

N O T Æ

I N

SECTIONEM SECUNDAM.

APHOR. I. (1 I. EPID. iiij, 8. — II. Epid. iiij, 12.—Aph. iv, 67.—I. Prædict. xv, 5, 17.—VI. Epid. viij, 5. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, pag. 67, l. 19. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 398.

Πόνος græce, *labor* est, duoque præcipue significat *dolorem* et *fatigationem*, ut 2, Aph. 46. Dum inquit Hippocr. δύο πόνων ἀμα γινομένων, id est duorum dolorum qui simul. Et rursus 2, Aph. 48. ὁπόταν ἀρχηται πονεῖν id est cum fatigari cœperit.

Κόπῳς seu lassitudo est totius corporis, omniumque artuum quassatorum materiâ pro quam neque ipsi quiescere, neque moveri possunt, vel minimum, sine lassitudinis sensatione. Sed ut illius τοῦ κόπῳς duæ sunt causæ labor et otium: ita et febrium, quæ inde

κοπιώδεις dicuntur, duo genera quoque existunt. Sunt enim quædam à labore ardentes, ab acribus et biliosis ichoribus intro in venas attractis : sunt etiam sic nominatæ quas parit suppressio excrementorum quæ in peculiari cujusque natura redundare consueverunt ac fere in vetustatem incidunt febres hujus modi κοπιώδεις. Duret in coac. pr. 19. Rieger. *Vid.* Aph. 1 et 5. *Vide* Σύνοψις περιττῶν ποιοῦς καὶ κοπῶς, pag. 100.

Lassitudines à somno, artubus quasi fractis, sæpè eis accidunt qui insueta et immodica exercitia experti sunt. Norunt id equites novitii. Secùs, hæere in ultimis vasis excrementitios humores significant, perspirationemque cohiberi. Id etiam convalescentibus à morbo post cibos justo pleniores accidit.

APHOR. II. Epid. iiij, 11, 12. = (a Cels. iiij, c. 2, s. 7, p. 178, l. 9.

APHOR. III. Aph. vij, 71. — (1 Humor. iiij, 78. — Coac. ij, 35. — VI. Epid. vj, 6. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, pag. 63, l. 2 et 5. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 42.

APHOR. IV. (1 VI. Epid. viij, 16. — II. Morb. xvj, 13. — Aph. ij, 22. — (2 Aph. ij, 51. = Vet. Medic. xv, 10, 15. = (a Cels. j, c. 1, p. 28, l. 26, et pag. 30, l. 5.

APHOR. V. Aph. iv, 31. — (*a* Gal. de opt. Sect. ad Thrasy. cap. 31. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 695 et 710; tom. ij, p. 63, 391; t. iij, p. 553, 601.

Quotiescumque stant integræ functiones, nec vis solidorum labefactatur, nec pondus humorum augescit, alacres sumus et leves. Minuantur solidorum vis et tonus, augeatur humorum moles, utrinque pondus accedit: hinc verum et ad stateram; illinc relativum et ad sensum. Jam non sufficit novo ponderi corpus; fatiscunt crura, brachia, cervix; sanitas labascit. *Vide* aureum Sanctorii Opus, præcipuè Sect. j et v.

APHOR. VI. (*a* Cels. ij, c. 1, s. 1, p. 59, l. 12; — ij, c. 1, s. 6, p. 76, l. 3. — *Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 5; tom. ij, p. 194; tom. iv, p. 455.

APHOR. VII. Aliment. xj, 6, 7. — (1 Aph. ij, 11, 18. — *Vide* van-Swieten, tom. iij, p. 655.

Diuturniores morbi naturæ robur extinguunt, breves prosternunt tantum.

APHOR. VIII. (1 Aph. ij, 31; iv, 41, 45, vij, 64. — Coac. j, 179. = (2 Aph. ij, 22.

Non refert quid assumas, sed quid concoquas. Copiosior cibus vires opprimit, non reficit. Hinc tot Hippocratica præcepta de com-

paratione inter vires et cibos instituendâ. Si, rectâ mensurâ adhibitâ, cibus non reficit, signum est quòd quâ semel imbutum est corpus, labes morbosa alimenti corrumpit materiem; vacuetur ergo. *Vide* versionem Cl de Villebrunc.

APHOR. IX. Aph. iv, 13; vij, 70. — *a* Cels. iij, c. 2, s. 7, p. 181, l. 18. — *Vide* van-Swieten; tom. ij, p. 131; tom. iv, p. 395 et 655.

Totius methodi medendi in acutis fundamentum est sententia illa, cùm in illo consistat purgationis rectè institutæ mysterium, ut mobilissima vacuentur. Mobiliora autem sunt quæ fluidiora.

APHOR. X. Aph. vij, 65, 67. — Vet. Med. xij, 11, 12; xix, 6 ad 17. — Præcept. xj, 4. — II. Morb. xvj, 13; xvj, 16 ad 20.

Falsa foret conclusio quæ indè totalem in morbis abstinentiam deduceret. Contrarium mille locis edocuit Hippocrates; præsertim cùm plus noxæ videt in nimis tenui quam in pleniorè dietâ. Sed Aphorismus noster indicat ad necessitatem talia corpora nutrienda esse, non ultrâ.

APHOR. XI. Vet. Medic. xij, 3, 9. — Aliment. xj, 5. — Aph. ij, 7, 18. — *a* Cels. j, c. 1, s. 2, p. 28, l. 28. — *Vide* van-Swieten; tom. ij, p. 92.

Alimentum liquidum vulgò, nec sine exceptione tamen, materiam tenuiorem præbet, solvendam facilè, adeòque et plus implentem, et vacuationi promptiori aptam.

APHOR. XII. (I Humor. vij, 16, 17. — II. Epid. j, 81; iii, 72. — IV. Epid. xvij, 20. — VI. Epid. ij, 32; iij, 62. — II. Morb. xvj, 12, 13; xvj, 20; xxxvij, 19. — Aph. iv, 36. — (a Cels ij, c. 2, s. 7, p. 108, l. 1. — Vide van-Swieten, tom. ij, p. 52.

Dicitur *recidiva*, voce adjectiva communiter usurpata, à *recido*, ita ut idem significet ac *rursus cadens*, vel *denuo accidens*, et ubi substantive usurpata occurrit, commode subintelligitur vel febris, si de febribus fuerit sermo, vel ægritudo si de alio quocunque morbo est quæstio. Græce vocatur ὑποστροφή ab ὑποστρέφω *converto* et *revertor* nec non ὑποτροπή et ὑποστροφιασμός ab ὑποτροπιάζω *revertor*. Denotatur autem recedivæ nomine, reversio vel reciprocatio morbi, qui jam ablati erat, vel saltem remotus videbatur, cum æger à statu meliore ac reconvalescentiæ in deteriores iterum labitur: V. Q. quando paroxysmus febris intermittens solvitur sudore copioso deinde tamen rursus post apyrexiam redit. Febres si alio die quam judicatorio desierint recidivam metuere oportet.

Hipp.

Hipp. Coac. sect. j, n^o. 115. Rieger. tom. j, pag. 183.

Vel ejusdem morbi recidivam facit materies illa, vel alium morbum. Sic funiculos atque abscessus variolæ, sic asthmata peripneumoniæ relinquunt; sic hepatitis in hæmorrhoidas vertitur.

APHOR. XIII. (1 VI. Epid. ij, 42. — I Epid. iij. — III. Epid. iij. 66. — (2 Cels. iij, c. 2, s. 3, p. 149, l. 23. — *Vide* Boërhaav. Inst. med. 931 et seq. *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 79.

APHOR. XIV. (1 II. Epid. ij, 3. — Aph. j, 2. — (2 Aph. iv, 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 356.

APHOR. XV. (1 Aph. iij, 25. — *Vide* Sanctatorium, sect. j, passim. *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 606.

Morborum qui parti alieni incumbunt origo triplex. Vel enim illam, illæso ceteroquin corpore, invadunt; vel totius corporis læsi symptomata, unam præcipuè partem occupant; aut demum, dum deserviunt in unam, ceteras, quasi metastasi factâ, liberant. Cuique horum casuum sua sunt signa. Sed universalem affectum designat excrementorum omnium perversio.

APHOR. XVI. (a Cels. j, c. 1, s. 2, p. 29, l. 21.

APHOR. XVII. Aph. ij, 22. — Vet. Med. viij, 16; xij, 10; xij, 11, 24; xix, 6, 31. — I. Diæt. iij, 15. — III. Diæt. xv, 1, 6. — Loc. in Hom. iij, 8, 9. — Sanit. tuend. ad Demet. 6. — Affect. xxvij, 1, 2. — Morb. Sacri. xviii, 30. — Epist. Abderit. ad Hip. 40. — *Vide* van-Swie-ten, t. ij, pag. 32. — *Vide* versionem et textum Cl. de Villebrune.

APHOR. XVIII. Aph. ij, 7, 11. — Aliment. xj, 4, 5. — VI. Epid. v, 37, 53. — 18 et 19. *Vide* Sanctori. sect. iij, 60.

APHOR. XIX. Decent. Ornat. x, 7, 8. = (a Cels. ij, c. 2, sect. 6, p. 70, l. 4.

APHOR. XX. Aph. ij, 53. — *Vide* van-Swie-ten, tom. ij, p. 336.

Si, ob acutiorem fibrarum intestinalium sensum, alvus sit juveni laxior, senescenti tardabitur. Si juniori ob siccitatem tardior fuerit, senescenti laxabitur.

APHOR. XXI. (a Cels. j, c. 1, s. 11, p. 32, l. 11.

APHOR. XXII. (t Natur. Human. xvij, 11, 12, 13. — San. tuend. ad Dem. 7. — VI. Epid.

viiij, 16. — Aph. ij, 8. — Flat. ij, 9, ad 16; iiij, 2, 3. = (2 Aph. ij, 8. — Vet. Medic. xxviiij, 18. — Loc. in Hom. Ij, 6; Iij, 2, liv. 6. — I. Epid. ij, 95. — Morb. Sacr. xviiij, 30, 32, 33, 35. = (a Cels. j, c. 1, s. 11, p. 33, l. 30. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 345, t. ij, p. 256.

APHOR. XXIII. Aph. ij, 19. — Judicat. iv, 12. — Coac. j, 190, 212. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 84.

Lege hic attente meditantam Meletii expositionem, quam nobis in hunc aphorismum noscendam tradidit Cl. de Villebrune, toties nobis laudandus.

APHOR. XXIV. Aph. iv, 36, 71. — Septimest. viij, 6. — Judicat. ij, 7 ad 12. — Praenot. xx, 5 ad 10. — (a Cels. iiij, c. 2, s. 2, p. 144, l. 1 ad 9. *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 421, 425, 427, 430.

Referuntur hic dies in decursu acutorum morborum observabiles. Sunt in his diebus alii aliorum *indices*, seu *indicatorii*, *indicantes*, *internuncii*, qui ab Hippocrate vocantur *πρόγνωστα*, *contemplabiles* h. e. contemplatione digni, neque sine animadversione praetercundi; bona enim crisis semper indicatur aliquanto prius quam fiat, per signa videlicet coctionis, ad speciem et tempus crisis. Alii

appellantur à medicis dies *propriè* seu *perfecte critici* vel *decretorii* atque *judicantes*, *κριτικοί* sive *κρίσιμοι*, qui etiam *principes*, aut *cardinales*, in quos crisis incidere solet, suntque ab Hippocrate memorati septimus, decimus quartus et vigesimus, quorum indices seu contemplabiles sunt quartus, undecimus et decimus septimus; ita, ut quartus indicet septimum, undecimus decimum quartum, decimus septimus vigesimum. Sunt itaque indices dies ut quaternarii, critici vero septenarii. Vigessimus dies horis ultimis adfert iudicationem seu crisin, usque adeo ut hand multum referat, si quis vigesimum primum decretorium esse dicat: certe vigesimus vires habet in fine, septimus in initio, quatuordecimus in medio, quod nosse ad medicam praxim non parum referet.

Insuper qui inter dies memoratos sunt impares, alii *μετακρίσιμοι* h. e. *intercidentes*, sive *irrepentes*, *intermedii*, *intercalares*, *provocatorii*, vocantur, qui nempe inter principes et indices intercidunt, suntque tertius, quintus, nonus, decimus tertius, decimus nonus, nam quoque vim habere ad iudicandum observantur, non tamen tam potentem, quam quæ est diebus criticis, sed crises moliri imperfectas, h. e. in quibus, ut inquit heurnius, quædam fiunt aut apparent prætermissa

a præcedentibus: etenim singuli prædictorum dierum dupliciter dicuntur, aut enim πρὸς τι, quæ referuntur ad πρόσδεσιν (i. e. symptomatum accessionem), aut simpliciter, quando referuntur ad tempus totius historię morbi. Igitur si quis ab initio acute febricitare inceperit, septimus totius historię dies erit judicans simpliciter. At si quis duobus diebus leniter febricitarit, tertio die acute febricitare inceperit, septimus totius morbi historię non erit judicans, sed nonus, qui appellatur septimus, non quidem totius historię, sed prostheseos.

Quarta demum statuitur dierum differentia, qui neque principes sunt, neque indices, neque intercidentes, in quibus vei nulla, vel imperfecta et mala crisiſis evenit, quales sere a quarto pares sunt, ut sextus, octavus, decimus, duodecimus, decimus sextus et decimus octavus, dicti ἄκριτοι, *dies medicinales* item *vacui*, eorum verò pessimus est sextus, qui, quod eo plures percant, tyranni nomen meruit. Vide Valles. Vide συνοψιν πρὸς τῶν, de diebus criticis: paribus, agr. ix et v. Idem. de diebus decretoriis. Agr. j et ij. Diebus imparibus. Agr. viij et x. Idem de diebus decretoriis. Agr. iij. id. de diebus vacuis. Agr. ij, iv et xj.

Doctrinam hanc fusè et doctè defendit in observatis suis inter recentiores Cl. de Haëp

Rat. Med. tom. j ; impugnavit doctè et modestè Cl. Le Roy , Monspeliensis Professor, libro de Prognosi. Plura certè in Edicto Hippocratico vera sunt. Sed observatis illius plura addere fas erat, plura detrahere quæ dies melius docuit. *Vide* auctores prædictos Duretum, Hollerium in Hipp. Aphor. Glass, Freind, Desmars, Aubry et alios.

Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri scesellerunt : cum hic quoque medicus non numerare dies debeat ; sed ipsas accessiones intueri ; et ex his conjectare , quando dandus cibus sit ; (quando medicamenta sint præscribenda.) Cels. *Vide* Rieger comment. in Aphor., t. 1, p. 222.

APHOR. XXV. (1 Nat. Human. xxix, 5, 6, 7. — I. Epid. ii), 17. — Coac. j, 236. = (a Cels. ij, c. 2, p. 93, l. 1 ; ii), c. 2, s. 7, p. 173, l. 1. — *Vide* Sydenham, sect. j, cap. 5 ; Ballonium, Epidem. lib. ij ; van-Swieten, tom. ij, pag. 461.

APHOR. XXVI. — (1 I. Morb. vj, 13, 14. — Aph. iv, 57 ; v, 5, 70. — Coac. j, 231 ; ii), 80. — San. tuend. ad Dem. 10. — (2 Aph. vij, 13. — Coac. ij, 207 ; ii), 82. — Judicat. xij, 11. — (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 4 et 8. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 321.

APHOR. XXVII. (1 I. Prædict. vj, 16 ; vij, 7.

—II. Prædict. xxix, 6. — Coac. j, 73; iij, 100, 109, 110. — II. Epid. iij, 132. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 73, l. 1; et ij, c. 2, s. 7, p. 108, l. 1. — *Vide* Galen de dieb. critic. Van-Swieten, tom. ij, pag. 85, 156; t. iij, pag. 68.

APHOR. XXVIII. (1 Humor. iij, 17. = (2 Aph. v, 55. — Humor. iij, 52. = (a Cels. ij, c. 1, s. 1, p. 58, l. 18; et ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 20.

Quâ proportionē morbi materiem subigit febris, eadem et vim corpori infert. Si igitur minus quàm par est tenuetur illud, retinetur intus expellenda labe, novas, datâ occasione, molitura insidias. Si verò magis quàm pro ratione colliquescat; corporis fabricam, non morbum, à febre destrui, sana corrumpi, cuncta putredine intus grassante diffluere signum est.

APHOR. XXIX. (1 Aph. ij, 30. = (2 Aph. j, 22, 24. — II. Morb. Mul. xxiv, 16, 17, 18. — (3 Loc. in Hom. xxxviiij, 9, 10, 11. — Purgant. iv, 1. — I. Epid. iij, 29. — II. Morb. xij, 31, 35. — III. xxiv, 57, 58, 59. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 66.

APHOR. XXX. Aph. ij, 29. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 65.

APHOR. XXXI. Aph. ij, 8. — Coac. j, 179. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 3.

APHOR. XXXII. Coac. j, 179. = (1 Aphor. vij, 6.

In priori casu vires ex præpostero cibo sumpsit morbus, illumque corrumpit. In altero, restituta fuit legitimæ diætæ ministerio sanitas; cujus indicium est alimentorum appetitus.

APHOR. XXXIII. De Medic. iij, 9. — Coac. j, 72. (a Cels. ij, c. 1, s. 2, p. 60, l. 24.

APHOR. XXXIV. Aph. viij, 1, 8. — Humor. vj, 1 ad 5. — Dieb. Judicat, j, 11 ad 15. — VI. Epid. viij, 43 ad 46. — Affection. vij, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 11, 70.

In corpore prædisposito, causa minus vehemens majora creat symptomata, sed quæ tolerantur facilius. Causa levis infanti convulsionem accersit promptè sanandam: gravissima est causa, quæ senem in motus convulsivos rapit. Per hyemen eadem exardeat vehementiâ febris ardens ac furente Syrio; nonne ultimum furoris gradum obtinuit causa, quæ contradicentibus omnibus, emicare facit symptomata maxima?

APHOR. XXXV. (1 Prænot. x, 2. — Aph. ij, 28. — I. Morb. Mul. lxxvij, 9. = (a Cels. ij, c. 1, s. 2, p. 60, l. 11. — (b Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 15.

APHOR. XXXVI. Aph. ij, 37; iv, 16. — Verat. us. j, 2. — Epist. Dem. ad Hip. 16. — (a Cels. ij, c. 2, s. 5, p. 106, l. 7.

APHOR. XXXVII. Qui bene valent corpore purgatu sunt difficiles, *est interpretatio vulgaris*; verum hujus aphorismi sensus clarior elucescet ope aphorismi v, s. 4: Ὑπὸ κύνῃ καὶ πρὸς κυνὸς ἐφγάδες αἱ φαρμακείαι.

Sub cane et ante canem *difficiles* sunt purgationes, id est *periculosæ*.

Verum etiam hujus sententiæ lucidiorem sensum invenimus in Aphorismo xvj, s. 4: Elleborus periculosus est sanas carnes habentibus, convulsionem enim inducit. Sed hoc pro certo habendum est antiquos intellexisse per medicamenta purgantia, *fortissima* sive *drastica*: et insuper constat experientiâ, bene valentes corpore esse purgatu difficiles, et illis ut purgentur, utendum esse purgantibus medicamentis drasticis: sed hi ipsi non purgantur absque periculo.

Igitur cum antiquis, Gallicè foret dicendum: *ceux dont le corps est robuste, ne sont pas purgés sans danger.*

APHOR. XXXVIII. De Art. xij, 10. — VI. Epid. iv, 26. — IV. Morb. xij, 7. — Affection. xlij, 1, 2. — Vict. Acut. xv, 1, 2; xvij,

2, 4. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 93; t. iij, p. 655.

APHOR. XXXIX. (1 Morb. xx, 13, 15. = (2 Aph. v, 7. = (a Cels. ij, præf. s. 4, p. 56. l. 5. = (b Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 89, l. 7. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 651.

Resistit fortiùs incumbenribus morborum acutorum causis senilis rigiditas: sed si cedere semel coacta fuerit, deficit flexilitas, deficit tonus qui vires restituat.

APHOR. XL. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 89.

APHOR. XLI. Coac. j, 83.

Inhæret scilicet cordi causa morbi immediabilis.

APHOR. XLII. (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 92, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 3; t. iij, p. 276, 283, 284.

APHOR. XLIII. (1 Morb. Sac. viij, 18. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 93, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. ij p. 645; t. iij, p. 273. — *Vide* interpretationem Cl. de Villebrune in notis ad hanc sectionem.

APHOR. XLIV. (a Cels. ij, præf. s. 6, p. 58, l. 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 284; t. iij, p. 257.

APHOR. XLV. Aph. v, 7. — II. Prædict. xvj, 1, 2, 3. — Morb. Sac. xij, 6. = (1 Aph. iij, 28. = (2 VI. Epid. v, 36. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 435, 436.

Epilepsia ἐπιληψία, quasi comprehensis, detentio, sive obturatio, nomen sumpsit quod sensum atque mentem, pariter apprehendat, ut ait Aurelianus; ab ἐπιλαμβάνειν *capio*, *apprehendo*; hoc enim correpti morbo rerum obliviscuntur et sensus eorum detinentur, cum jaceant omnibus destituti sensibus; latini *morbus caducus*, quod hominem cadere facit. Apellatur etiam *puerilis passio*, παιδῶν νόσος quod in puerili ætate abundat. *Comitialis* dicitur *morb*us, quia in comitiis infestum habebatur, si quis epilepticus concidisset; indè *comitiales* homines apud Plinium, l. 20, cap. 5. ἱερὰ νόσος sacer morbus, *divinus*, quasi a diis in vindictam missus et opem humanam eludens; *lunaris ægritudo* et eā correpti σεληνιαστοί, σεληνιαζόμενοι lunatici vocantur, quoniam frequenter ad lunæ circuitus redire solet malum. Vid. Rieger., t. j, p. 309.

APHOR. XLVI. (1 Humor xj, 16, 17. — Aliment. j, 11. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 226.

APHOR. XLVII. Vet. Medic. xxxviij, 8 ad

12. — Prænot. xvij, 8. — De Ulcerib. ij, 8 ad 11. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 208, 606, 640, 645; t. ij, p. 42, 106.

Legatur hic curiosè quid Damascius de Archæo Helmontiano protulit, apud Cl. de Villebrune.

APHOR. XLVIII. Aph. II, 22. — Præcept. xij, 4. — Natur. Human. xvij, 14, 15. — Flatib. ij, 14. = (a Cels. j, c. 1, s. 6, p. 30, l. 17, et p. 32, l. 17. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 109.

APHOR. XLIX. II. Diæt. xlv, 2, 3, 4. — (a Cels. j, c. 1, s. 6, p. 30, l. 12.

APHOR. L. II. Diæt. xlv, 4. — Humor. iij, 115. — Humid. us. iij, 8. — Vict. Acut. xvij, 2 ad 6; xxxij, 5, 6. — Aph. j, 17. = (1 Aph. ij, 22, 51. = (a Cels. j, c. 1, s. 7, p. 32, l. 18. = (b Cels. j, c. 1, s. 6, p. 30, l. 15. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 285; tom. ij, p. 102, 127; tom. iij, p. 639.

Consuetudo spectanda est in victu, tegumentis, laboribus, somnis, rebus venereis et animi affectibus. Consuetudo quam non male alteram naturam, vel ἰσθμοσυγκρασίαν, appellant, fert vix credenda; sive spectaveris effectus cibi, aëris, potus, motus, medicamenti, veneni, sive consideraveris reliqua. Boërhaav.

inst. med. Ss. 1026. *Vid.* Hoffm. Med. rat., t. j, pag. 646 et seq.

APHOR. LI. Vict. Acut. xvij, 12; xxij, 15. = (1 Aph. j, 2; vj, 27, 39 = (2 Aphor. j, 3, 4; ij, 4, 17; vj, 39. = (3 Aph. ij, 1; v, 16. = (4 Aph. ij, 1; v, 17, 18, 20, 22, 23, 24. = (5 Aph. ij, 14. = (6 Aph. ij, 4. — Veter. Medic. xvij. I. Præcept. xij, 4. — I. Morb. Mulier. xxvij, 4; xxvij, 15. = (7 II. Diæt. xlv, 5. Natur. Human. xix, 7, 8. — Humor. viij, 17, 18. — Humid. us. ij, 5. — VI. Epid. ij, 47. Affect. xij, 3. — Vict. Acut. v, 22; x, 8. = 8 Aph. ij, 50, 52. = (a Cels. ij, c. 2, s. 8, p. 111, l. 21. = (b Cels. j, c. 2, s. 6, p. 47, l. 11. = (c Cels. j, c. 1, s. 4, p. 29, l. 27. = (d Cels. j, c. 1, s. 5, p. 30, l. 11. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 54; t. ij, p. 127.

APHOR. LII. Loc. in Hom. 35, 11, 12. = (a Cels. ij, præf., p. 134, l. 12. — Cœl. Aurel. tard. passion. iv, 3, p. 154. (b Cels. ij, c. 2, s. 5, p. 163, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 138.

APHOR. LIII. Aph. ij, 20. = (a Cels. j, c. 1, s. 13, p. 39, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 336.

APHOR. LIV. Præcept. xj, 10. = (a Cels. ij, præf. s. 5, p. 56, l. 9.

Τμήμα τρίτον.

α'. Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὥρέων, μάλιστα
τίκτῃσι νοσήματα· καὶ ἐν ταῖσιν ὤρῃσιν αἱ με-
γάλαι μεταλλαγαι, ἢ ψύξις, ἢ θάλλσις,
καὶ γ' ἄλλα κατὰ λόγον ἔστω.

1. (1 (α Mutationes anni temporum
maximè pariunt morbos : (2 et in ipsis
temporibus magnæ mutationes tum fri-
goris, tum caloris, et cætera pro ra-
tione eodem modo.

1. Ce sont les changemens de saisons qui
occasionnent principalement les maladies : et
dans ces mêmes saisons, les grands change-
mens comme du froid et du chaud, et ainsi des au-
tres.

β'. Τῶν φυσίων, αἱ μὲν πρὸς ἔρος,
αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα, εὖ ἢ κακῶς τιθεύ-
κασιν.

2. Naturarum alie quidem (α ad sta-
tem, alie verò ad hyemem, bene aut
malè sunt constitutæ.

2. Il est des tempéramens qui se trouvent les uns bien, et les autres mal de l'hiver ou de l'été.

γ'. Τῶν νέων ἄλλαι πρὸς ἄλλας εὖ ἢ κακῶς πεφύκασιν· ἢ ἡλικίαι τινὲς πρὸς ἄρας, καὶ χώρας, καὶ διαίτας.

3. Morborum (α alii ad alios bene (τ aut malè se habent : et relates quædam ad tempora, et regiones, et victus.

3. Par rapport aux saisons, les maladies sont les unes plus graves, les autres plus légères ; il en est de même de certains âges, qui se trouvent mieux de certaine saison, relativement au pays et au régime.

δ'. Ἐν τῇσιν ἄρσιν, ὅταν τῆς αὐτῆς ἡμέρης, ὅτε μὲν θάλασσαν, ὅτε δὲ ξηρὸς γίγνηται, φ. νοσήματα ταυτὰ προσδέχεσθαι χρή.

4. In temporibus, quando eadem die, modò calor, modò frigus fit, autumnales (ε morbos expectare oportet.

4. Dans les temps où il fait tantôt froid, tantôt chaud le même jour, il faut s'attendre à des maladies d'automne.

ε. Νότοι βαρυηκοί, ἀρχλυάδεις, καρκι-

βαρικοὶ, νωθροὶ, διαλυτικοί· ὁπόταν ἔτως δυναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσίσῃσι πάσχουσιν. ἣν δὲ βίρειον ἢ, βῆχες, φάρυγγες, κοιλίαι σκληραὶ, δυσουρίαι, φρικαίρες, ὀδύναὶ πλευρέων, στήθεων. ὁπόταν ἔτως δυναστεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσίσῃσι προσδέχεσθαι χεῖρ.

5. Austri (*a* auditum gravantes, caliginosi, caput gravantes, segnes, dissolventes. Quum hic dominatum teneant, talia in morbis patiuntur. Si verò aquilonium fuerit *anni tempus*, tusses, (*a* fauces asperæ, (*b* alvi duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectorum. Quum hic dominatus fuerit, talia in morbis oportet expectare.

5. Les vents du midi émoussent l'ouïe, obscurcissent la vue, rendent lourd et la tête pesante, relâchent et affoiblissent le corps. Lorsque cette (température) domine, ses effets se font plus particulièrement ressentir aux personnes en état de maladie. Si les vents sont au nord, ils occasionnent des toux, des maux de gorge, resserment
le

le ventre , donnent la dysurie , causent des horrors , des douleurs de côté et de poitrine ; lorsque cette température domine , on doit s'attendre à de tels effets pour maladies.

ς'. Οκόταν θέρος γένηται ἤρι ὅμοιον , ἰδρῶτας ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς προσδέχεσθαι χρή.

6. Quando astas verī similis est , sudores (α in febribus multos expectare oportet.

9. Si l'été est semblable au printemps , attendez-vous à beaucoup de sueurs dans les fièvres.

ζ'. Ἐν τοῖσιν αὐχμοῖσι πυρετοὶ ὀξείες γίνονται. καὶ , ἢν μὲν ἐπὶ πλέον ἢ τὸ ἔτος τοικατέον ἐὼν , οἷον τὴν κατάστασιν ἐποίησεν , ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τὰ νοσήματα τοιαῦτα δεῖ προσδέχεσθαι.

7. In (1 sic citatibus (α febres acutæ fiunt. (2 Et , si quidem annus majore parte calis fuerit , qualem fecit constitutionem , (3 ut plurimum tales etiam morbos expectare oportet.

7. Dans les secheresses , les fièvres deviennent aiguës ; et si l'année est en grande partie

telle que la constitution qui a prédominé, on verra le plus fréquemment regner les mêmes maladies.

γ. Ἐν τοῖσι καθεστῆσσι καιροῖσιν, ἢν ἀραιὰς τὰ ἀραιὰ ἀποδιδῶσιν, εὐσταθείες, καὶ εὐκρινέες αἱ νόσοι γίνονται· ἐν δὲ τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν, ἀκατάστατοι, καὶ δύσκριτοι.

8. In constantibus (a temporibus, si tempestivè tempestiva reddantur, constantes, et judicatu faciles fiunt morbi : in inconstantibus (b autem, inconstantes, et difficiles judicatu.

8. Dans les saisons régulières, et qui se succèdent en temps convenable, les maladies sont régulières et sont jugées facilement ; au contraire, les irrégularités des saisons produisent des maladies irrégulières, et dont la crise ou le jugement est difficile.

δ'. Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ νόσοι, καὶ θανατωδέσταται τὸ ἐπίπαν· ἢρ δὲ ὑγιεινότατον, καὶ ἥκιστα θανατῶδες.

9. In (1 (a autumnno morbi acutissimi. et perniciosissimi omnino : (2 (b

ver autem saluberrimum, et minimè exitiale.

9. En automne les maladies sont très-aiguës et tout-à-fait pernicieuses ; le printemps, au contraire, est très-salubre et très-peu mortel.

ι. Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνουσι κακόν.

10. Autumnus (α tabidis malus.

10. L'automne est funeste aux phthisiques.

ια. Περὶ δὲ τοῦ ὥρου, ἢν μὲν ὁ χειμὼν αὐχμηρὸς καὶ βόρειος γίνηται, τὸ δὲ ἔαρ ἑπομένον καὶ νότιον, ἀνάγκη τῷ θέρει πυρετὸς ὀξείας, καὶ ὀφθαλμίας, καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα δὲ τῇσι γυναῖξιν, καὶ ἀνδράσι τοῖσιν ὕποῖτι τὰς φύσεις.

11. Quod ad anni tempora, si quidem hyems (α sicca et aquilonia fuerit, ver autem pluviosum et australe, (1 æstate necesse est febres acutas oriri, et ophthalmias, (2 et dysenterias, maximè autem mulieribus, et viris naturâ humidis.

11. Quant aux saisons, si l'hiver est sec et boréal, et le printemps pluvieux et austral;

il y aura nécessairement en été des fièvres aiguës, des ophthalmies, et des dysenteries : les hommes d'un tempérament humide ou pituiteux et les femmes, en seront principalement attaqués.

ιβ'. Ην δὲ νότιος ὁ χειμὼν, καὶ ἑπομ-
 ερος, καὶ εὐδίας γένηται, τὸ δὲ ἔαρ ἀνέμην-
 ρὸν καὶ βόρειον, αἱ μὲν γυναῖκες, ἥσιν οἱ τό-
 κοι πρὸς τὸ ἥρ, ἐκ πάσης προφάσιος ἐκτι-
 τρώσκουσιν· αἱ δ' ἂν τέκωσιν, ἀκρατέα καὶ
 νοσώδεα τὰ παῖδιά τίκτουςιν, ὥσπερ ἡ πα-
 ραυτικά ἀπόλλυσθαι, ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεα
 ζῆν ἑόντα. τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεν-
 τερῖαι, καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ γίνονται. τοῖσι
 δὲ πρεσβυτέροισι κατάρρῃοι συντόμως ἀπολ-
 λύντες.

12. Si verò hyems australis, (α et pluviosa, et tranquilla sit, (i ver autem siccum et aquilonium, mulieres, quidem, quibus partus in ver incidit, ex omni occasione abortiunt : quæ verò pepererint, infirmos et morbosos pariunt pueros, ita ut, vel statim illi pereant, vel tenues et morbosus vivant. Cæteris verò mortalibus dysenteria, et

ophthalmiæ siccae oriuntur; senioribus autem catarrhi brevi perimentes.

12. Mais si l'hiver est austral, pluvieux et tranquille, et le printemps sec et boréal; les femmes enceintes dont l'accouchement tombe au printemps, sont exposées à faire des fausses couches pour la moindre cause; et celles qui accouchent à terme, mettent au monde des enfans foibles et mal portans, qui meurent presque en naissant, ou qui sont fluets et valétudinaires durant toute la vie. Les autres personnes, sont sujettes aux dysenteries et aux ophthalmies sèches; et les vieillards sont attaqués de catarrhes suffoquans.

ιγ'. Η'ν δὲ τὸ θερος αὐχμηρὸν καὶ βορειον γένηται, τὸ δὲ φθινόπωρον ἑπομῆρον καὶ νότιον, κεφαλαλγίαι ἐς τὸν χειμῶνα γίνονται, καὶ βῆχες, καὶ βράγχοι, καὶ κόρυζαι, ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσεις.

13. Si verò æstas sicca (α et aquilonia fiat, autumnus autem pluviosus (b et australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, et tusses, et raucedines, et gravedines: quibusdam verò etiam tabes.

13. Quand un été sec et boréal est suivi d'un automne pluvieux et austral, il règne dès le commencement de l'hiver, des douleurs de tête, des toux, des enrouemens, des coryza, et quelques phthisies.

ιδ'. Η'ν δὲ βόρειον ἢ καὶ ἀνύερον, τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἔξοι τὰς φύσεις, καὶ τῇσι γυναίκεσι, ξύμφερρον· τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμῖαι ἔσονται ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξείες, καὶ κόρυζαι (χρόνιαι·) ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι.

14. Si verò (α aquilonius et sine pluviis autumnus fuerit, iis quidem qui naturâ sunt humidi, et mulieribus, commodus erit : reliquis verò erunt ophthalmiæ siccae, et febres acutæ, et gravædines (diuturnæ) ; nonnullis verò etiam melancholiæ.

14. Si l'automne est boréal et sans pluie, cette saison sera favorable aux hommes d'un tempérament humide ou pituiteux, et aux femmes; quant aux autres, elle leur causera des ophthalmies sèches, des fièvres aiguës, des catarrhes chroniques, et à quelques-uns, des affections mélancholiques.

ιέ. Τῶν δὲ κατασφισίαν τῷ ἐνιαυτῷ, τὸ μὲν ὅλον, οἱ αὖχοι τῶν ἐπομῆριων εἰσι ὑγιεινότεροι, καὶ ἥστον θανατώδεις.

15. Ex anni verò constitutionibus, in universum quidem siccitates pluviosis (α sunt salubriores, et minùs lethales.

15. De toutes les constitutions de l'année en général, celles qui sont sèches sont plus salubres et moins mortelles que les pluvieuses.

ις'. Νεσθήματα δὲ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομῆρσι ὥς τὰ πολλά γίνεται, πυρετοὶ τε μακροί, καὶ κοιλίης ῥύσεις, καὶ σηπιδόνες, καὶ ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκτοί, καὶ κυνάγχαι. ἐν δὲ τοῖσιν αὖχοις, φθινώδεις, ὀφθαλμῖαι, ἀρθρίτιδες, τραγχουρίαι, καὶ δυσεντερῖαι.

16. Morbi autem in pluviosis (α quidem plerumque fiunt, et febres longæ, et alvi fluxiones, et putredines, (τ et epileptici, et apoplectici, et anginae. In siccitatibus (ὁ verò tabidi, ophthalmiae, arthritides, urinae stillicidia, et dysenteriae.

16. Dans les saisons pluvieuses règnent la plupart des maladies, mais surtout des fièvres de long cours, des diarrhées, des affections putrides, des attaques d'épilepsie, des apoplexies, des squinancies; dans les sécheresses on voit des phthisies, des ophthalmies, des douleurs arthritiques, des dyssenteries et des difficultés d'uriner.

17. Αἱ δὲ καθ' ἡμέρην καταστάσεις, αἱ μὲν βόρειοι, τὰ τε σώματα ξυγνίσκωσι, καὶ εὐτονα, καὶ εὐκίνητα, καὶ εὐχρῶα, καὶ εὐηκοώτερα ποιεῖσι, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὄμματα δάκνυσι· καὶ περὶ τὸν θώρακα ἄλγημα, ἢν τι προὔπαρξη, μᾶλλον πονέουσιν. αἱ δὲ νότιοι διαλύουσι τὰ σώματα, καὶ ὑγραίνουσι, καὶ βαρυηκοίας τε καὶ καρηβαρίας ποιεῖσι, καὶ ἰλίγρους ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ τοῖσι σώμασι δυσκινήσιν, καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

17. Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem (a) corpora compingunt, et robusta, (b) et faciliè mobilia, et benè colorata, et meliùs audientia faciunt, alvos etiam siccant, et oculos mordent; et dolorem circa thoracem, si quis præexistat, majorem faciunt. (c)

Austrinæ verò corpora dissolvunt, et humectant, et auditus graves, et capitibus gravitates faciunt, et vertigines in oculis, (1 et corporibus motum difficilem, et alvos humectant.

17. Quant aux constitutions journalières, les boréales raffermissent le corps, lui donnent de l'agilité et de la force; lui impriment une bonne couleur, aiguissent l'ouïe, resserrent le ventre, picotent les yeux, occasionnent des maux de poitrine; et si on y éprouvoit déjà quelque douleur, elle s'irrite: les constitutions australes, au contraire, affoiblissent le corps, le surchargent d'humidité, émoussent l'ouïe, rendent la tête pesante, causent des vertiges, jettent dans la langueur, et produisent le relâchement du ventre.

ιή. Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τῷ μὲν ἥρος, καὶ ἄκρῳ τῷ θερέος, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τετάρτων ἐχόμενοι τῇσιν ἡλικίῃσιν, ἀριστὰ τε διάγουσι, καὶ ὑγιαίνουνσι μάλιστα. τῷ δὲ θερέος, καὶ τῷ φθινοπώρου μέχρι μὲν τινος, οἱ γέροντες. τὸ δὲ λοιπὸν τῷ φθινοπώρῳ, καὶ τῷ χειμῶνος, οἱ μέσοι τῇσιν ἡλικίῃσι.

18. Secundum tempora autem, vere

quidem , et primâ ætate , pueri , (α et his ætate proximi , optimè degunt , et maximè sani sunt. (1 Ætate verò , et parte quadam autumnì , senes. Reliquo sed autumnno , et hyeme , qui medii sunt ætate.

18. Quant aux saisons elles-mêmes , les enfans et les jeunes gens passent très-bien le printemps et la première partie de l'été , et jouissent d'une santé parfaite ; de même que les vieillards pendant l'été et une partie de l'automne ; mais les hommes de l'âge intermédiaire , se trouvent mieux du reste de cette saison et de l'hiver.

18. Νοσήματα δὲ πάντα μὲν ἐν πάσῃσι τῇσιν ὥρῃσι γίνεται , μᾶλλον δὲ ἓνα καὶ ἐνίᾳς αὐτέων καὶ γίνεται καὶ παροξύνεται.

19. Morbi autem quilibet fiunt quidem (α in quibuslibet anni temporibus , (1 nonnulli verò in quibusdam ipsorum potius et fiunt , et exacerbantur.

19. Il survient des maladies de tous genres dans toutes les saisons , mais il en est qui sont

plus fréquentes, d'autres qui acquièrent de nouvelles forces *de préférence* dans certaine saison.

κ'. Τῶ μὲν γὰρ ἥρος, τὰ μανικά, καὶ τὰ μελαγχολικά, καὶ τὰ ἐπιληπτικά. καὶ αἵματος ῥύσιες, καὶ κυνάγχαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχαι, καὶ βήχες, καὶ λέπραι, καὶ λειχήνες, καὶ ἀλφοὶ, καὶ ἐξανθήσεις ἐκλώδεες πλεῖσται, καὶ φύματα, καὶ ἀρθριτικά.

20. Vere (α, quidem insanix, et melancholix, et (1 epilepsia, (2 et sanguinis fluxiones, et angina, et gravedines, et raucedines, et tusses, et lepræ, et impetigines, et vitiligines, et (b pustulæ ulcerosæ plurimæ, et tubercula, (3 et articulorum dolores.

20. Les maladies propres au printemps sont, la manie, la mélancholie, l'épilepsie, les hémorrhagies, les angines, les enrrouemens, le coryza, la toux, la lèpre, des efflorescences farineuses, et autres *affections* impetigineuses *de la peau*; beaucoup de pustules ulcéreuses, des tubercules et des douleurs arthritiques.

κα'. Τῶ δὲ θέρους, ἔνιά τε τριτίων, καὶ

πυρετοὶ ζυνεχίεις, καὶ καυσοί, καὶ τριταῖοι
 πλεῖστοι, καὶ τεταρταῖοι, καὶ ἔμετοι, καὶ
 διάρροιαί, καὶ ὀφθαλμίαι, καὶ ὠτῶν πόνοι,
 καὶ στοματῶν ἐλκώσεις, καὶ σηπεδόνες αἰ-
 δοίων, καὶ ἰδρωα.

21. Æstate verò, et horum nonnulla,
 et febres continuæ, (1 et ardentes, et
 tertianæ plurimæ, et quartanæ, et (α
 vomitus, et alvi fluxus, et ophthalmiæ,
 et aurium dolores, et oris exulceratio-
 nes, et pudendorum putredines, et su-
 damina.

21. Plusieurs de ces maladies se sont remar-
 quer en été, et de plus des fièvres continues,
 ardentes, et la plupart des fièvres tierces et
 quartes; des vomissemens, des flux de ventre,
 des ophthalmies, des douleurs d'oreilles, des
 ulcérations de la bouche, des ulcères putrides
 aux parties génitales, et des échauboulures.

κβ'. Τῷ δὲ φθινοπώρῃ, καὶ τῶν θερι-
 νῶν τὰ πολλά, καὶ πυρετοὶ τεταρταῖοι,
 καὶ πλάνητες, καὶ σπλῆνες, καὶ ὕδρω-
 πες, καὶ φθίσεις, καὶ σπραγγούριαι, καὶ
 λειεντερίαι, καὶ δυσεντερίαι, καὶ ἰσχιάδες,

καὶ πυνάγχαι, καὶ ἄσθματα, καὶ εἰλεοὶ,
καὶ ἐπιληψίαι, καὶ τὰ μανικά, καὶ τὰ με-
λαγχολικά.

22. Autumno autem, et ex æstivis multa, (1 et febres quartanæ, (α et erraticæ, (2 et lienes, et hydropes, (3 et tabes, et urinæ stillicidia, et lenterix, et dysenterix, et coxæ *dolores*, et anginæ, et asthmata, et volvuli, et epilepsix, et insanix, et melancholix.

22. On voit régner en automne plusieurs des maladies d'été, ainsi que des fièvres quartes, erratiques, des affections de la rate, des hydropisies, des phthisies, des difficultés d'uriner, des lenteries, des dysenteries, des douleurs de sciatique, des squinancies, des asthmes, des volvulus, des épilepsies, des délires et des mélancholies.

κγ'. Τῷ δὲ χειμῶνος, πλευρίτιδες, περιπνευμονίαι, λήθαργοι, κόρυζαι, βράγχοι, βῆχες, πόνοι στήθεων, καὶ πλευρέων, καὶ ὀσφύος, καὶ κεφαλαλγίαι, ἱλιγγοί, ἀποπληξίαι.

23 (1 Hyeme (α verò, pleuritides,

peripneumoniæ, lethargi, gravedines, raucedines, tusses, (2 dolores pectorum, et laterum, et lumborum, et capitis dolores, vertigines, (3 apoplexiæ.

23. L'hiver donne naissance aux pleurésies, aux péripneumonies, à la léthargie, aux enrrouemens, aux rhumes, aux toux, aux douleurs de poitrine, de côté, et des lombes; aux céphalalgies, aux vertiges, et aux apoplexies.

κδ'. Ἐν δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιάδε ζυμ-
βαίνει· τοῖσι μὲν μικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παι-
δίοισιν, ἄφθαι, ἔμετοι, βῆχες, ἀγρι-
πνίαι, φόβοι, ὀμφαλῶ φλεγμοναί, ὅταν
ὕγρότητες.

24. In ætatibus autem talia eveniunt. Parvis quidem (α et recens natis pueris aphthæ, vomitus, tusses, vigiliæ, pavores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

24. Dans les âges, se déclarent les maladies dont nous allons parler : les petits enfans et les nouveau-nés, sont sujets aux aphthes, au vomissement, à la toux, aux veilles, à la peur, à l'inflammation du nombril. et à l'humidité des oreilles.

κέ. Πρὸς δὲ τὸ ὀδοντοφυεῖν προσάγ-
σιν, ἔλων ὀδαξισμοὶ, πυρετοὶ, σπασμοὶ
διάρροιαι καὶ μάλιστα, ὅταν ἀνάγῃ τὰς
κυνόδοντας, καὶ τοῖσι παχυτάτοισι τῶν
παιδίων, καὶ τοῖσι σκληράς τὰς κοιλίας
ἔχουσι.

25. Ad dentitionem verò (α acceden-
tibus gingivarum pruritus, febres, (1
convulsiones, alvi profluvia; et maximè
ubi caninos dentes producunt, et iis
qui inter pueros sunt crassissimi, (2 et
qui alvos duras habent.

25. A l'approche de la dentition, ce sont
des démangeaisons aux gencives, des fièvres,
des convulsions et des flux de ventre, surtout
lorsque les dents canines commencent à
percer aux enfans, et ceci arrive particulière-
ment à ceux de ces derniers, qui sont très-re-
plets, et à ceux qui ont le ventre res serré.

κε'. Πρεσβυτέροισι δὲ γενομένοισι, πα-
ρίσθμια, σπονδύλι τῶ κατὰ τὸ ἰνίον εἰσῶ
ᾠτιες, ἄσθματα, λιθιάσεις, ἑλμινθες τρογ-
γύλαι, ἀσκαρίδες, ἀκροχορδόνες, σατυ-

ριασμοὶ, (σραγ[σ]ρίαι) χοιράδες, καὶ ἑτέρα
φύματα, μάλιστα δὲ τὰ προειρημένα

26. Iis autem qui ætate sunt majores ,
(α tonsillæ inflammata, verticuli in oc-
cipitio introrsum extrusiones, asthmata,
(1 calculorum generationes , (2 lum-
brici rotundi, ascarides, verrucæ pen-
siles, (3 satyriasmī, (stranguriæ),
strumæ, et cætera tubercula, maxime
verò suprà dicta.

26. Les enfans plus âgés, sont sujets à l'in-
flammation des amygdales, à la dyspnée, à la
courbure de la colonne épinière, *au rachitis*,
aux calculs de la vessie, aux vers lombrics et
ascarides, aux écrouelles, à la strangurie, à l'ar-
deur des parties génitales, à de petites verrues,
et à d'autres tubercules, mais plus particu-
lièrement ceux dont nous venons de parler.

κζ'. Τοῖσι δὲ ἔτι πρεσβυτέροισι, καὶ
πρὸς τὴν ἡσὴν προσάγχι, τουτέων τε τὰ
πολλὰ, καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μᾶλλον, καὶ
ἐκ ῥινῶν αἵματος ῥύσεις.

27. Ætate verò adhuc (α provectioni-
bus, et ad pubertatem accedentibus,

horum quidem multa, et febres diurnae magis, et ex naribus sanguinis fluxiones.

27. Ceux qui sont dans l'âge voisin de la puberté, éprouvent plusieurs de ces affections, mais ils sont plus exposés à avoir des fièvres de long cours et des hémorrhagies nasales.

καί. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι πά-
σκει κρῖνεται, τὰ μὲν, ἐν τεσσαράκοντα
ἡμέρησι· τὰ δέ, ἐν ἑπτὰ μηνσί· τὰ δέ, ἐν
ἑπτὰ ἔτεσι· τὰ δέ, πρὸς τὴν ἡδὴν προ-
σάγουσιν. ὅσα δ' ἂν διαρρίνη τοῖσι παι-
δίοισι καὶ μὴ ἀπολυθῇ περὶ τὸ ἡϊάσκειν,
ἢ τῇσι θήλεσι περὶ τὰς τῶν καταμηνίων
ἐκρήξιας, χρονίζειν εἴωθε.

28. Plurimae quidem affectiones in pueris judicantur, aliae (a) in quadraginta diebus, aliae in septem mensibus, aliae in septem annis : aliae ipsis ad pubertatem accedentibus. (1) Quae verò in pueris permanserint, neque solutae fuerint circa (b) pubertatem, aut in feminis circa menstruum eruptiones, diu perseverare solent.

28. La plupart des maladies des enfans sont jugées, les unes dans quarante jours, les autres à sept mois, d'autres à sept ans, et quelques-unes à l'approche de la puberté ; mais les maladies qui ont persisté au delà de l'enfance, et qui n'ont point cédé à la puberté chez les hommes, ou à la première éruption des menstrues chez les femmes, ordinairement persévèrent.

κθ'. Τοῖσι δὲ νεηνίταισιν, αἵματος πύσσις, φθίσις, πυρετοὶ ὀξείες, ἐπιληψίαι, καὶ ἄλλα νεσήματα, μάλιστα δὲ τὰ προειρημένα.

29. Juvenibus autem, sanguinis spūtionēs, (1) (α) tabes, febres acutæ, (2) epilepsia, et cæteri morbi, maximè verò suprà nominati.

29. Les maladies des jeunes gens sont le crachement de sang, la phthisie, les fièvres aiguës, l'épilepsie, et la plupart des autres maladies, mais particulièrement celles dont nous venons de parler.

λ'. Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ταύτην, ἄσθματα, πνευρίτιδες, περιπνευμοίαι, κήθαργοι, φρενίτιδες, καῦσοι, διάρροιαι

χρόνιαι, χολέραι, δυσεντερίαι, λειεντερίαι, αἱμορροΐδες.

30. Ultra hanc ætatem verò (*α* *progressis*, asthmata, (1 pleuritides, peripneumonix, lethargi, phrenitides, febres ardentes, (2 alvi profluvia diuturna, cholerae, dysenterix, lenterix, hæmorrhoides.

30. Passé cet âge, on est sujet à l'asthme, à la pleurésie, à la péripneumonie, à la léthargie, à la phrénésie, aux fièvres ardentes et à de longs flux de ventre : *on devient encore* sujet au cholera, à la dyssenterie, à la lenterie et aux hémorrhoides.

λά. Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι, δύσπνοιαι, κατάρροι βηχῶδεις, τραγουργίαι, δυσουρίαι, ἄρθρων πόνοι, νεφρίτιδες, ἱλιγγοί, ἀποπληξίαι, καχεξίαι, ξυσμοὶ τῷ σώματος ὅλα, ἀγρυπνίαι, κοιλίης, καὶ ὀφθαλμῶν, καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμολυαπίαι, γλαυκῶσιες, βαρυηκοΐαι.

31. Senibus autem (*α*, spirandi difficultates, catarrhi tussiculosi, (1 stran-

guriæ, dysuriæ, (2 articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, mali corporis habitus, pruritus totius corporis, vigiliæ, alvi, et oculorum, et narium humiditates, visûs hebetudines, glaucedines, auditûs gravitates.

31. Enfin, les vieillards sont attaqués de la dyspnée, de catarithes avec toux, de strangurie, de dysurie, de la goutte, de la colique néphrétique, des vertiges, de l'apoplexie, de la cachexie, de démangeaisons partout le corps; ils sont pris d'insomnie, de diarrhée, d'écoulemens par le nez et les yeux; et ils deviennent sujets à l'affoiblissement, à la perte de la vue, et à la dureté de l'ouïe.

NOTAE

IN

SECTIONEM TERTIAM.

APHOR. I. (1 OCTIMESTR. iij, 29. — Humor. vj, 5; viij, 15, 16. — Aër. Aq. Loc. j, 19. — Viet. Acut. xvij, 9. — Morb. Sac. xij, 7. = (2 Aph. ij, 51. — II. Diæt. vj, 7. — Humor. vij, 7. = (a Cels. j, c. 2, s. 1, p. 40, l. 18 et ij præf., s. 3, p. 53, l. 19.

Vide Ballonium, I. Sydenham, sect. j, cap. 2; Huxam, de aëre, etc., t. j, prolegomen; Ramazzini, et alios passim.

Observare hic oportet, quod Hippocrates non dividat quatuor anni tempora, ut Astrologi, qui solam rationem habent solstitiorum et æquinoctiorum; neque ut grammatici, qui numerant menses; sed, ut medicum decet, rationem habeat mutationum, quæ in aëris temperie contingunt, adjungens mensem majum æstati, hiemi vero novembrem; faciatque ver et autumnum, mensium binorum, æsta-

tem, et hiemem, quaternorum. Incipit enim Hippocrati ver ab æquinoctio, et durat usque ad ortum pleiadum seu vergiliarum (h. e. ad finem aprilis, quod intervallum non est duorum mensium). Hinc incipit *æstas*, duas, complectens partes, quarum prior, *ἀκαδικτή*, usque ad ortum canis extenditur; posterior (ὀπώρα senescens æstas) est ab hoc ortu usque ad ortum arcturi: ita ut spatium utriusque partis sit quatuor mensium, à fine nimirum aprilis ad septembris principium. *Autumnus* est ab ortu arcturi, et finitur occasu pleiadum; quo intervallo temporis comprehenduntur menses september et october. Hinc incipiens *hiems* durat usque ad æquinoctium vernum, complectitur majus quatuor mensium intervallum, dividiturque in tres partes, quarum prima à principio novembris ad brumam seu solstitium (dicitur hoc intervallum σπέρμα, ὅς satio seu tempus serendi); altera solstitium seu brumam continet; tertia in æquinoctio verno desinit. Vid. *Hipp. l. 3, de diæta*, N. 2. Martian., p. 17; Valles. Epid., pag. 5; Moreau in Schol. sal., p. 30 et seq.; Rieger., vol. j, pag. 337.

APHOR. II. Vet. Medicin. xxxvij, 14. — I. Diæt. xvj, 12. — III. Diæt. j, 6. — Acr. Aq. Loc. xxiv, 9; lvj, 7, 8. — Morb. Sac. xvij,

34. = (a Cels. j, c. 2, s. 6, p. 46, l. 18. —
Vide van-Swieten, tom. v, pag. 140.

APHOR. III. Humor. viij, 11, etc. = (1 Aph.
 viij, 6; Aph. ij, 34. = (a Cels. ij, præf., s. 4,
 p. 56, l. 3.

Versionem Foesii non accepimus, licet eam
 jam dudum Galenus indicaverit, assenserint-
 que Galeno Mercurialis, Heurnius, Hollerius.
 Textui enim ab omnibus accepto consona non
 est. Potest verò propositio de morborum cum
 intemperie corporis jam positâ consensu in-
 telligi.

APHOR. IV. Humor. vj, 5, 6; vij, 7. = (a
 Cels. j, c. 1, s. 4, p. 40, l. 16; et ij, præf., s. 3,
 p. 53, l. 17.

APHOR. V. Humor. viij, 1. — Morb. Sac.
 xv, 3, 8, 19 ad 22. = (a Cels. ij, præf., s. 2,
 p. 53, l. 6. = (b Cels. ij, præf., s. 2, p. 53, l. 1.

Auster tepore humido plumbeus vasa laxat,
 et vires exsolvit; perspirationem, imminutâ
 vasorum actione, tum et auctâ humiditate re-
 tinet intus: hinc qui ab aggesto et putrefacto
 humore pendent morbi. Stringit solida Aquilo,
 humores compingit; hinc qui à stricto in-
 flammatorio deducuntur morbi: hi verò in
 eam partem decumbunt quam ventus in eam
 directus constrinxerit, ut docuit, vir si quis
 alius, in Medicinâ inventor sanct. Sanctorius;

nec adeo tamen certa ventorum actio, cum, Austro flante, gelu dirum anno 1709 observaverint. Nec prætermittendum est observasse, à quâ regione Venti in nòs impetum faciant? An à mari tepidiore? An à montibus nivosis? An subito defervescant? An diù perflent? — *Vide Hippocratem de aëre locis et aquis, et Huxham in prolegomenis, t. j, et Hist. de l'Académie des Sciences, an 1710.*

APHOR. VI. Humor. vij, 11. — (a Cels. ij, præf., s. 3, p. 54, l. 22.

Hyeme aggeritur, ob minorem perspirationis efficaciam, humor pituitosus. Æstate dissolari debuerat. Si verò frigidior illa, et similis veri fuerit, exundabit humor ille; nisi stimulo febris excita sibi molietur per sudores exitum.

APHOR. VII. (1 Humor. viij, 6. — II. Epid. j, 10. — (2 Humor. ix, 8. — (3 Aph. iij, 19. — (a Cels. ij, præf., s. 3, p. 55, l. 15. — *Vide van-Swieten, t. ij, p. 453.*

APHOR. VIII. Humor. vij, 3, 15. — II. Epid. j, 20, 21. — (a Cels. ij, præf., s. 3, p. 53, l. 18. — (b Cels. ij, præf., s. 3, p. 55, l. 22. — *Vide van-Swieten, t. v, p. 140.*

APHOR. IX. (1 II. Prædict. xij, 4. — II. Epid. j, 15. — (2 II. Epid. j, 23. — (a Cels. j, c. 1, sect. 14, p. 40, l. 10. (b Cels. ij, præf., s. 3,

p. 53, l. 18 et 29. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 460, 461, 730.

Effectum, diluente vehiculo orbum, exustum sanguinem, fessa laxataque vasa aggreditur inæqualis Autumni temperies. Natura debilis, periodus incerta ad perniciem concurrunt. Vere, sanguis aquosior, vasa flexilia, nervi è sopore redivivi, natura fortior, periodus constantior, ad salutem, datà operâ, consentiunt.

APHOR. X. Aph. iij, 22. — II. Prædict. xij, 3. — VI. Epid. vij, 77. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 87, l. 23.

Suaderent Ver ipsis infensissimum accuratæ J. Huxham Observationes de Aëre et Morbis Epidemicis.

APHOR. XI. Aër. Aq. Loc. xxv, 7. = (1 II. Epid. j, 10. = (2 Aër. Aq. Loc. xxv, 13. = (a Cels. j, c. 1, s. 4, p. 28, l. 28.

Præsenti Aphorismo, ut et sequentibus, expenduntur effectus, qui varias tempestatum vices sequuntur, quoties ab instituto naturæ aberrat temporis constitutio, nec τὰ ὁραῖα ὁραίως apparent. Mechanica frigoris, caloris, ariditatis, humiditatis actio experimentalī Hippocratis expositioni responsat exactè. Laxatio

fibrarum, perspirationis retentio, motûs imminutio, sequelæ sunt frigoris humidi. Siccitas contrà et densitas humorum, fibrarum tensio, perspiratio enormis, calidam et siccam tempestatem comitantur; madidis advolans alis Notus æstum simul et humiditatem infert, undè fibris laxitas, humeribus metuenda putredo. Boreas contrà omnia gelu constringit, fibras compingit et humores. Ex hisce primariis secundarii effectus variarum aëris constitutionum, quoties nec debito ordine variant, nec certo tempore sibi succedunt, facillè deducuntur; modò, dùm mechanicæ actioni harum Atmosphæræ qualitatum attendimus, sensibilitatis etiam ratio habeatur, quæ, cum fibrarum mobilitatem regat, in subitis temporum mutationibus præstat plurima. Sed hæc omnia nemo plenius aut doctius exposuit Joanne Huxham, de Aëre et Morbis Epidemicis vol. j, Prolegom. Addeamus tamen quod jam et Sydenham, et Freind, et alii notarunt; observatoribus Medicis, dum constitutiones morbosas prædominantes exponunt, curæ id impendè, ut non tantum unius tempestatis vires afferant, sed plures sese mutuò excipientes conferant et expendant.

APHOR. XII. Aër. Aq. Loc. xvj, 4, 5, 6. =
(1 Nat. Human. xij, 7. = (a Cels. ij, c. 2,

s. 7, p. 108, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 567.

APHOR. XIII. Aër. Aq. Loc. xxviii, 4, 5. = (a Cels. ij, c. 2, s. 3, p. 148, l. 18. — *Vide* hic luculentas Cl. de Villebrune annotationes.

APHOR. XIV. Aër. Aq. Loc. xxix, 1, 2. = (a Cels. ij, 1, p. 46, l. 1.

APHOR. XV. Aër. Aq. Loc. ij, 3. = (a Cels. præf. ij, pag. 53, l. 12. — *Vide* Huxham de aëre, etc., t. ij, præf. p. vij.

APHOR. XVI. (1 Morb. Sac. xv, 1, 2. = (a Cels. j, c. 1, s. 4, p. 29, l. 21. = (b Cels. ij, 1, p. 45, l. 5. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 362.

Duplex morborum ab imbribus origo, solidorum inertia, aquosior humorum compages. Illic coctionis atque criscoe tarditas, humidi perspirabilis redundantia; unde stases, putredines in variis partibus. A siccitate contra, densum inflammatorium, vasorum strictura humorum acrimonia.

APHOR. XVII. (1 Aph. v, 16. = (a Cels. ij, 1, p. 44, l. 25. = (b Cels. j, 9, pag. 39, l. 27. = (c Cels. ij, 1, pag. 44, l. 27. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 37.

APHOR. XVIII. (1 Morb. Sac. xij, 1. = (a Cels. ij, 1, p. 46, l. 9.

APHOR. XIX. Prænot. xxvij, 4. = (1 Aph. ij, 17. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 70, l. 2.

APHOR. XX. (1 Morb. Sac. xij, 5, 6, 7. = (2 Nat. Human. xij, 11. — (3 Aph. vj, 55. = (a Cels. ij, præf. p. 51, l. 22. = (b Cels. v, c. 2, s. 14, p. 387, l. 21. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 595, 730.

APHOR. XXI. Affection. xij, 1 ad 5. — (1 Vict. Acut. xxxiv, 2. — (a Cels. ij, præf., p. 52, l. 3. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 107; tom. ij, pag. 38, 410.

APHOR. XXII. (1 Nat. Human. xxix, 2. — (2 Int. Affect. xxvij, 2. — (3 Aph. ij, 10. — (a Cels. ij, præf., p. 52, l. 12. *Vide* van-Swieten, t. v, p. 607.

APHOR. XXIII. (1 Affect. vij, 3, 4. — (2 Aph. vj, 5. — (3 Glandul. ix, 4 ad 8. — (a Cels. ij, præf., p. 52, l. 27. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 535, 730; t. iij, p. 2.

APHOR. XXIV. (a Cels. ij, præf., pag. 56, l. 17. — Æginet. j, 10. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 68; t. iij, p. 197, 216; t. iv, p. 580, 585.

Ætatum morbi à necessariâ illarum constitutione facile deducuntur. Mollior est et aquosior infantum temperies, genus nervosum mobilissimum, lymphâ mucosa, ad acidum fermentativum vergens, exundat. Progressu æta-

tis visceribus robur, fibris tonus accedit; evolvuntur glandulae, functionibus pares fiunt; hinc et patiuntur plurimum. Incremento corporis sumpto, validâ jam coctione, vasis adhuc flexilibus, exuberat cruor, et quaquaversus nititur ad exitum; donec vasa, per vitæ exercitium validiora facta, fortiùs distendenti resistant, et per varia emunctoria superfluum ablegent. At brevì ipsa vitæ actio senium inducit. Rigent vasa, languescit sanguinis circuitus. Hinc et coctio debiliior, et inertis pituitæ accumulatio, quæ senibus importuna et immedicabilia mala producit. Sed hæc accuratiùs nemo evolvit J. Russel Anglo: OEconom. Naturæ, in Glandul. parte II.

APHOR. XXV. (1 Aër. Aq. Loc. iv, 5. — Morb. Sac. xj, 1. — (2 Aph. ij, 53. — (a Cels. ij, præf., p. 56, l. 21. — Æginet. j, 8. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69; t. iij, p. 418; t. iv, pag. 663.

APHOR. XXVI. (1 Nat. Human. xxiv, 5. — Coac. iij, 398. — IV. Morb. xxvii, 1, 2. — (2 VI. Morb. xxvij, 9. — (3 VII. Epid. lj, 16. — (a Cels. ij, præf., p. 56, l. 27. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69; t. ij, p. 571, 640, 641; t. iv, pag. 613.

Verticuli Extrusiones. An à Rachitide? *Vide* Russel, OEconom. Naturæ, in Gland., p. 73.

APHOR. XXVII. (a Cels. ij, præf. p. 57, l. 7. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 69; t. iv, p. 13, 14.

APHOR. XXVIII. (1 Aph. ij, 45. — II. Prædict. xvj, 1, 3. — (a Cels. ij, præf. p. 57, l. 6. — (b Cels. ij, præf., p. 57, l. 8. — Plin. xxvij, c. iv, p. 689, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69.

APHOR. XXIX. (1 Aph. v, 9, viij, 7. — Coac. iij, 260. — (2 Morb. Sac. xij, 1. — (a Cels. ij, præf. p. 57, l. 16. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69; t. ij, p. 385, 531; t. iv, p. 14.

APHOR. XXX. (1 Coac. iij, 395. — (2 Aër. Aq. Loc. iv, 7. — VII. Epid. xl, 19. — (a Cels. ij, præf. p. 57, l. 18. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69; t. ij, p. 385, 531.

APHOR. XXXI. (1 Affect. xxix, 10. — (2 Coac. iij, 395. — (a Cels. ij, præf. p. 57, l. 23. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69; t. ij, p. 733; t. iij, p. 70, 264.

Τμήμα τέταρτον.

α. Τὰς κύσας φαρμακεύειν, ἥν ὀργᾶ, τετράμηνα, καὶ ἄχρι ἐπὶ τὰ μινῶν ἥσσον δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια, καὶ πρεσβύτερα, εὐλαβέεσθαι χρή.

1. *Pregnantes purgandæ, (1 si materia turgeat, quadrimestres, et usque ad septimum mensem: hæ verò minus. (2 Juniores autem, (α et seniores fœtus, cautè vitare oportet.*

1. Purgez les femmes enceintes depuis le quatrième mois seulement, jusqu'au septième s'il y a orgasme; mais moins aux autres époques qu'à celles-ci: car il faut craindre pour le fœtus plus jeune ou plus avancé.

β'. Ἐν τῇσι φαρμακείῃσι τοιαῦτα ἄγειν ἐκ τοῦ σώματος, ὅκοια καὶ αὐτόματα ἰόντα χρήσιμα· τὰ δὲ ἐναντίως ἰόντα, παύειν.

2. In purgationibus talia è corpore sunt ducenda, (1 qualia etiam spontè

prodeuntia utilia sunt : contrario autem modo prodeuntia , sistenda.

2. Dans toute purgation , il est avantageux d'expulser hors du corps , les *humeurs* qui auroient dû sortir spontanément ; autrement on doit supprimer les évacuations.

γ'. Ἡν μὲν, οἷα δεῖ καθαίρειν, καθαίρωνται, συμφέρει τε, καὶ εὐφώρας φέρουσι· τὰ δὲ ἐναντία, δυσχερῆς.

3. Si quidem , qualia purgari oportet, purgentur, confert, et facile ferunt: contraria verò , difficulter.

3. Si en effet l'on est purgé de ce qui doit l'être, cela est utile, et on le supporte aisément; mais difficilement si c'est le contraire.

δ'. Φαρμακεύειν θέρος μὲν, μᾶλλον τὰς ἀνω χειμῶνος δὲ, τὰς κάτω.

4. Purgandum , (1 æstate quidem , (2 magis superiores ventres : (2 hyeme verò, inferiores.

4. Il vaut mieux faire vomir en été , et purger en hiver.

ε'. Ὑπὸ κύνα, καὶ πρὸ κυνὸς, ἐργάδεις αἱ φαρμακεῖται.

5. Sub cane, et ante canem, (1 difficiles sunt purgationes.

5. Les purgatifs ont une action violente au moment de la canicule, et pendant sa durée.

ς'. Τὰς ἰσχυρὰς, καὶ εὐημέας, ἄνω φαρμακεύειν, ὑποσελλομένους χειμῶνα.

6. Graciles, (a et facile vomentes, sursum purgandi, vitantes hyemem.

6. Purgez par les vomitifs, les personnes maigres et qui vomissent aisément ; mais que ce soit avec réserve en hiver.

ζ'. Τὰς δὲ δυσημέας, καὶ μέσως εὐσάρκους, κάτω, ὑποσελλομένους θερόν.

7. Difficuler autem vomentes, et mediocriter carnosì, deorsum, vitantes æstatem.

7. Donnez la préférence aux purgatifs, pour les personnes dont l'embonpoint est médiocre et qui vomissent difficilement ; mais que ce soit avec réserve en été.

ή. Τὰς δὲ ψυχὰς, ὑποσελησμένους
τὰς ἄνω (φαρμακείας).

8. Tabidi verò, vitantes (purgationes) sursum.

8. Evitez de faire vomir les phthisiques.

9. Τὰς δὲ μελαγχολικὰς, ἀδριτέρως
τὰς κάτω. τῷ αὐτῷ λογισμῷ τὰναντία προ-
σιθεῖς.

9. Melancholicos autem, uberius
deorsum purgabis. Eadem ratione, con-
traria adhibens.

9. Purgez copieusement par les selles, les
atrabilaires ou mélancholiques; et faites ainsi
l'application des contraires, par le même
raisonnement.

1. Φαρμακεύειν ἐν τοῖσι λίην ὀξείσιν, ἢν
ὄργῃ, αὐθιμερόν· χρονίζειν γὰρ ἐν τοῖσι
τοιούτοις, κακόν.

10. Purgandum in valdè acutis, (1 si
turgeat materia, (2 eadem die: morari
enim in talibus malum est.

10. Pargez dans les maladies très-aiguës, le

même jour qu'il y a turgescence ; car tout délai est dangereux dans ces maladies.

ια. Οκόσοισι ερόφοι, κὲ περὶ τὸν ὀμφαλὸν πόνοι, καὶ ὀσφύος ἄλγημα, μὴ λυόμενον, μήτε ὑπὸ φαρμακείης, μήτ' ἄλλως, εἰς ὕδρωπα ξηρὸν ἰδρύεται.

11. Quibus tormina, (a et circa umbilicum dolores, et lumborum dolor, qui neque purgante, neque aliter solvitur, (1 in hydropem siccum firmatur.

11. Les tranchées, les coliques autour du nombril, et les douleurs dans les lombes, qui résistent aux purgatifs et aux autres moyens, se terminent par la tympanite.

ιβ'. Οκόσοισι κοιλίαι λειεντεριώδεις, χειμῶνος φαρμακεύειν ἄνω, κακόν.

12. Quibus alvi sunt lientericæ, eos hyeme sursum purgare, malum.

12. Il est dangereux de faire vomir en hiver, les lienteriques.

ιγ'. Πρὸς τὰς ἐλλεβοράς, τοῖσι μὴ ῥῆτ-
δίως ἄνω καθαιρεμένοισι, πρὸ τῆς πόσεως

προϋγγράινειν τὰ σώματα, πλείονι τροφῇ,
καὶ ἀναπαύσει.

13. Ad elleboros, qui non facile sursum purgantur, iis ante potionem corpora (α præhumectanda, copiosiore alimento, et quiete.

13. Ceux que l'ellébore fait vomir difficilement, doivent, avant la potion *purgative*, s'humecter le corps par des alimens plus copieux et par le repos.

1δ'. Ἐπεὶν πῶς τις ἐλλέβορον, πρὸς μὲν τὰς κινήσεις τῶν σωμάτων, μᾶλλον ἄγειν· πρὸς δὲ τὰς ὕπνους, καὶ μὴ κινήσεις, ἥστων. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ναυτιλία, ὅτι κίνησις τὰ σώματα ταράσσει.

14. Ubi biberit quis elleborum, ad motiones quidem corporum magis ducito : ad somnos verò, et quietem, minùs. Declarat autem etiam navigatio, quòd (1 motus turbat corpora.

14. Dès que quelqu'un a bu l'ellébore, il doit tenir son corps plus en mouvement; moins dormir et moins se reposer. En effet, la na-

vigation prouve que le grand mouvement émeut tout le corps.

14. Εἴπερ βέλῃ μᾶλλον ἄγειν τὸν ἐλλέβορον, κίνει τὸ σῶμα· εἴπερ δὲ παῦσαι, ὕπνον ποίει, καὶ μὴ κίνει.

15. Quando vis magis ducere elleborum, moveto corpus : quando verò cessare, (1 somnum facito, et non moveto.

15. Quand vous voudrez donc augmenter l'effet de l'ellébore, faites prendre au corps de l'exercice ; voulez-vous, au contraire, que le remède agisse moins, restez en repos et tâchez de dormir.

15'. Εἰλλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖσι τὰς σάρκας ὑγίαιας ἔχουσι· σπασμὸν γὰρ ἐμποιέει.

16. Elleborus periculosus est sanas (1 carnes habentibus : (1 convulsionem enim inducit.

16. L'ellébore est dangereux à ceux qui ont les chairs vigoureuses, car il fait naître des convulsions.

15. Α' πυρέτῃ ἔοντι, ἀποσιτίη, καὶ καρδιαγμός, καὶ σκοτόδινος, καὶ ὀλόμα ἐπιπύκνυνον, ἂν φαρμακείης δεῖσθαι, σημαίνει.

17. Non febricitanti appetitûs dejectus, et oris ventriculi morsus. (1 et tenebricosa vertigo, et os (a amarescens, sursùm purgante opus esse, indicat.

17. Le dégoût sans fièvre, et les pincemens à l'orifice supérieur de l'estomac, le vertige ténébreux et l'amertume de la bouche, indiquent le besoin de faire vomir.

16. Τὰ ὑπὲρ τῶν φρενῶν ὀδυνήματα, ὅποσα καθάρσιος δεόνται, ἂν φαρμακείης δεῖσθαι, σημαίνει · ὅποσα δὲ κάτω, κάτω.

18. Supra septum transversum dolores, qui purgatione egent, sursùm purgante opus esse indicant; qui verò infra, deorsùm.

18. Les douleurs situées au-dessus, du diaphragme, qui nécessitent la purgation, indiquent qu'il faut évacuer par le haut; et

celles qui sont au - dessous, indiquent qu'il faut évacuer par le bas.

18'. Ονόσοι ἐν τῇσι φαρμακοποσίῃσι μὴ διψῶσι καθαιρόμενοι, ἔπαύονται, πρὶν ἢ διψήσωσιν.

19. Qui in purgantium potionibus non sitiunt, dum purgantur, non cessant priusquam sitiverint.

19. Ceux qui après avoir pris des potions purgatives, ne se sentent point altérés tandis qu'ils sont purgés, ne sont point dégagés avant qu'ils n'aient soif.

19'. Α'πυρέτοισιν ἔσθιν ἢν γένηται εὐρύφως, καὶ γυνάτων βάρος, καὶ ὀσφύος ἄλγημα, κάτω φαρμακείης δεῖξαι σημαίνει.

20. Non febricitantibus si fiat tormen, et genuum gravitas, et lumborum dolor, deorsum purgante opus esse indicat.

20. Les tranchées sans fièvre, les coliques avec pesanteur aux genoux et douleurs dans les lombes, indiquent le besoin de purger.

κα. Ὑποχωρήματα μέλαινα, ὁκόσῃ αἵμα μέλαν, ἀπ' αὐτομάτη ἴοντα, καὶ ζὺν πυρετῷ, καὶ ἄνευ πυρετῷ, κάκιστα. καὶ, ὁκόσῃ ἂν τὰ χρώματα ὑποχωρημάτων πλείω πονηρότερα ᾖ, μᾶλλον κάκιστον· ζὺν φαρμάκῳ δὲ, ἁμεινον· καὶ, ὁκόσῃ ἂν χρώματα πλείω, ἔ πονηρά.

21. (1 Dejectiones (α nigræ, (2 qualis sanguis niger, (3 spontè prodeuntes, et cum febre, et sine febre, pessimæ; (4 et, quantò colores dejectionum plures fuerint pejores, eò deterius: cum purgante verò, melius; (5 et quantò colores plures, non mali sunt.

21. Les déjections noires, ou comme du sang noir, et spontanées, soit avec de la fièvre, soit sans fièvre, sont très-pernicieuses; plus il y a de mauvaises couleurs, plus aussi le mal est grand; il y a moins de mal avec un purgatif; et même si la couleur des déjections en est plus variée, elles ne sont point mauvaises.

κβ'. Νεκρομάτων ὁκόσων ἀρχομένων, ἢν χολὴ μέλαινα ἢ ἄνω, ἢ κάτω ἐπέλθῃ θανάσιμον.

22. Morbis quibusvis incipientibus , si bilis atra , vel sursùm , vel deorsùm prodierit , lethale.

22. Quand dans le commencement d'une maladie on rend par haut ou par bas de la bile noire , c'est un signe mortel.

κγ'. Οἰκόσσισιν ἐκ νεσημάτων ὀξέων , ἢ ἐκ πολυχρονίων , ἢ ἐκ τραυμάτων , ἢ ἄλλως πῶς λεπτυνόμενοις , χολὴ μέλαινα , ἢ ὁκοῖον αἷμα μέλαν , ἐπέλθῃ , τῇ ὑπεραιῇ ἀποθνήσκει.

23. Quibuscunque ex morbis acutis , aut ex diuturnis , aut ex vulneribus , aut aliter quocunque modo extenuatis , bilis atra , (i vel qualiscunque sanguis niger prodierit , postridiè moriuntur.

23. Les sujets exténués par des maladies aiguës ou très-longues , ou à la suite de blessure , ou par une autre cause quelconque , et qui rendent par les selles de la bile noire , ou comme du sang noir , meurent le lendemain.

κδ'. Δυσεντερίῃ , ἢν ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἄρξεται , θανάσιμον.

24. Dysenteria, si ab atrabile inceperit, lethale.

24. Si la dysenterie commence par de la bile noire, c'est un signe mortel.

κεί. Αἷμα ἄνω μὲν, ὀποῖον ἂν ᾖ, κακόν· κάτω δὲ, ἀγαθόν, μέλαν ὑποχωρόν.

25. Sanguis sursùm quidem, qualiscunque sit, malum : deorsùm verò, bonum, niger paululùm secedens.

25. Toute éjection de sang par le haut, est de mauvais augure : mais le sang noir qui sort en petite quantité par bas, est d'un bon pronostic.

κς'. Ἡ ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομένη οἶον σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανάτιμον.

26. Si à dysenteria detento velut (1 carunculæ secesserint, lethale est.

26. S'il paroît comme des caroncules dans les selles d'un dysentérique, il est affecté mortellement.

κζ'. Οὐόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἰ-

μορραγέει πλῆθος ὀκοθενῶν, ἐν τῇσιν ἀνα-
λήψει, τουτέοισιν αἱ κοιλίαι καθυγραί-
νονται.

27. Quibus per febres sanguinis copia
undecunque eruperit, his in refectioni-
bus alvi humectantur.

27. Dans les fièvres, les hémorrhagies abon-
dantes, quelqu'en soit le siège, donnent lieu
au relâchement du ventre dans la conva-
lescence.

κῆ. Ὅσοις χολάδεα τὰ διαχωρήμα-
τα, κωφώσιος ἐπιγινομένης, παύεται· κὴ
ὀκότοισι κώφωσις, χολωδέων ἐπιγινομένων,
παύεται.

28. Quibus (a biliosæ sunt egestio-
nes, surditate superveniente, cessant :
et, quibus surditas est, biliosis super-
venientibus, cessat.

28. La surdité qui survient lors des évacua-
tions bilieuses, les fait cesser; et réciproque-
ment, les évacuations bilieuses qui survien-
nent, font cesser la surdité.

κθ'. Ὅσοις ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκ-
ταιοῖσιν ἔξσι ῥίγηα γίνεται, δύσκριτα.

29. Quibus per febres sextâ die rigores fiunt, (*α* difficulter judicantur.

29. Dans la fièvre, lorsque le rigor se déclare le sixième jour, la crise se fait difficilement.

λ'. Οὐόσοισι παροξυσμοὶ γίνονται, ἢ ἀν' ὥρην ἀφ' ἣ ὁ πυρετός, εἰς τὴν αὖριον τὴν αὐτὴν ὥρην ἢν λάβῃ, δύσκριτα.

30. Quibus exacerbationes fiunt, quâcumque horâ dimiserit febris, posttridie eâdem horâ si corripuerit, difficulter judicantur.

30. Quant aux paroxysmes, quelque soit l'heure à laquelle la fièvre aura cessée; si elle prend à la même heure, le lendemain, ou le jour de l'accès suivant, elle est difficile à juger.

λβ'. Τοῖσι κοπώδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, εἰς ἄρθρα, καὶ παρὰ τὰς γνάθους μάλιστα, αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

31. (*ι* Lassatis per febres (*α* ad articulos, et circa maxillas maximè, abscessus fiunt.

31. Ceux qui dans les fièvres éprouvent des lassitudes pénibles, il leur vient des abcès aux articulations, surtout aux environs des mâchoires.

λβ'. Οκόσοισι δὲ ἀνισαμένοισιν ἐκ τῶν νῆσαν τι πονέει, ἐνταῦθα αἱ ἀποσάσεις γίγνονται.

32. Quibus ex morbo resurgentibus aliquid dolet, ibi abscessus fiunt.

32. Lorsque dans la convalescence quelque partie éprouve des douleurs, il s'y forme un abcès.

λγ'. Ἀτὰρ, ἢν καὶ προπεπνηκός τι ᾗ πρὸ τῆ νοσήειν, ἐνταῦθα σπρίζει ἡ νῆσος.

33. Sed et, si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus.

33. Mais si l'on a quelque partie souffrante avant la maladie, celle-ci y fixe son siège.

λδ'. Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ, οἰδήματος μὴ ἔόντος ἐν τῇ φάρυγγι, πνίξ ἐξαίφνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμον.

34. Si à febre detento, tumore in fau-

cibus non existente, suffocatio ex improvviso superveniat, lethale.

34. La strangulation qui survient tout à coup dans la fièvre, s'il n'existe aucune tumeur à la gorge, est mortelle.

λβ. Ἡ ὑπὸ πυρετῶ ἐχομένη ὁ τραχηλος ἐξαίφνης ἐπιστραφῇ, καὶ μόλις καταπίνειν δύνηται, οἰδήματος μὴ ἔοντος, θανάσιμον.

35. Si la febre detento (α collum de repente inversum fuerit, et vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.

35. Si le col se contourne subitement dans un *malade* attaqué de la fièvre, et que la déglutition soit empêchée sans la présence de quelque tumeur, c'est un signe mortel.

* λς'. Ἰδρωῶτες πυρεταίνουσιν ἢν ἄρξανται, ἀγαθοὶ τριταῖοι, καὶ πεμπταῖοι, καὶ ἐξδομαῖοι, καὶ ἐνναταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, καὶ πεσσαρεσκαῖδεκαταῖοι, καὶ ἐπτακαῖδεκαταῖοι, καὶ μίη καὶ (εἰκοσιῇ), (καὶ τετάρτῃ καὶ εἰκοσιῇ), καὶ ἐξδομῇ καὶ εἰκοσιῇ, καὶ τριακοσιῇ πρώτῃ, καὶ

τριακοστῇ τετάρτῃ. (καὶ τριακοστῇ ἑβδόμῃ, καὶ τεσσαρακοστῇ.) ἔτσι γὰρ οἱ ἰδρῶτες νῆ-
σας κρίνουσιν. οἱ δὲ μὴ ἔτσι γινόμενοι, πόνον
σημαίνουν, καὶ μῆκος νῆσας, καὶ ὑποτροπιασ-
μός.

* 36. Sudores febricitantibus si ince-
perint, boni sunt die tertiâ, et quintâ, et
septimâ, et nonâ, et undecimâ, et quartâ
decimâ, et septimâ decimâ, (et vigesimâ)
primâ, (et vigesimâ quartâ, et vigesimâ
septimâ, et trigesimâ primâ, et trigesimâ
quartâ, (et trigesimâ septimâ et quadra-
gesimâ). Hi enim sudores morbos judi-
cant. (1 Qui verò ita non fiunt, laborem
significant, et morbi longitudinem, (2
et recidivas.

* 36. Les sueurs sont bonnes dans les fièvres,
lorsqu'elles commencent le trois, le cinq, le
sept, le neuf, le onze, le quatorze, le dix-sept,
(le vingt) et un, (le vingt-quatre), le vingt-
sept, le trente et un, le trente-quatre, (le
trente-sept et le quarante.) Ces sueurs jugent
les maladies : celles qui ont lieu dans d'autres
jours, désignent ou des douleurs, ou la lon-
gueur de la maladie, ou des rechutes.

λζ'. Οἱ ψυχροὶ ἰδρωῖτες, ζῶν μὲν ἐξ αὐτῆς πυρετῇ γινόμενοι, θάνατον ζῶν πρηύτερον δὲ, μῆκος νῆσθ' σημαίνουσι.

37. Sudores frigidi, (*α* cum acutâ quidem febre evenientes, mortem; cum mitiore verò, morbi longitudinem significant.

37. Les sueurs froides qui paroissent dans une fièvre aiguë, présagent la mort; avec une fièvre moins violente, elles indiquent la longueur de la maladie.

λη'. Καὶ ὅαυ ἐνι τῷ σώματι ἰδρῶς, ἐνταῦθα φράζει τὴν νῆσον.

38. Et quâ corporis parte inest sudor, (*α* ibi morbum esse indicat.

38. L'endroit du corps où paroît la sueur, dénote le siège de la maladie.

λθ'. Καὶ ὅαυ ἐνι τῷ σώματι θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἐνταῦθα ἡ νῆσος.

39. Et quâ corporis parte (*α* inest calor, aut frigus, ibi morbus est.

39. Dans une partie du corps où il y a tantôt du froid, tantôt de la chaleur, là est la maladie.

μ'. Καὶ ὅκκ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ ἢν τὸ σῶμα καταψύχεται, ἢ αὖθις θερμαίνεται, ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου γίγνεται· μῆκος καὶ ἄλλα σημαίνει.

40. Et ubi in toto corpore mutationes, et si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, (α aut color alius ex alio fiat, morbi longitudinem significat.

40. Les changemens dans tout le corps, ou les alternatives de froid et de chaud, ou le passage rapide d'une couleur à l'autre, désignent la longueur de la maladie.

μα'. Ἰδρῶς πολλὸς ἐξ ὕπνου ἄνευ φανερῆς αἰτίας γινόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ χρέεται. ἢν δὲ τροφήν μὴ λαμβάνοντ τῆτο γίγνεται, σημαίνει ὅτι κενώσιος δέεται.

41. (1 Sudor multus à somno, citra causam manifestam factus, corpus uberiore alimento uti significat. (2 Si verò cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.

41. Une sueur abondante, qui survient durant

le sommeil, sans cause manifeste, indique que le corps fait usage de trop de nourriture : mais dans celui qui ne prend pas d'alimens, elle marque le besoin des déplétions.

μβ'. Ἰδρὼς πολὺς, ψυχρὸς ἢ θερμὸς, αἰεὶ ρέων, ὁ μὲν ψυχρὸς μείζω, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσω νόσον σημαίνει.

42. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus verò minorem morbum significat.

42. Une sueur abondante, froide ou chaude, continuelle, désigne : celle qui est froide, une maladie plus grave ; celle qui est chaude, une maladie moins dangereuse.

μγ'. Οἱ πυριτοὶ, ὅσοι μὴ διαλείποντες διὰ τρίτης ἰσχυρότεροι γίνονται, μᾶλλον ἐπικίνδυνοι ὅτῳ δὲ ἂν τρίτῳ διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

43. Febres (α quæcunque non intermittentes tertiâ die vehementiores fiunt, magis periculosæ : quocunque autem modo intermittant, (β quòd sine periculo sint significat.

43. Les fièvres continues qui prennent de nouvelles forces le troisième jour, sont beaucoup plus graves ; mais de quelque manière qu'elles deviennent intermittentes, c'est un signe qu'elles ne sont point dangereuses.

μδ'. Οκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τστέοισι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐγίνονται.

44. Quibus febres longæ (α, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.

44. Lorsque les fièvres sont longues, on doit s'attendre à des abcès ou à des douleurs dans les articulations.

μέ. Οκόσοισι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίνονται, ἔτσι σιτίοισιν πλείοσι χρέονται.

45. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

45. Ceux auxquels il vient à la suite d'une longue fièvre, des douleurs ou des tumeurs aux articulations, prennent trop d'alimens.

μς'. Ηῦν βίγος ἐπιπύπλη πυρετῶ μὴ εἰσλείποντι, ἤδη ἀσθενεῖ ἰόντι, θανάσιμον.

46. Si rigor incidat febri non intermittenti, (a debili jam existente *αγρο*, lethale.

46. Le rigor qui survient dans la fièvre continue, le malade étant déjà très-affoibli, est un signe funeste.

μζ'. Αἱ ἀποχρεΐμψιες αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι μὴ διαλείπουσιν αἱ πελιδναί, καὶ αἱματώδεις, καὶ δυσώδεις, καὶ χολώδεις, πᾶσαι κακαί. ἀποχωρῆσαι δὲ καλῶς, ἀγαθαί. κατὰ τὰς διαχωρήσιας, καὶ κατὰ τὰ ἔργα. ἢν δὲ μὴ τι τῶν συμφερόντων ἐκκρίνηται διὰ τῶν τόπων τέτων, κακόν.

47. Excreationes in febribus non intermittentibus lividæ, (1 et cruentæ, et graveolentes, et biliosæ, omnes malæ sunt. At prole secedentes, bonæ. (2 Et eadem ratio est quod ad alvi egestionem, et quod ad urinas. (3 Si verò nihil ex conducentibus excernatur per hæc loca, malum.

47. Les crachats livides, sanguinolens, fétides, bilieux, sont tous mauvais dans les fièvres continues; mais si on les rend facilement

ils sont bons : il en est de même des urines et des déjections ; si au contraire il ne se fait par ces excretions , aucune évacuation utile , elles sont mauvaises.

μη'. Εἰν τοῖσι μὴ διαλείπεσι πυρετοῖσιν, ἢ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὰ δὲ ἔνδον καίηται, καὶ δίψην ἔχῃ, θανάσιμον.

48. In non intermittentibus febribus, (i si externa quidem frigida sint, (a interna verò urantur, et sitim habeant, lethale.

48. Lorsque dans les fièvres continues, les parties extérieures *du corps* sont froides, tandis que les intérieures sont brûlantes, et que *le malade* éprouve une grande soif, il est affecté mortellement.

μθ'. Εἰν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖλος, ἢ ὄφρυς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ρίς διασφαθῇ, ἢν μὴ βλέπη, ἢν μὴ ἀκχῇ, ἢδη ἀσθενέος ἔοντος τοῦ σώματος, ὃ, τι ἀντητέων γένηται, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

49. In febre non intermittente, (a si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si

non audiat, corpore jam debili existente, quicquid horum fiat, in propinquo mors est.

49. Dans une fièvre continue, si les lèvres, ou le sourcil, ou l'œil, ou le nez, sont dans une distorsion convulsive, et si le corps déjà très-affoibli, a perdu la faculté de voir et d'entendre; quelque soit l'un de ces symptômes, la mort n'est pas éloignée.

ν'. Ὅκῃ ἂν ἐν πυρετῇ μὴ διαλείποντι δύσπνοια γένηται, καὶ παραφροσύνη, θανάτιμον.

50. Ubi in febre non intermittente (α difficultas spirandi et delirium fit, lethale.

50. Lorsque dans une fièvre continue, la dyspnée se déclare et que le délire survient, c'est un signe mortel.

να'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποσήματα, μὴ λυόμενα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσεις, μῆκος νόσος σημαίνει.

51. In febribus abscessus, (α qui non solvuntur ad primas judicationes, morbi longitudinem significant.

51. Dans les fièvres, les dépôts qui n'aboutissent point à la première crise, présagent la longueur de la maladie.

ιβ'. Οκόσοι ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἢ ἐν τῇσιν ἀλλήσιν ἀρρώσίσῃσι, κατὰ προαίρεσιν διακρίνουν, ἔδῃν ἄτοπον. ὁκόσοι δὲ μὴ κατὰ προαίρεσιν, ἄτοπώτερον.

52. Quicunque in febris, aut in cæteris infirmitatibus, ex proposito (i. e. ob causam) lacrymantur (α, nihil inconueniens : (1 qui verò non ex proposito, magis inconueniens.

52. Dans les fièvres ou autres maladies, si l'on répand des larmes volontairement, ce *signe* n'est pas contraire; mais si les larmes coulent sans motif, le danger est d'autant plus grand.

ιγ'. Οκόσοισι δὲ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι πυρετοῖσι περίγλισχρα γίνεται, ἰσχυρότεροι γίνονται οἱ πυρετοί.

53. Quibus in febre ad dentes viscosa (α circumnascuntur, his febres fiunt vehementiores.

53. Dans les fièvres, lorsqu'il s'amasse des

matières visqueuses autour des dents, la maladie devient plus violente.

νδ'. Οἱ κρίσουσιν ἐπὶ πολὺ βῆχες ξηραί, βραχέα ἐρεθίζεσθαι, ἐν πυρετοῖσι καυσώδεσιν, ἃ πάντι τοι διψώδεις εἰσίν.

54. Quibus diu tussēs siccae (α, paulum irritantes, in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt.

54. Ceux qui depuis long-temps sont sujets à de petites toux sèches et fréquentes, ne sont pas très-altérés, dans la fièvre ardente.

νέ. Οἱ ἐπὶ βρῦσι πυρετοὶ, πάντες κακοὶ, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

55. In bubonibus febres, omnes malæ, præter (α ephemeræ.

55. Toutes les fièvres qui surviennent aux bubons sont mauvaises, excepté l'éphémère.

νε'. Πυρέσσοντι ἰδρᾶς ἐπιγενόμενος, μὴ ἐκλείποντος τῆ πυρετοῦ, κακόν. μακύνει γὰρ ἢ νῆστος, καὶ ὑγρασίην πλείω σημαίνει.

56. (1 Febricitanti sudor superviens, febre (α non remittente, malum.

Prolongatur enim morbus, (2 et copiosiore humiditatem indicat.

56. Lorsque la sueur survient à un fébricitant sans faire cesser la fièvre, c'est un mauvais signe; car, ou la maladie se prolonge, ou cela marque un surcroît d'humidité.

νζ'. Ὑπὸ σπασμῶ, ἢ τετάνῳ ἐνοχλημένῳ, πυρετὸς ἐπιγενόμενος, λύει τὸ νόσημα.

57. A convulsione, aut tetano (ad tento, febris superveniens, solvit morbum.

57. Si la fièvre survient dans les convulsions ou dans le tétanos, elle dissipe la maladie.

νη'. Ὑπὸ καύσας ἐχομένῳ, ἐπιγενομένη ρίγος, λύσις (γίνεται).

58. A febre ardente detento, (a rigore superveniente, solutio (fit).

58. Le rigor qui survient dans la fièvre ardente, en opère la solution.

νθ'. Τριταῖος ἀκριβοῦς κρίνεται ἐν ἐπὶ ἀπερίοδοις τὸ μακρότατον.

59. (1 Tertianæ exquisita in septem ad summum circuitibus judicatur.

59. La fièvre tierce exquise ou *légitime*, est jugée en sept accès au plus.

ξ'. Οκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὰ ὄτα καφωθῇ, αἷμα ἐκ ῥινῶν ρυέν, ἢ κοιλίη ἐκταραχθεῖσα, λύει τὸ νόσημα.

60. (1 Quibus in febre aures obscuruerint, (α his sanguis è naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit.

60. Dans les fièvres, si l'on vient à être attaqué de la dureté de l'ouïe, le flux de ventre ou l'hémorrhagie du nez dissipe la surdité.

ξά. Πυρέσσοντι, ἢν μὴ ἐν περισσῇσιν ἡμέρησιν ἀφῇ ὁ πυρετός, ὑποτροπιάζειν εἴωθεν.

61. Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet.

61. Si la fièvre cesse dans un jour impair ou non critique, elle revient ordinairement.

ξβ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἵκτεροι ἐπιγιγνόνται πρὸ τῶν ἐπὶ τὰς ἡμερῶν, κακόν.

ἢν ξυνοδόσιες μὴ ὑγρῶν κατὰ τὴν κοιλίην γίνονται.

62. Quibus in febre morbus regius (α supervenit ante septimum diem, malum est. (Nisi confluxus humorum per alvum fiant.)

62. L'ictère qui survient dans la fièvre avant le septième jour, est mauvais, s'il ne s'accompagne d'abondantes évacuations du ventre.

ξγ'. Ο'κόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' ἡμέρην ρίγεια γίνεται, καθ' ἡμέρην οἱ πυρετοὶ λύονται.

63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

63. Dans les fièvres, lorsque le rigor se renouvelle chaque jour, il y a apyrexie chaque jour.

ξδ'. Ο'κόσοιπιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τῇ ἐξόσμῃ, ἢ τῇ ἐννάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἵκτεροι ἐπιγίνονται, ἀγαθόν. ἢν μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκληρὸν ἢ ἢν δὲ μὴ, ἐκ ἀγαθόν.

64. Quibus in febre septimâ , aut nonâ , (α aut undecimâ , aut quartâ decimâ morbus regius supervenit , bonum est : (1 nisi dextrum hypochondrium durum sit ; alioqui , non bonum.

64. Lorsque l'ictère survient dans la fièvre le neuvième , le onzième ou le quatorzième jour , c'est un bon signe , à moins que l'hypocondre droit ne soit dur ; car alors c'est un mauvais signe.

ξέ'. Εἰν τοῖσι πυρετοῖσι περὶ τὴν κοιλίην καῦμα ἰσχυρόν , καὶ καρδιαγμός , κακόν.

65. In febribus circa ventrem æstus vehemens , et oris ventriculi dolor , malum.

65. L'excessive ardeur du ventre , et les pincemens au cardia , sont de mauvais augure dans les fièvres.

ξς'. Εἰν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξέσιν , οἱ σπασμοὶ , καὶ οἱ περὶ τὰ σπλάγχνα πόνοι ἰσχυροὶ , κακόν.

66. In febribus acutis (1 (α convulsiones , et circa viscera dolores vehementes , malum.

66. Lorsque dans les fièvres aiguës, on a des convulsions, ou qu'on éprouve de fortes douleurs autour des viscères, c'est un mauvais signe.

ξξ'. Εὐ τοῖσι πυρετοῖσιν οἱ ἐκ τῶν ὕπνων φόβοι, ἢ σπασμοὶ, κακόν.

67. In febris, ex somnis (α pavoribus, aut convulsiones, malum.

67. Dans les fièvres, les terreurs ou les convulsions durant le sommeil, sont de mauvais augure.

ξη'. Εὐ τοῖσι πυρετοῖσι τὸ πνεῦμα προσκόπτον, κακόν· σπασμὸν γὰρ σημαίνει.

68. In febris spiritus offendens, malum : (α convulsionem enim significat.

68. Dans les fièvres, la respiration entrecoupée est un très-mauvais signe, car elle indique un état convulsif.

ξδ'. Οὐκότοισιν ἔρα παχέα, θρομβώδεια, ὀλίγα, ἐκ ἀπυρέτοισι, πλῆθος ἐπελθὼν ἐκ τυχέων λεπτόν, ὠφελεῖ. μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα ἔρχεται, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ διὰ ταχέων, ὑπόστασιν ἴσχει.

69. Quibus urinæ crassæ, grumosæ, paucæ, non sine febre, copia ex his succedens tenuis, juvat. Tales autem *his* maximè prodeunt, quibus ab initio *morbi*, aut brevi post, subsidentiam continent.

69. Dans les fièvres, des urines épaisses, grumeuses et en petite quantité, soulagent lorsqu'il leur succède une abondante évacuation d'urine tenue; en effet, cette dernière suit surtout celle qui dès le commencement, ou bientôt après, donne de l'hypostase.

δ. Οὐόσοισι δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ ἔργα ἀναταραγμένα, ὅον ὑποζυγίων, τέττοισι κεφαλαλγίαι ἢ πᾶρειςιν, ἢ παρέσσονται.

70. Quibus autem in febre urinæ conturbatæ, qualis jumentorum, his capitatis dolores, aut adsuat, aut aderunt.

70. Dans les fièvres, des urines troubles, pareilles à celles des bêtes de somme, dénotent que la tête est affectée par la douleur ou qu'elle le sera.

οά. Οὐόσοισι τῇ ἐδῶματῃ κρίνεται, τέττοι-

τιν ἐπινέφειλον ἴσχει τὸ ἔρον τῇ τετάρτῃ ἐρυθρόν, καὶ ἢ ἄλλα κατὰ λόγον.

71. Quibus morbi septimâ die judicantur, iis nubeculam rubram urina die quartâ continet, (1 et cætera secundum rationem.

71. Si la maladie doit être jugée, se terminer le septième jour, l'urine contient au quatrième un nuage rouge, et les autres signes concourent à proportion.

οβ'. Οὕοοισιν ἔρα διαφανέα, λευκά, ποιηρά. μάλισα δὲ ἐν τοῖσιν φρενιτικοῖσιν ἐπιφαίνεται.

72. Quibus urinæ pellucidæ, (α albæ, malæ. Maximè autem in phreniticis observantur.

72. Des urines claires ou blanches sont mauvaises; on les remarque particulièrement dans les phrénétiques.

ογ'. Οὕοοισιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορδορίζοντα, ὀσφύος ἀλγῆματος ἐπιγενομένη, αἱ κοιλίαι τρετέοισι καὶ συγγραίνονται.

ἢν μὴ φύσαι καταρράγέωπιν, ἢ ἔρξ πλῆθος
ἐπέλθῃ, ἐν πυρετοῖσι δὲ ταῦτα.

73. (1 Quibus hypochondria elevata
(a sunt murmurantia, dolore lumbo-
rum superveniente, his alvi humectan-
tur: nisi flatus eruperint, aut urinæ co-
pia prodierit. In febribus autem hæc.

73. Lorsque les hypocondres sont élevés avec
borborygmes, et s'il se manifeste de la douleur
dans les lombes, il survient un flux de ventre,
ou la sortie des vents, ou un flux copieux d'u-
rine; ceci a lieu dans les fièvres.

οδ'. Οὐότοισιν ἐλπίς ἐς ἄρθρα ἀφίτα-
θαι, ῥύεται τῆς ἀποσάτιος ἔρξον πολὺ,
καὶ παχὺ, καὶ λευκὸν γιγνόμενον, οἷον ἐν τοῖσι
κοπῶδεσι πυρετοῖσι τετραγταίοισιν ἀρχεται
ἐνίοισι γίγνεσθαι. ἢν δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν
αἰμορροαγήσῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύεται.

74. (1 Quibus spes est abscessum fore
ad articulos, eos abscessu liberat urina
multa, et crassa, et (a alla redōita,
quæ in febribus cum lassitudine quartâ
die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam

ex

ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvit.

74. Ceux qui ont à craindre des dépôts aux articulations, en sont garantis par des urines abondantes, épaisses et blanches, telles qu'on commence à en rendre quelquefois, au quatrième jour des fièvres accompagnées de lassitudes pénibles. Si l'hémorrhagie nasale survient en même temps, elle les en délivre promptement.

οέ. Ἡ ὑαίμα, ἢ πῦρι ἔρειν, τῶν νεφρῶν, ἢ τῆς κύστιος ἕλκωσιν σημαίνει.

75. Si (a quis sanguinem, (i aut (b pus mingat, renum, aut vesicæ exulcerationem significat.

75. Le pissement de sang ou de pus, indique l'ulcération des reins ou de la vessie.

οσ'. Οκόσοισιν ἐν τῇ ὕρῃ παχεῖ ἔόντι, σαρκία μικρὰ ἢ ἄτρωε τοίχες ξυνεξέρχονται, κατέρισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρίνεται.

76. Quibus in urinâ crassâ existente (i carunculæ (a parvæ, aut veluti pili unâ exennt, his de renibus excernuntur.

76. Lorsque des urines épaisses entraînent avec elles de petites caroncules ou comme des filamens , *ces matières* sont excrétées des reins.

οζ'. Ο κόσοισιν ἐν τῷ ὕρῳ παχέϊ ἰόντι, πιτυρώδεα ξυνεξερέεται, τστέοισιν ἢ κύσις ψωριᾶ.

77. Quibus in urinâ crassâ existente furfuracea simul minguntur, iis vesica scabie laborat.

77. Si l'on rend avec une urine épaisse des matières furfuracées, il y a affection psorique de la vessie.

οη'. Ο κόσοι ἀπὸ ταυτομάτης αἵμα ἔρυσσι, τστέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίᾳ ῥήξιν σημαίνει.

78. (1 Qui spontè sanguinem mingunt, (α his à renibus venæ ruptionem significat.

78. L'hématurie spontanée, indique la rupture de l'un des vaisseaux des reins.

οθ'. Ο κόσοισιν ἐν τῷ ὕρῳ ψαμμάδεα ἰφίσκται, τστέοισιν ἢ κύσις λιθιᾶ.

79. (1 Quibus in urinâ arenosa (α sub-
sident, illis vesica calculo laborat.

79. Si l'urine dépose une matière sablon-
neuse, on est attaqué de pierre dans la vessie.

π'. Η'ν αἷμα ἔρῃ, καὶ θρόμβος, καὶ
τραυχερίην ἔχῃ, καὶ ὁδύνη ἐμπίπῃ εἰς τὸ
ὑπογάστριον, καὶ εἰς τὸ περίναιον, τὰ περὶ
τὴν κύστιν πονέει.

80. Si quis sanguinem mingat, et
grumos, et (α urinæ stillicidium habeat,
et dolor incidat ad inum ventrem, et
perinæum, partes circa vesicam labo-
rant.

80. Si l'on rend par l'urèthre du sang pur
et des grumeaux, avec strangurie; douleur à
l'hypogastre et au périnée, il y a maladie à la
vessie.

πα'. Η'ν αἷμα, καὶ πῦον ἔρῃ, καὶ λεπί-
δας, καὶ ὁσμὴ βαρεὴ ἢ, τῆς κύστιος ἔλκα-
σιν, σημαίνει.

81. Si quis sanguinem et pus mingat,
et squamas, et odor gravis sit, (α ve-
sicæ exulcerationem significat.

81. Le pissement de sang ou de pus, et la présence de matières squammeuses dans l'urine d'une mauvaise odeur, dénotent l'ulcère de la vessie.

πβ'. Ο'κόσοισιν ἐν τῇ ὀρήθρῃ φῖμα φύεται, τστέοιτι, διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος, λύσις.

82. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum (α nascitur, his, suppurato eo et perrupto, solutio, *sit*.

82. Lorsqu'un tubercule prend naissance dans l'urèthre, on guérit, si la tumeur vient à s'ouvrir et à suppurer.

πγ'. Ο'ύρησις νύκτωρ πολλὴ γιγνομένη, σμικρὴν τὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.

83. Mictio noctu multa contingens, parvam αλοιῇ dejectionem significat.

83. L'excrétion copieuse de l'urine pendant la nuit, annonce une déjection peu abondante par les selles.

NOTÆ

I N

SECTIONEM QUARTAM.

APHOR. I. **A**PH. v, 29. = (1 I, 22. = (2 I. Morb. Mul. xlij, 8. = (a Cels. ij, c. 1, p. 95, l. 8. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 411.

Intelligenda est Hippocratis sententia de validioribus purgantibus, quæ sola ab antiquioribus in usum vocabantur. Mannam, Cassiam, Tamarindos, Sennam, quocumque graviditatis tempore, cum fructu recentiores exhibent, servatâ tamen artis methodo.

APHOR. II. (1 Aph. j, 2. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 495; t. iij, p. 486.

APHOR. III. Aph. j, 25.

APHOR. IV. (1 V. Epid. xxv, 16, 17. = (2 Salub. Diæt. v, 10. = (a Cels. j, c. 1, s. 11, p. 35, l. 19.

Notum est minus humoris utilis per vomitum excludi, quàm per catharsim. Porro æstate deest humor, hyeme redundat. Hinc intelligitur cur sub cane aridis solidis, exustis humoribus, difficilior catharsis, cur et gracilibus minùs felix.

APHOR. V. Aër. Aq. Loc. xxx. 2, 5, 8. — Purgant. 5, 8. = (1 Aph. ij, 37.

APHOR. VI. II. Morb. xij, 9. = (a Cels. j, c. 1, s. 11, p. 35, l. 21.

Cur cavendus hyems? Quia vasa magis compacta magis resistunt; frigus enim quodam crethismo agit.

APHOR. VII. II. Morb. xij, 35.

Cur cavenda æstas, in mediocriter carnosis? Quòd catharsis exolvat corpora, quæ jam eneruat tempestatis ariditas.

APHOR. VIII. Loc. in Hom. xxxv, 4. — Int. Affect. iv, 26; xij, 36.

APHOR. IX. Aër. Aq. Loc. xj, 2. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 486.

Consilium de Melancholicis intelligendum; qui turgente atrâ bile infestantur; non de iis quibus fibra sensilior sine ullâ fere materiâ la-

borat. Unde maximâ in hoc applicando Aphorismo utendum est prudentiâ.

APHOR. X. (1 Aph. j, 22, 24. = (2 V. Epid. xxv, 16, 17.

APHOR. XI. Coac. ij, 279. = (1 Coac. iij, 286. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 71, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 153.

Debilitatâ coctione, aër ex alimentis erumpit, et circum claustra intestinorum fremit: quæ si prædebilitata minùs resistant, dilatantur aëre agglomerato in tympanitidem. *Vide* Pneumato-Pathologiam, part. II.

APHOR. XII. In hienteriâ, ait Galenus, ventriculi partes passæ sunt; scatet aphthis ulceribus tractus intestinalis, quæ à vomitu levamen nullum, sed malam irritationem sibi comparare possunt. Fiunt autem præcipuè hyeme à repercussæ perspirationis impetu talia ulcuscula.

APHOR. XIII. Aph. j, 22; ij, 9; vij, 70. — II. Diæt. xxxvj, 18 ad 37. — Loc. in Hom. xl, 3. — Verat. Us. j, 1. — II. Morb. xij, 10 ad 13. — Int. Affect. xxij, 31; xxix, 41; xlvij, 34. — I. Morb. Mnl. xxv, 13, 14; xxxj, 9. — Superfæt. xx, 1. = (a Cels. ij, c. 2, s. 5, p. 104, l. 18; ij, c. 2, s. 5, p. 106, l. 7. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 486.

APHOR. XIV. Verat. Us. j, 2, 3. — VI. Epid. v, 45. = (1 Aph. ij, 51. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 486.

APHOR. XV. Verat. Us. j, 4. — Superflet. xv, 1. — VI. Epid. v, 45. = (1 Aph. v, 27. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 486.

Hinc antiquum est illud Sydenhami præceptum, quo, purgatione peractâ, narcoticum ad somnos excitandos adhibet. Cæterum vide in utrumque hunc Aphorismum notas doctissimi de Villebrune.

APHOR. XVI. Aph. ij, 36, 27. — Verat. Us. j, 5. = (1 Aph. v, 1. = (a Cels ij, c. 2, p. 106, l. 7. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 237; t. iij, p. 486.

APHOR. XVII. Verat. Us. j, 10. — Affection. xiv, 12. = (1 Il. Morb. Mul. xxiv, 2, 3. = (a Cels. j, c. 1, s. 11, p. 35, l. 30. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 202.

Verbum *καρδία* secundum Galeni interpretationem vertitur *cordis dolor*, seu *morsus cordis*, i. e. oris ventriculi, nam hoc quoque veteres *cor* appellabant: ille autem dolor in cavo ventriculi oritur à corrupto et vitioso humore quem *cacochyliam* vocant; qui ventriculum inordinate commovendo, per consuetum turbat visum, unde *tenebri-*

cosa vertigo. Inter præcipua autem non solum signa, sed etiam exhibentia naturam contentorum ventriculi, est *oris amaritudo.* *Rieger.* j. p. 521.

Qualis sit morbus vertigo, vidimus ad 3. *aph.* 17. Ubi (uti etiam *aphor.* 23 et 31) ἱλιγῖος vocatur, à verbo ἱλεῖν, *versare, circumagere*, quemadmodum vertigo latinis derivatur à *vertere*. In præsentè aphorismo *σκοτόδινος, tenebricosa vertigo*, compositum nomen est ex *σκοτός*, *caligo* sive *tenebræ*, et *δίνος* vel *δείνος*, quæ vox, teste *erotiano* in *expos. vocum Hippocratic.*, saltationis genus significat, in qua saltaturus uno tantum pede terræ insistens in gyrum se vertebat, qui lusus ab in exercitatio peractus efficiebat vertiginem. *Δείνος* vocatur etiam vas figulinum, quod tornando præparatur. Itaque, *σκοτόδινος* vocatur à veteribus vertigo cum tenebricosa caligine accedente: scilicet in majori hujus morbi gradu apparet duplex objectum, tunc varii videntur colores, et dein tenebræ. *Boerh.* p. 577. *Rieger.* j. p. 522.

APHOR. XVIII. Verat. Us. j, 10, 11.

APHOR. XIX. Verat. Us. j, 6.

Hæc propositio ad validiora tantum catharticos instrumenta pertinet quibus olim ute-

bantur antiquiores, non ad nostram alvi subductionem molliorem et facile mitigandam solorum diluentium usu.

APHOR. XX. Verat. Us. j, 11.

Hæc signa illicò purgandum non significant, sed non aliter morbum finire posse indicant.

APHOR. XXI. (1 Prænot. x, 6. — Coac. iij, 36; vj, 22 ad 26, 42. = (2 Aph. iv, 23. — Coac. iij, 1. = (3 Aph. j, 2. = (4 Coac. vj, 24. = (5 Aph. j, 2; ij, 14. = (a Cels. ij, c. 1, p. 93, l. 12.

Melancholicum vocabant Veteres, degenerem, quem ex obstructis intrâ intestinalem tractum vasis videbant, vel per os, vel per anum effundi sanguinem, pessimo omine. Minus tamen mali ostenditur, si vis medicamenti, non verò fatiscens natura id effecerit. Vigere adhuc diversorum humorum intra intestina secretionem, plurimum humorum testatur excretio, de quâ pluries cum laude locutus est Hippocrates locis citatis.

APHOR. XXII. Coac. j, 100. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 67, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iij, p. 496.

Præclusum omninò sanguini venoso aditum

per obstructos venæ portarum fines, hinc exundare sanguinem atrum in intestina repulsum, symptoma illud vulgò indicat; vel venenum intus enatum, à degeneri simul bile atque tabo- factis cæteris humoribus pendens, acre, erodens, acidumque, instar aquæ stygiæ; undè utroque in casu metuenda prognosis quæ in Aphorismo sequenti continetur; minus tamen in priori casu.

APHOR. XXIII. (1 Aph. iv, 21. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 67, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 496.

APHOR. XXIV. Coac. j, 100; iij, 292. — V. Epid. x, 2. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 90, l. 5. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 499.

APHOR. XXV. Aph. vij, 37. — Coac. ij, 254; vj, 14.

Scilicet summè distinguendus est sanguis niger ab atrâ bile, secundum Hippocratem et Galenum. Hæc enim à pristinâ qualitate degener veneni qualitatem adepta est. Lege hiæ observationes Cl. de Villebrune.

APHOR. XXVI. (1 Aph. iv, 76.

APHOR. XXVII. Coac. j, 227; iij, 53.

Quamlibet magnam sanguinis profusionem sequitur relaxatio ingens; hinc viscerum con-

coctioni servientium debilitas summa quæ,
vel diarrhœa, vel hydrope excipiatur. Iluc
refer Sanctorii aphoris. xiv, sect. iij.

APHOR. XXVIII. Aph. iv, 60. — Coac. ij,
66, 103; vj, 77. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85,
l. 25. — *Vide* Epidemicas Hippocratis histo-
rias. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 358, 554.

APHOR. XXIX. Coac. j, 23. — VII. Epid.
xl, 20. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 9. —
Vide van-Swieten, t. ij, p. 443.

APHOR. XXX. Humor. iij, 91. — *Vide* van-
Swieten, t. ij, p. 522.

APHOR. XXXI. (i Humor. iij, 98. — IV.
Epid. xvij, 16, 17. — Aph. ij, 5; iv, 74. =
(a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 79, l. 4. — *Vide* van-
Swieten, t. ij, p. 409.

APHOR. XXXII. Humor. iij, 100. — *Vide*
van-Swieten, t. ij, p. 53, 690, 723.

APHOR. XXXIII. Loc. in Hom. xxvj, 6. —
Humor. iij, 101. — IV. Epid. xxvij, 1, 2, 3.
— VI. Epid. vij, 15 ad 19. — Viet. Acut. xlv,
2, 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 723.

APHOR. XXXIV. Aph. iv, 35. — Prænot.
xxij, 3, 4. — Coac. j, 90; ij, iij, 201, 202,
221; 96. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 646.

APHOR. XXXV. Aph. iv, 34; vij, 58. — Coac. ij, 221 ad 223. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, pag. 67, l. 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 646.

APHOR. XXXVI. Aph. ij, 24. — Judicat. j, 2; iv, 13. — Prænot. v, 1, 2, 3. — Coac. iv, 36. I. Epid. iij, 38. — Ægin. xiv, 7. = (1 Prænot. xxiv, 8. — Coac. j, 115. = (2 Aph. ij, 12; iv, 61. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 80, 330, 426.

APHOR. XXXVII. Judicat. vj, 9, 10; viij, 12, 8. — Prænot. v, 4, 5. — Coac. iv, 40. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 30; p. 64, l. 25; p. 68, l. 4. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 80.

APHOR. XXXVIII. Aph. ij, 5. = (a Cels. ij, c. 1, s. 1, p. 59, l. 7.

APHOR. XXXIX. Judicat. viij, 3. = (a Cels. ij, c. 1, s. 1, p. 59, l. 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 288.

APHOR. XL. Aph. vij, 60. — Humor. iij, 22, 53. — Judication. viij, 4. — I. Prædic. vj, 4. — Coac. j, 77, 177. = (a Cels. ij, c. 1, s. 4, p. 64, l. 29.

Inconstantia symptomatum naturæ deesse firmum robur, quo ad legitimam coctionem crisisque tendat, signum est. *Vide* Sancto-rium, sect. j, aph. 121.

APHOR. XLI. Aph. vij, 61. — (1 Coac. iv, 36. = (2 Aph. ij, 8. — *Vide* Sanctorium, sect. iv, aph. 3.

APHOR. XLII. Aph. vij, 61. — Judicat. viij, 9. — Coac. j, 21. — I. Morb. xxij, 26 ad xxij. — *Vide* Sanctorium, sect. iv, aph. 59.

APHOR. XLIII. Aph. vij, 62. — Coac. j, 166. — I. Epid. iij, 16. — VII. Epid. xl, 19. — Vict. Acut. iij, 3. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 63, l. 33. = (b Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 60, l. 25; iij, c. 2, s. 6, p. 166, l. 19. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 402.

Hippocrates, lib. 3 Epid., sect. 1, Ægr. 2, usus est voce *διὰλειψις*, quæ propriè prædictam intermissionem significat, ad differentiam vocis *ἀνύπνεος*, quæ simpliciter febris carentiam denotat. Quare sensus est, febres continuas tertio quoque die ingravescentes periculosas esse, quæ quidem, quoquo modo intermiserint, hoc est, quocunque typo, sive quotidiano, sive tertiano, aut quartano, sive etiam erratico ad eam intermissionem devenierint, qua febres periodicæ intermittentes fiunt, periculum abesse significatur, et ratio est, quia hujusmodi transmutatio indicat mineram febris translatam esse à venis, ad extra venas, quare si natura talem motum potuit

perficere, dum à febre continua affligebatur, multo facilius prohibere poterit, ne rursus intra venas firmetur, et periculosum morbum denuo constituat, dum in febris intervallo recreari potest. *Martian*, p. 448.

Febres ex genere continuarum remittentium ad tertianarum naturam accedentes, de quibus in præsentè Aphorismo sermo est, *τριταιοφύεες* ab Hippocrate nominatæ sunt (*ατριταίος triduanus* et *φύω cresco*): de quarum naturæ hæc ab ipso prodita sunt: continuæ (*ξυνεχέες*) omnino febres erant, nihilque intermittentes, exacerbescentes autem omnibus ad naturæ tertianæ modum (*τριταιοφύεα τρόπον*), uno quidem die leviores, altero vero vehementiores, omnium quæ tunc contingerent violentissimæ, longissimæ et laboriosissimæ, per initia leves et in totum perpetuo incrementum, diebus judicatoriis insultus habebant et in deterius procedebant. Quæ etiam cum parum allevassent, celeriter rursus ex intermissione vehementius invadebant, et diebus judicatoriis magna ex parte deterius affligebant. In his omnibus rigores incomposite et errabunde contingebant, paucissimi et minimi, l. j Epid., sect. 2, n°. 40, seq. Quæcunque tertianæ naturam habent (*τριταιοφύεες*), his nox accessionem præcedens molesta, quæ

vero subsequitur plerumque levis existit ,
l. vj Epid., sect. 2, n. 42. *Lieger.* j, p. 580.

Contraria de febribus intermittentibus docent Forestus, Morton, Torti.

APHOR. XLIV. Aph. vij, 63. — Humor. iij, 98. — Prænot. xxiv, 9, 10, 11. — H. Prædict. x, 7. — Coac. j, 168, 169. — *Ida Cels.* ij, c. 1, s. 6, l. 19. — *Vide* van-Swieten. t. j, p. 671; t. ij, p. 67.

Febres idèò longæ sunt, quòd victrix natura uno ictu hostilem materiam proterere non possit. Hinc abcessus frequentius apud veteres emicabant. quod mitiorum alvi lavantium usum nescirent.

APHOR. XLV. Aph. vij, 64. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 671.

APHOR. XLVI. Coac. j, 15. = *Ida Cels.* ij, c. 1, s. 5, p. 67, l. 8. — *Vide* Sancterium, sect. j, aph. 121.

APHOR. XLVII. Aph. vij, 69. — Coac. ij, 161. = (1 Coac. iij, 148. — (2 Prænot. xv, 10. — (3 Aph. j, 25. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 703; t. ij, p. 725.

APHOR. XLVIII. Aph. vij, 72. — Prænot. viij, 11; xiv, 12, 13; xv, 6 ad 10. — Coac. j, 165; iij, 345. — L. Morb. xxvj, 15. — Affec-
tion

tion. xj, 5. = (I Aph. vij, 1, 26. — II. Morb. xvj, 2; xxxvij, 1 ad 5. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, liv. 24: ij, c. 1, s. 5, p. 67, l. 8; ij, c. 2, s. 7, p. 109, l. 21.

APHOR. XLIX. Aph. vii, 73. — Prænot. iij, 3. — Coac. j, 104. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 66, l. 5. — *Kide* van-Swieten, t. ij, p. 396.

APHOR. L. Judication. viii, 17. — Pranot. iv, 20; xiv, 9; xv, 3. — *Ide* van-Swieten, t. ij, p. 69, 390, 442.

APHOR. LI. (a Cels. ij, c. i, s. 4, p. 64, l. 30. — Vide hæc notas Cl. de Villebrune huic intelligendæ propositioni necessarias: ubi $\mu\omega\lambda\lambda\omicron\gamma\mu\alpha$ recedentia, sufficitur in locum $\mu\eta\lambda\upsilon\gamma\mu\alpha$, qui non soleuntur.

APHOR. I. II. Aph. viij, 2. — Prænot. ij, 18
ad 21. — IV. Epid. xxvij, 12. — VI. Epid. j,
42. = (I I. Epid. ij, 176. — VI. Epid. viij,
34. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 13. —
Vide van-Swieten, t. ij, p. 397.

ALBOR. LIII. Coac. ij, 153. — IV. Epid.
XXVII, 13. — (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 13.
— *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 140.

APHOR. LIV. VI. Epid. ij, 43. = (a Cels. ij, c. 2, s. 5. p. 161, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 407.

APHOR. LV. II. Epid. iij, 60. = (a Cels. ij, c. 1, s. 2, p. 60, l. 25. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 669.

Lege hic observationes D. de Villebrune, et Riegerum in hunc Aphorismum.

APHOR. LVI. Judication. viij, 6. — Coac. iv, 36. — II. Morb. xxxj, 12. = (1 I. Prædict. vij, 8. = (2 Aph. vij, 61. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 64, l. 27.

APHOR. LVII. Aph. ij, 26; v, 70. — Loc. in Hom. xlvij, 6. — Judication. xij, 10. — Coac. j, 251; iij, 80 ad 84. — San. Tuend. ad Dem. 10. — I. Morb. vj, 13, 14. = (a Cels. ij, præf. p. 55, l. 11 et 13; ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 8. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 328.

APHOR. LVIII. Judication. xj, 9, 16. — Coac. j, 188. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, pag. 85, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 442.

APHOR. LIX. Judication. iv, 10. — Coac. j, 212. — I. Epid. iij, 26. — I. Epid. iij, 82. = (1 Prænot. xxv, II.

Propositio de vernalibus solis intelligenda, non de iis quæ autumnino erumpunt et rarò admodum simplices sunt.

APHOR. LX. Aph. iv, 28. — Judicat. xj, 11, 12, 13. — Coac. ij, 66, 99, 100, 103; vj, 77,

78. = (1 Coac. ij, 72. — (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 22.

APHOR. LXI. Humor. iij, 91. — Judicat. ix, 11. — Prænot. xxiv, 8. — Coac. j, 115, 210. — I. Epid. iij, 40. — II. Epid. v, 30; vj, 18. — IV. Morb. xix, 10, 11; xx, 8, 12, 15. = (a Cels. iij, c. 2, s. 2, p. 144, l. 14. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 427.

Doctè herclè et criticè de hoc Aphorismo Cl. de Villebrune, qui hic exscribendus foret.

APHOR. LXII. Judicat. iij, 5, 18, 20. — Coac. j, 172. — III. Epid. j, Egrot. ij, 13, 16. I. Morb. vj, 2. — Viet. Acut. l. 3, 4. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 63, l. 12; iij, c. 2, s. 13, p. 205, l. 23. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 138.

APHOR. LXIII. Judicat. xj, 16.

Paroxysmi solvuntur in febre, etiam non intermittente. Nam rigor jam retusam prius supponit febris violentam vim.

APHOR. LXIV. Judicat. iij, 5, 18, 20; iv, 11. — Coac. j, 173. — I. Epid. ij, 120. — I. Morb. vj, 2. = (1 Aph. vj, 42. — (a Cels. iij, c. 2, s. 13, p. 205, l. 23. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 139.

APHOR. LXV. *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 289.

APHOR. LXVI. Coac. ii, 207. = (1 Vid. Aph. ij, 26. — (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 63, l. 16. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 442.

APHOR. LXVII. Aph. ij, 1. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 63, l. 18. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 398.

APHOR. LXVIII. Vict. Acut. xvj, 21. — I. Morb. Mul. v, 7. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 77, l. 22.

Offendens dicitur spiritus, in quo inspiratio quasi intercepta pluribus redintegratur vicibus. Res, vel à debilitate organorum per morbum acquisitâ, vel à natis intra vasa pulmonalia repagulis, vel à nervorum convulsione pendet. *Vide* Galenum de differentiis respirationis, cap. VIII. Prosp. Alpinum, de presagiendâ vitâ et morte, lib. IV.

APHOR. LXIX. Coac. v, 80, 81.

APHOR. LXX. Coac. v, 46. — VII. Epid. liv. 5, 6, 10, 11. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 394.

APHOR. LXXI. Judicat. vj, 2; ix, 8. — Coac. j, 213; v, 5, 80. = (1 Aph. j, 12. — *Vide* Solano, part. 1, sect. 2, cap. 3, observ. 3. Van-Swieten, t. ij, p. 431.

APHOR. LXXII. I. Prædic. xx, 5; j, 6. = (a

Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 64, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 324.

APHOR. LXXIII. Coac. ij, 240, 241, 257. — Prænot. x, 14. = (1 Aphor. v, 64. — Sal. Diat. v, 10. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 61, l. 17. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 495.

APHOR. LXXIV. Humor. xj, 13 ad 16. — Judicat. x, 4 ad 7. — VI. Epid. iv, 3 ad 6. = (1 Prænot. xj, 17. — II. Prædic. x, 7. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 73, l. 12. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 53, 76, 83, 672.

APHOR. LXXV. Aph. iv, 78, 81. — Int. Affect. xvj, 4, 5. = (1 Nat. Human. xxvj, 4. — Prænot. xix, 11. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 73, l. 18. = (b Genit. ij, 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 238.

APHOR. LXXVI. Nat. Human. xxvj, 5. = (1 Aph. iv, 26. — Cap. Vuln. ij, 4. — (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 73, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 239.

APHOR. LXXVII. Nat. Human. xxvj, 6. = Prænot. xj, 8, 10.

Si suppurent renes, complicata per ureteres abripiuntur vascula; si vesica ulcere laboret, internæ membranæ folia dejiçiuntur. *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 239.

APHOR. LXXVIII. Aph. iv, 75. — Nat. Human. xxvj, 4. = (1 Int. Affect. xvj, 4. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 73, l. 18; p. 74, l. 2.

APHOR. LXXIX. IV. Morb. xvi, 13 ad 30. — Int. Affect. xv, 10, 11. = (1 Nat. Human. xxvj, 1. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 74, l. 12.

Id est calculus iis metuendus est; nam sæpè et arenæ sine calculo in vesicâ minguntur, et calculus in vesicâ perstat, sine ullâ arenarum emissionem.

APHOR. LXXX. Aph. vij, 39. — (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 74, l. 11 et seq.

APHOR. LXXXI. Aph. iv, 75. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 74, l. 25.

APHOR. LXXXII. Aph. vij, 57. — Coac. iij, 311, 312. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 27. — *Ide* van-Swieten, t. j, p. 771; t. v, p. 428.

APHOR. LXXXIII. II. Diæt. xl, 10 ad 17. — IV. Morb. vij, 4, etc. — *Ide* van-Swieten, t. ij, p. 33. — Vide et Sanctorium, sect. I. de Ponderatione, apud l. 89, 94, etc. V. Gorterum, de perspiratione, talia phænomena passim explanantem.

Τμήμα πέμπτον.

κ. Σπασμὸς ἐξ ἑλλεβορός, θανάσιμον.

1. Convulsio ab (α cilleboro, lethale.

1. La convulsion occasionnée par l'ellébore, est mortelle.

β. Ἐπὶ τραύματι σπασμὸς ἐπιγενόμενος, θανάσιμον.

2. Vulneri convulsio (α superveniens, lethale.

2. La convulsion qui survient dans une blessure, est mortelle.

γ. Αἵματος πολλῷ ρυέντος, σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγενόμενος, κακόν.

3. Sanguine multo effuso, (α convulsio, aut singultus superveniens, malum.

3. La convulsion ou le hoquet après une grande perte de sang, est de mauvais augure.

δ'. Ἐπὶ ὑπερκατάρσει σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγεγόμενος, κακόν.

4. Purgationi immodicæ (α convulsio, aut singultus superveniens, malum.

4. La convulsion ou le hoquet à la suite d'une purgation excessive, est un mauvais signe.

ε'. Ἡν μεθύων ἐξαίφνης ἄφρονός τις γένηται, παροδεῖς ἀποδινήσκει, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ἄρην ἔλθῃν, καθ' ἣν αἱ κραυπὲλαι λύονται, φθίγγεται.

5. (1 Si quis ebrius ex improvise mutus fiat, (α convulsus moritur, nisi febris corripuerit, aut uli ad horam, quâ crapulæ solvuntur, pervenit, locutus fuerit.

5. Si un homme attaqué d'ivresse, perd tout à coup l'usage de la parole, il meurt dans les convulsions, à moins que la fièvre ne le prenne, ou qu'étant parvenu au moment où l'ivresse doit cesser, il ne recouvre la parole.

ς'. Οἵοσσι ὑπὸ τεταίνῃ ἀλίσκονται, ἐν

τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται. ἢν δὲ ταύ-
τας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται.

6. Qui à tetano (α corripimur, in
quatuor diebus pereunt. Si verò hos ef-
fugerint, sani fiunt.

6. Si l'on est pris de tétanos, la mort a lieu
en quatre jours; si l'on passe ce terme, on
guérit.

ξ'. Τὰ ἐπιληπτικὰ ὁκότοισι πρὸ τῆς ἡβῆς
γιγνεται, μετὰ τασιν ἰσχει. ὁκότοισι δὲ πεντε-
τῇ εἰκοσιν ἐτέων γίγνεται, τετάρτοις τα πολλὰ
ξυμφορὰν ἔσκει.

7. (1 Quibus epilepsiæ (α ante puber-
tatem contingant, mutationem habent.
(2 Quibus verò accidunt viginti quin-
que annos natis, his plerumque com-
moriuntur.

7. Ceux qui sont atteints d'épilepsie avant la
puberté, peuvent en guérir : ceux, au contrai-
re, qui en sont atteints à l'âge de vingt-cinq
ans, ordinairement, continuent d'en être
tourmentés jusqu'à la fin de la vie.

ξ'. Ὅκοτοι πλευριτικοὶ γαστρίκοι δὲ ἀνα-

καθαίρονται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι,
πυκνύνουσιν ἐς ἐμπύημα μεθίσταται.

8. Qui pleuritici facti, non repurgantur supernè in quatuordecim diebus, his in suppurationem convertitur.

8. Dans la pleurésie, lorsqu'on n'est pas purgé complètement par les crachats, en quatorze jours, la maladie se change en empyème.

8'. Φθίσις γίνεται μάλιστα ἐκ τῆς πνευμονίης ἀπὸ δεκάτεως ἔτιων μέχρι πέντε καὶ τριήκοντα.

9. Tabes maximè fit ætatibus ab anno octavo decimo (α usque ad quintum trigesimum.

9. On est surtout attaqué de la phthisie, depuis l'âge de dix-huit ans, jusqu'à trente-cinq.

10. Οὗτοι κυνάνγκην διαφεύγουσιν, ἐς τὸν πλεύμονα τρέπεται, ἐν ἐπὶ ἡμέρησι ἀποθνήσκουσιν. ἢ δὲ ταύτας διαφύγουσιν, ἐμπυοὶ γίνονται.

10. Quibus anginam effugientibus (α

ad pulmonem vertitur, in septem diebus moriuntur. Si verò hos effugerint, suppurati fiunt.

10. Lorsque l'angine quitte la gorge pour se porter sur le poumon, la mort a lieu en sept jours; et si l'on passe ce terme, l'empyème s'établit.

10. Τοῖσιν ὑπὸ τῶν φθισίαν ἐνοχλημένοισιν, ἢν τὸ πλῆσμα, ὅπερ ἂν ἀποσῆσται, βαρὺ ὄζει ἐπὶ τὰς ἑνδρακας ἐπιχεόμενον, καὶ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θανατῶδεις.

11. A tabe vexatis, si sputum quod extussium, prunis superflusum, graviter oleat, (a et capilli de capite desluent, lethale.

11. Dans la phthisie, lorsque les crachats rejetés par la toux, exhalent sur les charbons ardents une odeur fétide, et que les cheveux tombent, c'est un signe mortel.

11. Ὅκόσοισιν ἂν φθισιῶσιν αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσιν, ἔτσι, διαρροίης ἐπιγεγομένης, ἀποτνήσκουσιν.

12. Quibus tabe laborantibus capilli

(α de capite defluunt, hi, alvi fluxu (β superveniente, moriuntur.

12. Les phthisiques dont les cheveux tombent, meurent s'il leur survient un cours de ventre.

12'. Ο κίσσοι αἷμα ὀφρῶδες ἀναπύουσι, πτερόισιν ἐκ τῆ πλεύμονος ἢ τοιαύτη ἀναγωγὴ γίνεται.

13. Qui sanguinem spumosi expuunt, (α his ex pulmone talis reiectio fit.

13. Si l'on rend par les crachats un sang écumeux, cette excretion vient du poulmon.

13'. Ὑπὸ φθίσιος ἐχομένη διαῤῥοια ἐπιγενομένη, θανάτῳδες.

14. A tabe detento alvi profluvium (α superveniens, lethale

14. La diarrhée qui survient aux phthisiques leur est mortelle.

14'. Ο κίσσοι ἐκ πλευρίτιδος ἔμπυοι γίνονται, ἐν ἀνακαταζῶσιν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν, ἀφ' ἧς ἂν ἡ ρῆξις γένη-

ται, παύονται ἢν δὲ μή, εἰς φθίσιν με-
θίσσονται.

15. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, si intra quadraginta dies, (a ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur supernè, liberantur : si verò minus, ad tabem transeunt.

15. Lorsque la pleurésie se termine par la suppuration, on guérit, si la matière s'évacue par le haut, dans les quarante jours qui suivent la rupture de la *vomique* ; si cela n'a pas lieu, la maladie se change en phthisie.

15'. Τό θερμόν βλάπτει ταῦτα τοῖσι
πλεονάκεις χρεομένοισι· σαρκῶν ἐκθήλυνσιν,
νεύρων ἀκράτειαν, γνάμης νάρκωσιν, αἰμορ-
ραγίας, λειποθυμίας. ταῦτα, οἷσι θάνατος.

16. Calidum eo frequenter utentibus has affert noxas : (1 (a carnis effœminationem, nervorum impotentiam, mentis torporem, (b sanguinis eruptiones, (2 animi deliquia : hæc quibus mors.

16. Le chaud occasionne à ceux qui en font un usage trop fréquent, les maux que voici :

il énerve les chairs, affoiblit les nerfs, engourdit l'esprit, produit des hémorrhagies, amène des syncopes, qui peuvent être suivies de la mort.

ιζ'. Τὸ δὲ ψυχρὸν, σπασμὸς, τετάνους, μελασμὸς, καὶ ῥίγεια πυρετώδεια.

17. Frigidum (α autem, convulsiones, tetanos, nigrores, et rigores febriles.

17. Le froid cause des spasmes, le tétanos, des gangrènes et des rigors fébriles.

ιη'. Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὀστέοισιν, ὁδῶσι, νεύροις, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῷ· τὸ δὲ θερμὸν, ὠφέλιμον.

18. Frigidum (α inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ : calidum verò utile.

18. Le froid est ennemi des os, des dents et des nerfs, contraire au cerveau et à la moelle épinière; le chaud, au contraire, y est favorable.

ιθ'. Ὅσῃ κατέψυκται, ἐκθερμαίνειν δεῖ, πλὴν ὅσῃ αἰμορραγέει, ἢ μήλλει.

19. Quæ perfrigerata sunt, excalefacere oportet, (1 præterquàm quæ sanguinem profundunt, aut sunt profusura.

19. Echauffez les parties qui ont été saisies par le froid; exceptez celles dont il y a hémorrhagie ou lorsqu'elle est imminente.

κ'. Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες ὅδεσμα περισκληρύνει, ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιεῖ, μελασμός, ῥίγηα πυρετώδεα, σπασμούς, καὶ τετάνους.

20. Ulceribus frigidum quidem mordax, (α cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrores, rigores febriles, convulsiones, et tetanos.

20. Le froid est un mordant pour les plaies, il durcit les bords de la peau, fait naître la douleur, arrête la suppuration, cause la gangrène, occasionne des rigors febriles, des spasmes et le tétanos.

κα'. Ἔστι δὲ, ὅτε ἐπὶ τετάνῳ ἄνευ ἔλκεος γένηται εὐσάρκῳ, ἡ ἑρπὺς μέσσω, ψυχρῇ πολ-

λῆ κατὰ χρόνον ἐπανόκλησιν θέρμαν ποιέ-
ται. Θέρμη δὲ ταῦτα ῥύεται.

21. Est verò, ubi in tetano (1 sine
ulcere, juveni benè carnosò, æstate me-
dià, (2 frigida multæ affusio caloris
revocationem facit; calor autem hæc
solvit.

21. Mais il arrive quelquefois que l'eau froide
employée en douches dans le milieu de l'été,
sur un jeune homme robuste, sans ulcère, et
pris de tétanos, a produit le retour de la cha-
leur; or, la chaleur fait cesser le tétanos.

αβ'. Τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν, ὅτε ἐπὶ
παντὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφαλείην·
δέρμα μακάσσει, ἰσχυαίνει, ἀνίσθιται, αἰ-
νέων, σπασμῶν, τετάνων παρρηγορεῖν· τὴν
δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ καρηδονίην λύει· πλεί-
στον δὲ διαφέρει ὅτε ἐκ κατὰ γμασι· μά-
λιστα δὲ τοῖσιν ἐνδοφρενέσι· τὰς αἰσθὰς δὲ
μάλιστα, τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα ἔχουσι·
καὶ ὁμοίᾳ ὑπὸ φύξις θνήσκει, ἢ ἐλκεῖται,
καὶ ἔρπησιν ἐπιρριμμένοις, ἔλκεα, αἰσθὰς,
ἰσθέρη, κήσκει. τυττεύει τὸ καὶ θερμὸν εἶλον
καὶ κρῖνον, τὸ δὲ ψυχρὸν καλὴν καὶ κτάνον.

22. (1 Calidum suppuratorium, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem : (2 cutem emollit, attenuat, dolores sedat, rigores, (3 convulsiones, tetanos mitigat : capitis verò gravitatem solvit : plurimum autem confert ossium fracturis : (4 maximè verò denudatis : ex his quidem maximè, qui in capite ulcera habent : et quæ à frigore moriuntur, aut ulcerantur : et herpetibus exedentibus : sedi, (5 pectore, utero, vesicæ. His calidum quidem amicum et decretorium, frigidum verò inimicum et occidens.

22. Le chaud est suppuratif, et le signe le meilleur de guérison : mais il n'est pas applicable à toutes les plaies ou *blessures* : il amollit la peau, la rarefie, calme la douleur ; appaise les rigors, les convulsions et le tétanos : il dissipe les pesanteurs de tête, convient généralement aux fractures des os, surtout quand ils sont à nu, et particulièrement à ceux de la tête, où il y a plaie : il est utile aux parties ulcérées, ou prises de mortification par le froid : aux dartres rouges, au siège, aux parties génitales, à l'intérieur et à

la vessie. Le chaud est favorable et décrétoire pour ces parties; le froid, au contraire, y est nuisible et mortel.

κγ'. Ἐν τριτέοισι δὲ δεῖ τῷ ψυχρῷ χρῆσθαι, ὁκόθεν αἰμορραγέει, ἢ μέλλει, μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ, ὁκόθεν ἐπιρρεῖ· καὶ ὁκόσαι φλεγμοναί, ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὕφαιμον ῥέποντα νεαρῷ αἵματι, ἐπὶ ταῦτα· ἐπεὶ τάγε παλαιὰ μελαίνει· καὶ ἐρυσίπελας τὸ μὴ ἐλκόμενον (ἀφελεῖ·) ἐπεὶ τόγε ἐλκόμενον βλάπτει.

23. (1 In his autem frigido uti oportet unde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super ipsa, sed circa hæc, unde influit. Et quæcumque inflammationes, (α aut flammæ ardores ad rubrum et sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos: nam inveteratos nigrefacit: erysipelas etiam non exulceratum (juvat): quoniam exulceratum lædit.

23. Il faut user de froid lorsqu'il y a hémorrhagie ou quand on la craint, non sur les parties elles-mêmes, mais sur les environs de

l'endroit d'où le sang coule : sur toutes les inflammations ou phlogoses qui tendent à une couleur rouge sanguine , par l'effet du sang récemment admis ; car le froid fait passer à une couleur noire l'inflammation qui dure depuis quelque temps. Le froid est utile dans l'érysipèle non ulcéré ; au contraire , il est nuisible lorsqu'il y a ulcération.

κδ'. Τὰ ψυχρά, οἷον χιῶν, κρύσταλλος, τῷ σῆθει πολέμια, βηχέων κινητικὰ, αἱμορροϊκὰ, καταρροϊκὰ.

24. Frigida, velut nix, glacies, (1 pectori (α inimica, (2 tusses movent, sanguinis eruptiones ac catarrhos inducunt.

24. Le froid , comme la neige , la glace , est ennemi de la poitrine ; il provoque la toux , occasionne des catarrhes et le crachement de sang.

κε'. Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ ἀλγύματα ἄτερ ἔλκεος, καὶ ποδάγρικα, καὶ σπάσματα, τρυτέων τὰ πλεῖστα τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχεόμενον ρηίξει τε καὶ ἰσχυαίνει, καὶ ὀδύνην λύει. νάρκη γὰρ μετρίῃ ὀδύνης λυτική.

25. Tumores autem in (α articulis et dolores absque ulcere, et podagricos, (ι et convulsiones; horum plurima frigida multa affusa, et levat, et attenuat, et dolorem solvit. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet.

25. Lorsque les articulations sont affectées de tumeurs douloureuses non ulcérées, ou attaquées de la goutte; ou qu'on éprouve des convulsions: des douches d'eau froide adoucissent la plupart de ces maux; elles sont résolutes, et diminuent les douleurs. En effet, un engourdissement modéré est un calmant.

κς'. Ὅταν τὸ ταχέως θερμαίνόμενον, καὶ ταχέως ψυχόμενον, καφώτατον.

26. Aqua, quæ citò calefiat, (α et citò refrigeretur, levissima.

26. L'eau qui s'échauffe promptement et qui se refroidit de même, est la plus légère.

κζ'. Οἷοις οἱ δὲ πλεονέχοντες ὀρεῖται ὑπόψιν, τοῖσι πάντοτε διψῶσιν, ἢν ἐπιπορευθῶσιν, ἀγαθόν.

27. Quibus autem libendi appeten-

tiæ noctu, iis valdè sitientibus, si obdormierint, bonum.

27. Ceux qui la nuit éprouvent le désir de boire, sont soulagés s'ils s'endorment avec la soif.

κθ'. Γυναικείων ἀγωγὸν ἢ ἐν ἀρώμασι πυρεῖν· πολλαχῶς δὲ καὶ ἐς ἄλλα χρησίμη ἀν' ἣν, εἰ μὴ καρποῦρας ἐνεποιίει.

28. Suffitus aromatum muliebria ducit : sæpius autem et ad alia utilis esset, nisi capitis gravitates induceret.

28. Des fumigations aromatiques provoquent les menstrues ; l'usage de ce moyen conviendrait généralement, s'il n'en résulroit pas souvent des pesanteurs de tête.

κθ'. Τὰς κυῖσας φαρμακεύειν, ἣν ὀργᾶ, τετραμήνῃ, καὶ ἄχρι ἐπὶ τὰ μηνῶν· ἧσσαν δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια, καὶ πρεσβύτερα, εὐλαβεῖσθαι χρή.

29. Prægnantes purgandæ, si turgeat materia, quadrimestres, et usque ad septimum mensem : hæ verò minùs.

Juniores autem, et seniores *fœtus*, (α
cautè vitare oportet.

29. Purgez les femmes enceintes depuis le quatrième mois seulement, jusqu'au septième, s'il y a orgasme; mais moins *aux autres époques* qu'à celles-ci, car il faut craindre pour le *fœtus* plus jeune ou plus avancé.

λ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ, ὑπὸ τινος
εὖν ὀξείων νοσημάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.

30. Mulierem in utero gerentem ab
acuto (α aliquo morbo corripì, lethale.

30. La femme qui dans l'état de gestation vient à être attaquée de maladie aiguë, est en danger de mort.

λά. Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεῖσα
ἰκτινρώσκει· ἢ μᾶλλον, εἰ μείζον εἴη τὸ
ἔμῳρον.

31. Mulier in utero gerens sectà venà
(α abortit : et magis, si major fuerit
fœtus.

31. La saignée durant la gestation fait naître la femme cœlée, ou tout au moins est plus
préjudiciable.

λβ'. Γυναικὶ αἷμα ἐμείσθη, τῶν καταμηνι-
νίων ραγέντων, λύσις γίνεται.

32. Mulieri sanguinem (α evomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.

32. Le vomissement de sang cesse chez les femmes, par l'éruption des menstrues.

λγ'. Γυναικὶ τῶν καταμηνίων ἐκλειπόν-
των, αἷμα ἐκ τῶν ρινῶν ρυῖναι, ἀγαθόν.

33. Mulieri, menstruis deficientibus, ἐ (α naribus sanguinem fluere, bonum.

33. L'hémorrhagie du nez qui survient lors de la suppression de l'évacuation menstruelle, est avantageuse à la femme.

λδ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ ἢν ἡ κοιλίη
πολλὰ ρυῖ, κήδυνος ἐκτρέφεται.

34. Mulieri in utero gerenti, si al-
vus (α multum fluxerit, periculum ne
abortiat.

34. Si une forte diarrhée survient à la femme en état de gestation, il y a à craindre la fausse couche.

λε'. Γυναικὶ ὑπὸ ὑπερτακτῶν διαβλημένη, ἢ
δυσκοιλιᾷ, αἷμα ἐκ τῶν ρινῶν ρυῖναι, ἀγαθόν.

35. Mulieri ab uterinâ *passione vexatæ*, aut difficulter parienti, (*α* *sternutatio* superveniens, bonum.

35. L'éternument qui survient à la femme dans un accès hystérique, ou lors d'un accouchement laborieux, lui est avantageux.

λς'. Γυναικὶ τὰ κατὰ μῆνα ἄχρσα, καὶ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γιγνόμενα, καλὰ ἔστιος δεικνύει σημαίνει.

36. Mulieri menses decolores, neque secundum eadem (*tempus et modum*) semper prodeuntes, purgatione opus esse significant.

36. Dans la femme, les menstrues qui sont décolorées ou qui se font irrégulièrement, indiquent qu'elle a besoin d'être purgée.

λζ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ, ἣν οἱ μάθοι ἐξαίφνης ἰσχυροὶ γίνονται, ἐπιτεγνώσκει.

37. Mulieri in utero gerenti si mammæ (*α* *ex improviso* *graciles* fiant, abortit.

37. Si les mamelles s'affaissent subitement dans une femme enceinte, elle fait une fausse couche.

λη'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ, ἣν ὁ ἕτερος
μακρὸς ἰσχνὸς γένηται δίδυμα ἐχέσῃ, ἑτέ-
ρον ἐκτιτρώσκει· καὶ, ἣν μὲν ὁ δεξιὸς ἰσχνὸς
γένηται, τὸ ἄρσεν· ἣν δὲ ὁ ἀριστερὸς, τὸ
θῆλυ.

38. Mulieri in utero gerenti, si al-
tera mamma gracilis fiat, gemellos ges-
tanti, alterutrum abortit; et, si quidem
dextra gracilis fiat, marem: si verò si-
nistra, foeminam.

38. Dans la femme dont la grossesse est de
deux enfans, si l'une des mamelles s'affaisse,
la fausse couche atteint l'un ou l'autre des ju-
meaux; celui du sexe masculin, si c'est la
droite, et celui du sexe féminin, si c'est la
gauche.

λθ'. Ἡ γυνὴ μὴ κύσσει, μηδὲ τετοκυῖα,
γάλα ἔχει, ταύτῃ τὰ κατὰ μῆνα ἐκλέλοιπε.

39. Si mulier quæ nec prægnans est,
nec peperit, (α lac habeat, ei menstrua
defecerunt.

39. Si la femme qui n'est ni enceinte, ni
nouvellement accouchée, a du lait dans les
mamelles, ses menstrues sont supprimées.

μ'. Γυναιξὶν ὁκόσησιν ἐς τὰς τιτὰς αἷμα
συστρέφεται, μανίην σημαίνει.

40. Mulieribus quibus in mammas
sanguis (α convertitur, insaniam signi-
ficat.

40. Chez les femmes, lorsque le sang re-
monte aux mamelles, c'est un signe *prochain*
de manie.

μά. Γυναῖκα ἣν θείλῃς εἰδέναι εἰ κύει,
ἐπὶν καθεύδειν μέλλῃ, (ἀδειπνῶ ἐξῆς) με-
λίκρατον δίδόναι πιεῖν. κῆν μὲν σρόφον ἔχῃ
περὶ τὴν γαστέρα, κύει ἢ δὲ μὴ, ὁ κύει.

41. Mulierem si velis cognoscere, an
prægnans sit, ubi dormitura est, (in-
cœnatæ) aquam mulsam bibendam dato.
Et si quidem tormen habeat circa ven-
trem, prægnans est : si verò minùs,
prægnans non est.

41. Lorsque vous voulez savoir si une femme
est enceinte, donnez-lui à boire de l'eau miel-
lée au moment de se coucher, sans avoir pris
d'alimens ; si elle sent des tranchées autour du
ventre, il y a grossesse ; autrement il n'y a
point grossesse.

μβ'. Γυνή έγκυος, ει μέν άρρεν κύει, εύχρεος είναι· ήν δέ θήλυ, δύσχερος.

42. Mulier pręgnans, si quidem matrem gestat, benè colorata est: si verò fęminam, malè colorata.

42. La femme enceinte a bonne couleur si toutefois l'enfant qu'elle porte est un garçon; et mauvaise couleur si c'est une fille.

μγ'. Η'ν γυναικί κυήτη έρυσίπελος εν τή ύτέρη γίνηται, θανατωδής.

43. Si mulieri pręgnanti erysipelas in utero fiat, lethale.

43. Si durant la gestation un érysipèle attaque intérieurement l'utérus, il y a danger de mort pour la femme.

μδ'. Ο'κόσαι παρὰ φύσιν λεπταί έξσαι εν γαστρί έχουσιν, εκτιτρώσκουσι, πρην ή παχυνθήναι.

44. Quę præter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant.

44. Les femmes enceintes qui sont extrême-

ment fluettes, sont des fausses couches avant que le corps ait pris de la consistance.

μέ. Οκόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκτιτρώσκουσι δίμηννα καὶ τρίμηννα ἀτερ-
προφάτιος φανερῆς, ταύτησιν αἱ κοτυληδό-
νες μύξης μεσαί εἰσι, καὶ ὅς δύνανται κρα-
τεῖν ὑπὸ τῷ βάρους τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορ-
ρήγνυνται.

45. (1 Quæ verò mediocriter corpus habentes abortiunt bimestres et trimestres, sine causâ manifestâ, his uteri acetabula mucò plena sunt, et non possunt continere fœtum, præ gravitate, sed abrumpuntur.

45. Celles dont l'embonpoint est médiocre, sont prises de fausse couche, le deuxième ou le troisième mois, sans cause manifeste. Chez ces dernières, les orifices des vaisseaux utérins remplis de glaires, ne sont pas capables de soutenir le poids du fœtus, et il y a rupture.

με'. Οκόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι ἔσθαι μὴ ὑλλαμβάνουσιν τῇ ἐν γαστρὶ, ταύτησι τὸ ἐπίπλοον τὸ σῶμα τῶν ὑπερῶν ἀποσωΐζει, καὶ, πρὶν ἢ λεωλυθῆναι, ὁ κύβητις.

46. (1 Quæ præter naturam crassæ existentes non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, et, priusquam attenuentur, prægnantes non fiunt.

46. Les femmes excessivement grasses ne conçoivent pas, parce que l'épiploon comprime l'orifice de l'utérus; et avant qu'elles ne soient maigries, la fécondation ne peut avoir lieu.

μζ'. Η'ν ὁσέρη ἐν τῷ ἰσχύρῳ ἐγκειμένη διαπυήσῃ, ἀνάγκη ἔμμοτον γενέσθαι.

47. (1 Si uterus coxi incumbens suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari.

47. Lorsque l'utérus incliné sur l'ischion est attaqué de suppuration, nécessairement il s'y établit un ulcère sinueux.

μη'. Ἐμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι δεξιόισι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μάλλον.

48. Fœtus, mares quidem in dextris, feminae verò in sinistris magis.

48. Dans le côté droit de la femme sont

les fœtus mâles , et dans le côté gauche ;
les fœtus femelles.

μθ'. Ἐς ὑστέρων ἐκπλάσιος πλάσμιον
ἐπιτιθεῖς , ἐπιλαμβάνειν τὰς μυκτῆρας καὶ
τὸ στόμα.

49. Ut secundæ excidant, sternuta-
torio indito, nares et os apprehendere
oportet.

49. Pour faire sortir l'arrière-faix, employez
un sternutatoire, tandis que vous comprime-
rez la bouche et le nez.

ν'. Γυναικὶ τὰ καταμήνια ἢν βέλῃ ἐπι-
σχέιν, σικύην ὡς μεγίστην πρὸς τὰς τιτλὺς
πρόσθαλλε.

50. Mulieri menstrua si velis cohi-
bere, cucurbitam quàm maximam (a ad
mammas appone.

50. Si vous voulez faire cesser l'évacuation
menstruelle trop abondante , appliquez une
grande ventouse sur les mamelles.

να'. Οἰόσαι ἐν γαστρὶ ἔχει, τετίαν
τὸ στόμα τῶν ὑστέρων συμμέμυκεν.

51. Quæ in utero gerunt, harum os uteri clausum est.

51. Le col de l'utérus est fermé en même temps que la femme a conçu.

ιβ'. Η'ν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ γάλα πολὺ ἐκ τῶν μαζῶν ῥυῆ, ἀσθενὲς τὸ ἔμβρυον σημαίνει. ἢν δὲ στερεοὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν, ὑγιεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

52. Mulieri in utero gerenti si multum lactis (α ex mammis fluxerit, infirmum foetum significat. Si verò solidæ fuerint mammæ, sanio rem foetum significat.

52. Si le lait coule abondamment des mamelles d'une femme enceinte, ce signe annonce la foiblesse du foetus ; si au contraire les mamelles sont dures , c'est une marque que le foetus est bien portant.

ιγ'. Ο'κίσαι διαφθείρειν μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, ταύτησιν οἱ τιτθοὶ ἰσχυροὶ γίνονται. ἢν δὲ πάλιν σκληροὶ γένωνται, ὀδύνη ἔσται, ἢ ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰσχύοισιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσι γένεσι, καὶ δὲ διαφθείρουσιν.

53. Quæ perdituræ sunt foetus, his mammæ graciles fiunt. Si verò rursus duræ fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, et non perdunt.

53. Lorsque les femmes enceintes sont menacées de fausses couches, les mamelles s'affaiblissent ; mais si elles redeviennent dures, ou la douleur s'y déclare, ou elle se porte à la hanche, ou aux yeux, ou aux genoux, et la fausse couche n'a point lieu.

νδ'. Οκόσησι τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν σκληρόν ἐστι, ταύτησιν ἀνάγκη τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν ξυμμεύειν.

54. (1 Quibus os uteri durum est, his necesse est os uteri (2 clausum esse.

54. Les femmes dont le col de l'utérus est dur, ont nécessairement cet orifice fermé.

νέ. Οκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχσαι ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνονται, ἄνευ προφάσιος φανερῆς, τίττεσι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκτεράσσειν κινδυνεύουσιν.

55. (1 Quaecumque in utero gerentes à febris corripuntur, et vehementer attenuantur, absque manifestâ occasione, difficulter et periculosè pariunt, aut abortientes periclitantur.

55. Les femmes qui durant la gestation, sont attaquées de fièvres, ou qui maigrissent excessivement sans cause manifeste, accouchent avec peine et danger, ou même elles courent risque de la vie en faisant une fausse couche.

ν5'. Ε'πὶ ῥάῳ γυναικείῳ σπασμὸς καὶ λειποθυμία ἢν ἐπιγένηται, κακόν.

56. Si fluxui muliebri convulsio et animi deliquium superveniat, malum.

56. Si la convulsion ou la défaillance survient lors du flux menstruel, c'est un mauvais signe.

νζ'. Καταμηνίων γινομένων πλειόνων, νῆσοι ξυμβαίνουσι καὶ μὴ γινομένων, ἀπὸ τῆς ὑστέρης γίγνονται νῆσοι.

57. (1 Mensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt : (2 non prodeuntibus (α, ab utero fiunt morbi.

57. La menstruation trop abondante amène des maladies; et si elle ne se fait point, il survient des affections causées par l'utérus.

ιη. Ἐπὶ τῷ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι, καὶ ἐπὶ ὑστέρῃ φλεγμαινέσῃ, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι, στραγγιστρίη ἐπιγίνεται. ἐπὶ δὲ ἥπατι φλεγμαίνοντι, λύγξ ἐπιγίνεται.

58. (1 Recto intestino inflammato, et utero inflammato, et renibus suppuratis, urinæ stillicidium supervenit: (2 hepatis autem inflammato, singultus supervenit.

58. La strangurie survient à l'inflammation du rectum et de l'utérus, ainsi qu'à la suppuration des reins; et le hoquet à l'inflammation du foie.

ιθ'. Ἰυνὴ ἦν μὲν λαμβάνη ἐν γαστρὶ, βέλη δὲ εἰδέναι εἰ λήψεται, περικαλύψας ἱματίοισι θυμὸν κάτω. καὶ μὲν πορεύεσθαι σοι δοκίη ἢ ὁδμὴ διὰ τοῦ σώματος εἰς τὰς ῥῖνας καὶ εἰς τὸ στόμα, γίνωσκε, ὅτι αὐτὴ, καὶ οἱ αὐτὴν, ἄγονός ἐστιν.

59. Mulier, si in ventre non couci-

piat, velis autem scire an conceptura sit, vestibus circumtectam subter suffito; et si quidem procedere tibi videatur odor per corpus ad nares et ad os, scito hanc, non propter se ipsam, infœcundam esse.

59. Si une femme ne conçoit pas, et que vous vouliez savoir si elle peut engendrer, environnez-la de couvertures et faites-lui prendre une fumigation aromatique; si l'odeur vous paroît avoir monte à travers le corps vers le nez et la bouche, croyez que la femme, par elle-même, n'est point stérile.

ξ'. Η'ν γυναῖκί ἐν γαστρὶ ἔχῃσιν αἱ καθάρσιες πορεύονται, ἀδύνατον τὸ ἐμῶσιν ὑγιαίνειν.

60. Si mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, fœtum sanum esse impossibile.

60. Il est impossible que le fœtus se porte bien si la menstruation a lieu pendant la gestation.

ξά'. Η'ν γυναῖκί καθάρσιες μὴ πορεύονται, μήτε φρίκης μήτε πυρετὸς ἐπιγενέσθαι.

μένει, ἄσαι δὲ αὐτῇ προσώπιώσι, λογίζε-
ταύτην ἐν γαστρὶ ἔχειν.

61. Si mulieri purgationes non pro-
deant, neque horrore, neque febre
superveniente, cibi autem fastidia ipsi
accidant; hanc in utero gerere putato.

61. Si les menstrues sont supprimées sans
qu'il survienne à la femme ni fièvre, ni fris-
sonnement, mais qu'elle ait du dégoût, croyez
à la grossesse.

ξβ'. Οἰόσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μή-
τρας ἔχουσιν, ὃ καὶ οὐκ ἔστιν. καὶ οἰόσαι καθύ-
γρως ἔχουσι τὰς μήτρας, ὃ καὶ οὐκ ἔστιν· ἀποσ-
βέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος· καὶ οἰόται
ξηρὰς μᾶλλον καὶ περικαῖς· ἐνδείη γὰρ τῆς
τροφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα. οἰόσαι δὲ ἐξ
ἀμφοτέρων τὴν κελύνην ἔχουσι σύμμετρον,
καὶ τοιαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

62. Quæ frigidus ac densos uteros
habent, non concipiunt; (1 et quæ præ-
humidos habent uteros, non conci-
piunt; extinguatur enim ipsis genitura:
et quæ siccos magis et adurentes; ali-

menti enim inopià semen corrumpitur. Quæ verò ex utrisque temperamentum habent moderatum, (1 hæ ipsæ proliferæ fiunt.

62. Les femmes qui ont l'utérus froid et épais ne conçoivent pas, ni celles qui l'ont trop humide, car l'esprit prolifique s'y éteint. De même la conception ne peut avoir lieu si l'utérus est trop sec et trop ardent, car le sperme se corrompt faute de nourriture; mais celles qui participent dans une juste proportion de ces deux tempéramens, sont très-aptés à la fécondation.

ξγ'. Παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων. ἢ γὰρ δι' ἀραιότητα τῆς σώματος τό πνεῦμα ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ παραπέμψαι τὸ σπέρμα· ἢ διὰ τὴν πυκνότητα τὸ ὑγρὸν ἔκ διαχωρεῖ ἔξω· ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα ἐκ ἐκπυριᾶται, ὥστε ἀθροίζεσθαι πρὸς τὸν τόπον τῆτον· ἢ διὰ τὴν θερμασίην τὸ αὐτὸ τῆτο γίνεται.

63. Similiter autem etiam in masculis. (1 Aut enim propter corporis raritatem spiritus extrà fertur, adeò ut semen non emittat: (2 aut propter densi-

tatem humidum non pervadit foras ; aut propter frigiditatem non incalescit , ut ad hunc locum congregetur : aut propter caliditatem hoc idem contingit.

63. Il en est de même des hommes; car ou le corps, par trop de perméabilité, laisse transpirer au dehors l'esprit prolifique, en sorte que le sperme ne peut lui-même en envoyer; ou bien par la densité trop grande, l'humide ne peut sortir; ou à cause de la frigidité naturelle, il manque de l'effervescence nécessaire pour produire une éjaculation complète; ou cela arrive encore par trop de chaleur.

ξδ'. Γάλα διδόναι κεφαλαλγέσσι, κακόν. κακόν δὲ καὶ πυρεταίνεσσι, καὶ οἷσιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαποροῖ ορίζοντα, καὶ τοῖσι οὐκ ἄδεσι. κακόν δὲ καὶ οἷσι χολάδες αἱ ὑποχωρήσιες, καὶ ἐν τοῖσι ὁξέσι πυρετοῖσιν ἔσσι καὶ οἷσιν αἵματος πολλῆς διαχώρησις γέγονεν. ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθινάδεσι μὴ λίην πολλῶ πυρέσσουσι διδόναι (γάλα,) καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι καὶ βληχροῖσι, μηδεὶς τῶν προειρημένων σημείων παρόντος· παρὰ λόγον δὲ ἐκτετηκόσιν.

64. (1 (α Lac dare capite dolentibus,

malum. Malum verò etiam febricitantibus, (2 et quibus hypochondria elevata sunt murmurantia, et siticulosus. Malum autem et quibus dejectiones biliosæ, et iis qui acutis sunt febribus : et quibus copiosi sanguinis facta est egestio. (3 (b Convenit verò tabidis (4 non admodum valdè febricitantibus (lac) dare, et in febribus longis et languidis, nullo ex supradictis signis præsentem; et præter rationem quidem extenuatis.

64. Il est mal de donner le lait dans les douleurs de tête, dans la fièvre, et si les hypocondres sont tendus avec borborygmes; lorsqu'on éprouve la sensation de la soif; lors des déjections bilieuses, et dans les fièvres aiguës; dans le flux de sang copieux. Le lait convient, au contraire, dans la consommation, pourvu qu'il n'y ait pas trop de fièvre; c'est pourquoi il convient dans les petites fièvres lentes; et lorsqu'il ne se rencontre aucun des signes contraires précités; enfin, le lait est utile aux personnes qui sont dans le marasme.

ξί. Ο'κόσοισιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνονται, ὃ μάλιστα σπῶνται, ὃ δὲ μαίνονται.

τραύματων δὲ ἀφανισθέντων ἐξαίφνης, τοῖσι μὲν ὀπιώθεν, σπασμοὶ, τέτανοι τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν, μανίαι, ἢ ὀδύνηαι πλευρᾷ ὀξείαι, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσεντερία, ἢ ἐρυθρὰ ἢν τὰ οἰδήματα.

65. Quibus tumores in ulceribus (a apparent, ii non valdè convellantur, neque insaniunt. His autem derепentè disparentibus, quibus in postea quidem parte fuerint, convulsiones fiunt et tetani: quibus verò in anticâ, insanie, aut lateris dolores acuti, aut suppuration, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

65. Ceux dont les plaies sont accompagnées de tumeur, ont rarement des convulsions et des délires; mais la tumeur disparoissant tout à coup, si la blessure est à la partie postérieure, il survient des spasmes et le tétanos; mais si la blessure est en devant, il en résulte des délires; des douleurs de côté aiguës, ou l'empyème, ou la dysenterie, si la tumeur étoit rouge, ou la plaie saignante.

ξς'. Ἦν, τραυμάτων ισχυρῶν εὐόντων καὶ

· ποιηῶν, οἰδήματα μὴ φαίνεται, μέγα κακόν.

66. Si, magnis et pravis existentibus vulneribus, tumores non (α) appareant, ingens malum.

66. C'est un très-grand mal s'il ne paroît pas de tumeur à de fortes et dangereuses plaies.

ἕζζ'. Τὰ χαῦνα, χρησά· τὰ δὲ ἔνωμα, κακά.

67. Laxi tumores, boni : crudi verò, mali.

67. Les tumeurs molles sont les meilleures ; mais celles où il y a de la crudité sont mauvaises.

ἕζδ'. Τῷ τὰ ὀπίσθεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνώμενον, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθίῃ φλὲψ τμηθεῖται ὠφελεῖ.

68. Posticâ capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta juvat.

68. Dans les douleurs de la partie postérieure de la tête, il est avantageux d'ouvrir la veine verticale du front.

ἕε'. Πύλα ἀρχεται, γυναιξὶ μὲν, ἐξ

ὀσφύος μᾶλλον, καὶ διὰ τῶν ἐς κεφαλὴν ἀνδράσι δὲ μᾶλλον ὀπισθεν, ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, οἷον ἀπὸ τε πηχέων καὶ μηρῶν. ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν. δηλοῖ δὲ τῆτο ἡ θρίξ.

69. Rigores incipiunt, mulieribus quidem, ex lumbis magis, et per dorsum ad caput; viris autem posticâ magis parte, quàm anticâ corporis, velut ex cubitis ac femoribus. (1 Sed et cutis viris rara est. Hoc quidem pilus indicat.

69. Dans les femmes, les rigors commencent plutôt par les lombes et montent du dos à la tête; dans les hommes, les frissons prennent plutôt en arrière qu'en devant du corps, comme aux coudes, et aux cuisses, où la peau est rare; on le voit par les poils.

ό. Οἱ ὑπὸ τεταρταίων ἀλίσκόμενοι, ὑπὸ σπασμῶ ἔ πάνυ τι ἀλίσκονται· ἣν δὲ ἀλίσκωνται πρότερον, εἴτα ἐπιγένηται τεταρταῖος, παύονται.

70. A quartanis correpti, (1 à convulsione non admodum corripiuntur;

(2 si verò priùs corripìuntur, et postea quartana, supervenerit, liberantur.

70. Ceux qui sont attaqués de fièvre quarte, ne sont que très-rarement pris de convulsions; mais s'ils en étaient attaqués auparavant et qu'ensuite la fièvre quarte survienne, elle les en délivre.

οά. Ο'κόσοισι δέρματα περιτείνεται καρφαλέα ή σκληρά, άνευ ιδρώτων τελευτῶσιν· όκόσοισι δέ χαλαρά ή άραιά, σύν ιδρώτι τελευτῶσιν.

71. Quibus cutis obtenditur arida ac dura, ii sine sudore moriuntur; quibus verò laxa ac rara, ii cum sudore moriuntur.

71. Dans les maladies, ceux dont la peau est sèche, dure et tendue, meurent sans avoir de sueurs; le contraire a lieu pour ceux qui ont la peau lâche et rare.

οβ'. Οί ικτερώδεις ε' πάντι πνευματά-
δείς είσιν.

72. Ictericici non admodum flatulenti sunt.

72. Les ictériques n'ont pas beaucoup de flatuosités.

N O T Æ

I N

SECTIONEM QUINTAM.

APHOR. I. **A**PH. vij, 25. — Coac. iv, 24. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 67, l. 12. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 420, 486.

Convulsio ab hellebori usu inducta, lethalis, quòd et ab illo enormis producat^r vacuatio, et lædantur immuni irritatione nervi; hinc duplici titulo metuendum medicamen. Eadem causa idem producit in vulneribus: sed ab effuso sanguine periculosior adhuc est convulsio, quòd morte tantum proximam appareat.

APHOR. II. Coac. iij, 81, 382. — Cap. Vulner. xxxv, 5; xvj, 3, 4. = (a Cels. v, c. 2, s. 8, p. 342, l. 5. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 343, 764.

APHOR. III. Aph. vij, 9. — Coac. iij, 57. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 93, l. 4. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 342; t. ij, 242.

APHOR. IV. Aph. vij, 41. — Nat. Human. x, 1 ad 7. — Loc. in Hom. slv, 1. — Coac. iv, 22, 25. — Verat. Us. i, 8. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 93, l. 6. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 342; t. ij, p. 242; t. iij, p. 194.

APHOR. V. II. Morb. xvij, 2, 3, 4. — (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 67, l. 14. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 3; t. iij, p. 252.

APHOR. VI. Judicat. viij, 19. — III. Morb. xij, 11. = (a Cels. ij. præf., s. 3, p. 55, l. 12; iv, c. 1, s. 2, p. 227, l. 26. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 323.

Si quatuor dies superaverint, sani sunt,
febre scilicet et superveniente quæ regularem
motum et salutarem abnormi convulsionum
impetui substituit.

APHOR. VII. VI. Epid. viij, 96. — (1 Aph. ij, 45. — (2 Aph. ij, 39. — II. Prædic. xvj, 1 ad 16, 5, 15. — Morb. Sac. xij, 1, 5. = (a Cels. ij, præf., s. 6, p. 57, l. 7; ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 12; p. 89, l. 11; iij, c. 2, sect. 12, p. 202, l. 18. — Exquisitam hujusce Aphorismi theoriam vide apud Russel OEconomia naturæ in Glandulis,

cap. 4, p. 80 et seq.; van-Swieten, t. ij, p. 43; t. iij, p. 403, 436.

APHOR. VIII. Aph. v, 15. — Loc. in Hom. xxvj, 4. = Coac. iij, 131, 132, 171. — VII. Epid. xlvij, 16. — I. Morb. iij, 29; v, 12; xj, 6 ad 11; xxij, 15, 16; xxiv, 10. — III. Morb. xvj, 30 ad 36. — Affect. viij, 19, 20; ix, 13. — Int. Affect. j, 26. — Vict. Acut. vij, 1, 2. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 53, 665.

APHOR. IX. Aph. iij, 29; viij, 7. — Coac. iij, 260. (a Cels. ii, c. 2, s. 11, p. 198, l. 9. — *Vide* Russel, Loc. citatis. *Vide* Theat. tabid. *Vide* Boerhaavium Aphorism. de cogn. et curand. morbis, § 1198. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 14.

APHOR. X. Prænot. xxij, 15. — Coac. iij, 100, 101, 105, 106. — II. Morb. xxvij, 15 ad 19. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 77, l. 23. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 619.

Resolutione scilicet impossibili, superest sperandum, aut Metastasis, aut Abscessus.

APHOR. XI. Coac. iij, 213, 252. — II. Morb. xlvj, 16 ad 20; lv, 20 ad 23. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 87, l. 21; iij, c. 2, s. 11, p. 196, l. 11. — *Vide* van-Swieten, t. iv, pag. 64, 70.

APHOR. XII. Aph. v, 14; vij, 78. — Coac.

iiij, 244, 255. — I. Morb. x, 36. — II. Morb. xlvj, 22. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 87, l. 18. = (b Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 87, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iv, p. 70.

APHOR. XIII. Coac. iiij, 216, 250, 251, 273. — II. Morb. lj, 4. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 74, l. 26. — Al. Trall. vij, 1. — Aretæus de signis Morb. Acut. l. 2, c. 2. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 24.

APHOR. XIV. Aph. v, 12; vij, 78. — Coac. iiij, 244, 256. — I. Morb. xj, 5, x, 36, 39 ad 41; xj, 41; xiv, 10. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 87, l. 21; iiij, c. 2, s. 11, p. 200, l. 25. — Aretæus de Morb. diuturn. l. 1, 8, in fine. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iv, p. 70.

APHOR. XV. Loc. in Hom. xvj, 10. — Coac. iiij, 142, 171, 209, 215. — VII. Epid. xlvj, 16, 17. — I. Morb. x, 15, 17, 20. — II. Morb. lv, 23. — III. Morb. xvj, 35. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 75, l. 28; ij, c. 1, s. 7, p. 81, l. 5.

APHOR. XVI. (1 Humid. Us. iiij, 2, 3. = (2 Aph. j, 23. — (a Cels. j, c. 1, s. 11, p. 34, l. 15; j, c. 2, s. 7, p. 47, l. 10. — (b Cels. ij, præf. p. 55, l. 9. — Aretæus de curat. Morb. Acut. ij, 2. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p. 36; t. iiij, p. 362.

Docet Physica expandi à calore omnia, tensa

relaxari, fluida rarescere : inde enumerati
pendent effectus.

APHOR. XVII. Aph. v, 20. — Humid. Us. iij, 4; iv, 5. — Fractur. xxxvij, 6. — Articul. lxxiv, 10. = (a Cels. ij, præf. p. 55, l. 11. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 521, 610 : t. ij, p. 219, 327. *Vide* Sanctorium, sect. ij, Aph. 16, 17, 18, 21, 35, 38, etc..

Stringit vasa, cogit liquida frigus; motum
arceat et impedit : hinc a frigore Gangræna.
Quid si frigus subitum et insolitum invadat?
Vehementiora omnia expectanda sunt.

APHOR. XVIII. Humid. Us. iv, 1, 4. = (a Cels. j, c. 2, s. 7, p. 46, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 370, 521; t. ij, p. 219, 327.

APHOR. XIX. Aph. ij, 22; v, 23. — Humid. Us. j, 21. = (1 Humid. Us. xj, 28.

Ne sanguini calor faveat eruptionem mo-
lienti.

APHOR. XX. Aph. v, 17. — Humid. Us. iij, 4; iv, 5; xj, 15. — Fractur. xxxvij, 6. — Articul. lxxiv, 10. = (a Cels. j, c. 2, s. 6, p. 46, l. 24. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 291, 344, 610.

APHOR. XXI. Humid. Us. xj, 16. = (1 Aph. v, 25. = (2 III. Morb. xiv ad xv. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 327, 328; t. iij, p. 181.

Attento

Attentè legatur Galenus in hunc Aphorismum.

Mirum illud quoque addemus, praxim hanc, velut novam et recenter inventam, à quibusdam prædicatam nuperrimis annis fuisse in tetano, præsertim à mephiti orto.

APHOR. XXII. Humid. Us. xj, 18 ad 28. = (1 Humid. Us. xj, 10. — Ulcer. v, 1. = (2 Humid. Us. j, 10. = (3 Humid. Us. j, 19. — I. Morb. vj, 14. = (4 Humid. Us. v, 13. = (5 Humid. Us. vj, 2, 3. — Legatur Galenus in *hunc aphorismum*. — Vide van-Swieten, t. j, p. 344, 521, 640; t. ij, p. 219.

APHOR. XXIII. (1 Aph. v, 19. = (a Cels. j, c. 2, s. 7, p. 47, l. 2. — Vide van-Swieten, t. j, p. 610; t. iij, p. 181; t. iv, p. 35.

APHOR. XXIV. (1 Humid. Us. iv, 8; v, 16. = (2 VI. Epid. iij, 22. = (a Cels. j, c. 2, s. 7, p. 46, l. 2.

Notissiman theoriam vide apud van-Swieten, t. ij, p. 581; t. iv, p. 22, 35. — Vide et Observationes Sanctorii, sect. ij.

APHOR. XXV. Humid. Us. x, 14, 15. = (1 Aph. v, 21. = (a Cels. j, c. 2, s. 7, p. 47, l. 1. — Vide Martianum in hunc Aphorism,

— *Vide* van-Swieten, t. j, p. 879; t. ij, p. 327, 328; t. iij, p. 181; t. iv, p. 313.

APHOR. XXVI. Aër. Aq. Loc. xvjj, 1. — II. Epid. ij, 29. = (a Cels. ij, c. 2, s. 10, p. 120, l. 16.

APHOR. XXVII. VI. Epid. iv, 42. = (a Cels. j, c. 2, s. 5, p. 45, l. 21.

APHOR. XXVIII. Natur. Mul. xix, 161 ad 187.

APHOR. XXIX. Aph. iv, 1. — (a Cels. ij, c. 2, s. 1, p. 95, l. 8.

Idem est hic Aphorismus ac primus Sectionis quartæ, non cum tamen de suo hoc loco deturbavit Galenus, quòd speciatim hic de mulieribus agatur. Nos autem tum hanc de causâ cum non eximemus, tum quòd citationibus variorum Auctorum numero non responderet.

APHOR. XXX. Aph. v, 43, 55. — I. Morb. iij, 9. — Hippocrat. j, Epid. ij, 141. — De Naturâ Puer. xij, 19. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 67, l. 18. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 30; t. iv, p. 418.

APHOR. XXXI. (a Cels. ij, c. 2, s. 1, p. 94, l. 17 et l. 22, etc. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 145; t. iv, p. 417.

Quod non ita verum, si mulieri plethoricæ parcius mittatur sanguis, ita ut non fatiscant vasa, sed amissum præ distendente plethorâ tonum recuperent.

APHOR. XXXII. I. Morb. vj, II. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 84, l. 24; iv, c. 1; s. 2, p. 238, l. 10. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 374.

APHOR. XXXIII. Virgin. Morb. iij, 2. — Epid. j, sect. ij, 138, 139. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 84, l. 26. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 285; t. iv, p. 19, 373.

APHOR. XXXIV. II. Prædict. xxx, 14 ad 18. — Coac. iij, 416. — I. Morb. Mul. xxxvij, 5; xlj, 3, 6. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 411.

APHOR. XXXV. Aph. v, 49. — Prænot. xij, II. — Coac. iij, 175. — I. Morb. Mul. xcij, 1, 6, 7. — (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 48, l. 30. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 464.

Pectè legit hic Gorterius ὁπὸ ὀσπερῶν, secundis retentis: quod sensum magis verum efficit, et experienciâ comprobatum.

APHOR. XXXVI. Verat. Us. j, II, 60. — Natur. Mul. x, 3, 13.

Sicilicet interveni perspirationis et excrementorum sensibilibus ordinem, coctionesque vitari signum hoc indicat.

APHOR. XXXVII. Aph. v, 53. — II. Epid. j, 42. — I. Morb. Mul. xlv, 1, 2, 3. = (a Cels. ij, c. 1, pag. 92, l. 27. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 440.

Communio quæ mammas inter et uterum ita existit, ut; vigente uteri actione, floreat illæ, rursusque elanguente flaccescant, mille experimentis comprobata est; licet illa, quæ ante cognitum sanguinis motum afferebatur causa, arteriarum mammariarum cum uterinis anastomosis, nihil hîc conducat.

APHOR. XXXVIII. Aph. v, 48.

Credat Judæus Apëlla.

APHOR. XXXIX. II. Prædict. xxxv, 5. — (a Cels. ij, c. 1, pag. 92, l. 28. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 539.

APHOR. XL. II. Epid. vj, 61. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 77, l. 16. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 532; t. iv, p. 564.

Ad puerperas præcipuè, easque morbo acuto correptas pertinet hîc Aphorismus, et lochia sursum impetere per sanguinem rapta significat.

APHOR. XLI. Aph. v, 61. — Steril vj, 6, II. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 408.

APHOR. XLII. Steril. vij, 1.

APHOR. XLIII. Aph. v, 30. — I. Morb. iij, 9 — Natur. Mul. xij, 17, 27. — II. Morb. Mul. lvij, 12, 29.

APHOR. XLIV. Natur. Mul. xix, 1, 3. — II. Morb. Mul. lxij, 20. — Steril. j, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 444.

APHOR. XLV. Natur. Mul. xxxvij, 1 ad 5. — I. Morb. Mul. lxxiv, 1, 2, 3. = (1 I. Morb. Mul. xij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 445.

APHOR. XLVI. Aër. Aq. Loc. xij, 3. — II. Prædict. xxxij, 2. — Natur. Mul. xix, 4, 5, 7. — Steril. x, 7; xv, 11 ad 14. — Superfoet. xvij, 1. = (1 Superfoet. ix, 4. — Aristotel. de Gener. Animal. j, 18. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 257; t. iv, p. 445.

Non quod omenti moles in ipsum decumbat uterum, sed dum vicina premit et urget, ad ipsum usque uterum pertingunt ponderis, aliquando immensi, incommoda.

APHOR. XLVII. Natur. Mul. vj, 5. — I. Mor. Mul. xcj, 32. — II. Morb. Mul. xvix, 5. = (1 Natur. Mul. viij, 1. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 550.

Error hic maximi momenti in omnes serè versiones quasi consenuit. ἔμμετον γένεσθαι, sic notante Martiano, non aliter intelligi potest nisi *necesse est pus in cava effundi*: quo sensu ἔμμετοι apud Hippocratem dicuntur, qui pure intra viscera affuso colliquescent. Hunc sensum collaudavit Haën; aliter propositio nullum offert rationalem sensum. *Vide* Hipp. de artic. de morbis mulierum lib. 2, et quæ doctè conguessit in hunc locum exempla Cl. de Villebrune.

APHOR. XLVIII. Aph. v, 38. — II Prædict. xxiv, 10, 11. — II. Epid. vj, 32. — Superfæt. xvij, 10, 11, 12.

APHOR. XLIX. Aph. v, 35. — Coac. iij, 175. — Prænot. xij, 11. — II. Epid. v, 42, 43. — I. Morb. Mul. lxxvj, 6, 7; xcij, 1, 6, 7. — II. Morb. Mul. xliij, 6, 7. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 512.

APHOR. L. II. Epid. vj, 33. — II. Morb. Mul. j, 4; ij, 17. = (a Cels. ij, c. 2, s. 2, p. 101, l. 25; iv, c. s. 7, p. 273. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 620; t. iv, p. 539.

APHOR. LI. Aph. v, 54. — Octimest. iv, 5, 6, 7. — Superfæt. ij, 1, 2, 3; xix, 1. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 403.

APHOR. LII. II. Epid. vj, 35, 36. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 75, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 440, 539. *

APHOR. LIII. Aph. v, 37. — II. Epid. ij, 39 ad 42. — I. Morb. Mul. xlv, 1, 2, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 440.

APHOR. LIV. Aph. v, 51. — Natur. Mul. xxxj, 10. — II. Morb. Mul. xxij, 11; xlv, 11, 12; xlvj, 1, 2; xlvij, 1, xlix. 1, 2; l, 1, 3. = (1 Natur. Mul. xix, 9. = (2 I. Morb. Mul. xxiv, 2; lxviij, 5. — II. Morb. Mul. xvij, 24; l. 13. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 403.

APHOR. LV. Aph. v, 30, 43. — Coac. iij, 408. = (1 Aph. ij, 28. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 433.

APHOR. LVI. Aph. v, 3. — Coac. iij, 424. — II. Morb. Mul. xij, 7, 9. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 451.

APHOR. LVII. (1 Natur. xij, 5; xxxix, 1, 2, 5, 6; xl, 2, 5, 6. — I. Morb. Mul. xiv, 1, 12. — II. Morb. Mul. iij, v, vj, etc. = (2 De Genitur. vij, 8. — Natur. Puer. vj, 14; xij, 1. — Coac. Prænot. iij, 412, 413. — Virg. Morb. ij, 5 ad 14. — Natur. Mul. xvij, 1 ad 5. — I. Morb. Mul. iij, 1; x, 1 ad 5. — Superfoet. xxiv, 1. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 72, l. 11. — *Vide* van-Swieten, t. iv, 360.

APHOR. LVIII. (1 Fistul. ij, 1; iv, 1. = (2 Aph. vij, 13. — Int. Affect. xlj, 6. = *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 243; t. iij, p. 34, 172, 238; t. iv, p. 546.

Vicinia vasorum, imò et fibrarum communio pariunt hæc symptomata.

APHOR. LIX. Aph. v, 41. — Natur. Mul. vij, 9. — I. Morb. Mul. cvij, 1, etc. — II. Morb. Mul. xl, 20, 21. — Steril. vj, 3. — Superflet. ix, 3; x, 9, 11. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 368.

Fidem his derogat Anatome.

APHOR. LX. Natur. Puer. v, 3. — I. Morb. Mul. xl, 2, 5, 9, 11; xlv, 4, 5, 6; xcix, 2. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 439.

APHOR. LXI. Aph. v, 41. — I. Morb. Mul. xcix, 2. — Steril. vj, 9, 10. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 400.

APHOR. LXII. (1 Morb. Mul. xxvj, 27; xxvij, 5; xxxiv, 1. — (2 II. Prædict. xxvij, 2 ad 6.

APHOR. LXIII. (1 Aliment. iv, 1, 2, 5. = (2 Aliment. vj, 3, 4, 6, 7.

APHOR. LXIV. Ægin. xij, 7. = (1 Morb. Mul. lxxvij, 22. — (2 Aph. iv, 73. = (3 Int. Affect. iv, 23; xj, 26. = (4 II. Morb. Mul. viij.

21. (a Cels. iij, c. 2, s. 11, p. 198, l. 26. = (b Cels. iij, c. 2, s. 11, p. 198, l. 30. — Aræteus de Curat. Acut. 1, 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 196; t. iv, p. 40, 96.

Dum caput dolet, et in quavis febre, vel primariò, vel sympathicè patitur ventriculus: res evidentior est, si murmurent hypochondria, si plexum nervosorum abdominalium irritatio, costas melancholicè attollat. Hinc facilè degener lac corrumpitur, acescit. Laborat pariter ventriculus, si bilis copiosius erumpens coctioni deficiat; si febris omnes succos vitiet, si hæmorrhagia vires postraverit. Hæc absint signa, dulce gustu, dulce facultate lac acria involvit, vires reficit, nutrit optimè.

APHOR. LXV. II. Epid. iij, 129 ad 132. — (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 75, l. 8.

Firma ab Hippocratis ævo, ad nostrum usque, prognosim hanc demonstravit experientia, quam nulla assequi potest Recentiorum theoria. *Vide* de his præcipuè clarissimum Duretum nostrum in Coacas, cap. iv, p. 114 et seq.

APHOR. LXVI. II. Epid. iij, 128. = (a Cels. v, c. 2, s. 8, p. 341, l. 23. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 207.

218 NOTÆ IN SECTIONEM V.

APHOR. LXVII. Epid. iij, 128. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 207.

Laxi dicuntur tumores qui humore alluuntur ad partem affluenti, ex ordine naturæ, solutionemque facilem promittunt. Crudi sunt tumores qui, vel crethismo constricti, vel languentis circuitûs vi viteli destituti sunt.

APHOR. LXVIII. Loc. in Hom. xlix, 10. — II. Prædict. xxxvj, 5, 6. — VI. Epid. ij, 48. — Affection. ij, 10, 11. — Soran. Ephes. Isagog. e. xxj.

APHOR. LXIX. II. Epid. iij, 111. — VI. Epid. iij, 30 ad 35. = (1 Natur. Puer. xvij, 2, 3, 14; xvij, 1. — Lege hîc observationem D. de Villebrûnc.

APHOR. LXX. Aph. ij, 26. — I. Epid. iij, 17, 18. — VI. Epid. vj, 16; viij, 95, 96, 97. = (1. San. Tuend. ad Dem. 12. (2 Vid. Aph. iv, 57. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 3, 476; t. iij, p. 437.

APHOR. LXXI. VI. Epid. vj, 29.

APHOR. LXXII. Fateor rem mihi experientiâ non adeò veram videri; imò theoriæ repugnat, cùm debilissima sit in ictero coctio, nisi de eo intelligatur ictero in quo bilis exundat undequaque; aut particula 8' præpostere addita fuerit, ut vult Galenus in hunc Aphorismum.

Τμήμα ἕκτον.

α'. Εὐ τῇσι χρονίῃσι λειεντερίῃσιν ὄξυ-
ρεγμὴ ἐπιγιγνομένη, μὴ γενομένη πρότερον,
σημεῖον ἀγαθόν.

1. In diuturnis intestinorum lævita-
tibus ructus acidus superveniens, qui
prius non fuit, signum bonum.

1. Les renvois acides auxquels on n'étoit pas
sujet d'abord, sont d'un bon augure dans la
lienterie chronique.

β'. Οἷσι ῥῖνες ὑγρότεραι φύσει, καὶ ἡ γονή
ὕγροτέρη, ὑγιαίνουσι νοσηρότερον· οἷσι δὲ
τάναντία, ὑγιεινότερον.

2. Quibus nares naturâ humidiores,
et genitura humidior, imperfectiùs sani
sunt: quibus verò contraria, perfectiùs.

2. Ceux qui ont naturellement le nez très-
humide et le sperme fluide, jouissent d'une
santé plus foible; mais ceux qui sont d'une
constitution contraire, jouissent d'une santé
plus robuste.

γ'. Ἐν τῇσι μακρῇσι δυσεντερίῃσιν αἱ ἀποσιτίαι, κακόν· καὶ σὺν πυρετῷ, κάκιον.

3. In longis dysenteriiis appetitus prostratus, malum : et (a cum febre, pejus.

3. L'aversion pour les alimens est d'un mauvais augure dans la dysenterie chronique ; le mal est encore plus grand lorsqu'il y a fièvre.

δ'. Τὰ περιμαάθηρα ἔλκεια κακοήθεια.

4. Ulcera circum-glabra maligna.

4 Les ulcères dont les bords sont baignés par la sanie, sont de mauvais caractère.

ε'. Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρῇσι, καὶ ἐν στήθεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι (μέρεσιν) ἢν μέγα διαφέρωσι, καταμαθητέον.

5. Dolores et in lateribus, et in pectoribus, et in ceteris (partibus), si multum differant, considerandum.

5. Il faut étudier les douleurs qui ont leur siège dans le côté, dans la poitrine ou autre part, si elles diffèrent beaucoup entre elles.

ς'. Τὰ νεφριτικά, καὶ ὅσα κατὰ τὴν

κύσιν ἀλγήματα, ἰργαδῶς ὑγιάζεται τοῖσι
πρεσβύτησι.

6. Renum et vesicæ dolores difficul-
ter sanantur *in* senibus.

6. Les affections des reins et les douleurs de
vessie guérissent difficilement dans les vieil-
lards.

ζ'. Τὰ ἀλγήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην
γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κυφότερα· τα
δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.

7. Dolores qui in ventre fiunt, elati
quidem, leviores : non elati verò, ve-
hementiores.

7. Lors des douleurs du ventre, s'il y a élé-
vation, le mal est plus léger : au contraire,
s'il y a dépression, le mal est plus grave.

η'. Τοῖσιν ὕδραπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεια
ἐν τῷ σώματι, ἔρηθρας ὑγιάζεται.

8. Hydropicis ulcera in corpore orta
(α non facile sanantur.

8. Les ulcères qui surviennent aux hydro-
piques, ne guérissent pas aisément.

θ'. Τὰ πλατεῖα ἔξανθήματα ὁ πᾶν τι κνησμάδεα.

9. Efflorescentiæ latæ non admodum pruriginosæ.

9. Les pustules larges ne causent point de grandes démangeaisons.

ι'. Κεφαλὴν πονέοντι, καὶ περιωδυνέοντι, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ρυέν κατὰ τὰς ῥίνας, ἢ τὸ κατὰ στόμα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει τὸ νόσημα.

10. Caput (α laboranti, et circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

10. Lors des douleurs avec élancemens dans la tête ou aux environs, l'écoulement du pus, de l'eau ou du sang par le nez, par la bouche ou par les oreilles, guérit la maladie.

ια'. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφριτικοῖσι, αἰμορροΐδες ἐπιγιγνόμεναι, ἀγαθόν.

11. Melancholicis, et nephriticis, hæmorrhoides supervenientes, bonum.

11. Les hémorrhoides sont avantageuses, lorsqu'elles surviennent dans les affections des reins ou dans la mélancholie.

16'. Αἰμορροΐδας ἰηθέντι χρονίας, ἢν μὴ μία φυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ἐπιγενέσθαι, ἢ φθίσιν.

12. Ab hæmorroidibus sanato diuturnis, nisi una servata fuerit, periculum (a est ne hydrops superveniat, aut tabes.

12. Dans la cure radicale d'anciennes hémorrhoides, si l'on n'en conserve au moins une, il est à craindre qu'il ne survienne l'hydropisie ou la consomption.

17' Ὑπὸ λυγμῶ εἰχομένῳ πλερμῶ ἐπιγενόμενοι λύσσι τὸν λυγμόν.

13. A singulta detento sternuationes (a supervenientes solvunt singultum.

13. L'éternuement qui survient dans le hoquet le fait cesser.

18'. Ὑπὸ ὕδρωπος εἰχομένῳ, τῷ κατὰ

τὰς φλέδας εἰς τὴν κοιλίην ὕδατος ρυέντος, λύσις.

14. Ab hydropo detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio fit.

14. Quand dans l'hydropisie les eaux sont portées au moyen des veines dans les intestins, la guérison a lieu.

14. Ὑπὸ διάρροιας ἐχομένῳ μακρῇς, ἀπὸ ταυτομάτης ἔμετος ἐπιγενόμενος λύει διάρροϊαν.

15. A diuturno alvi profluvio detento, spontè superveniens vomitus, alvi profluvium solvit.

15. Dans les longues diarrhées, le vomissement spontané qui survient fait cesser la maladie.

15. Ὑπὸ πλευρίτιδος, ἢ ὑπὸ περιπνευμονίης ἐχομένῳ διάρροια ἐπιγενομένη, κακόν.

16. A pleuritide, aut à peripneumoniâ detento, alvi profluvium superveniens, malum.

16. Lorsque la diarrhée survient dans la pleurésie ou dans la péripneumonie, c'est un mauvais signe.

ιζ'. Ο'φθαλμιαῖωντα ὁπὸ διαρροΐης λευθεῖναι, ἀγαθόν.

17. Ophthalmiâ (α laborantem alvi profluvio corripī, bonum.

17. Il est avantageux d'être pris de la diarrhée, dans l'ophtalmie.

ιη'. Κύσιν διακοπέντι, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδίην, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίην, ἢ ἥπαρ, θανατῶδες.

18. Cui persecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale.

18. Les plaies qui pénètrent la vessie ou le cerveau, le cœur ou le diaphragme, l'intestin grêle ou l'estomac, ou le foie, sont mortelles.

ιθ'. Ε'πὴν διακοπῇ ὁστέον, ἢ χόνδρος, ἢ νεῦρον, ἢ γράσος λεπτὸν, ἢ ἀεροποσθίη, ὥστε ἄνυξεται, ὥστε ζυμφύεται.

19. Ubi dissectum fuerit os, aut cartilago, (1 aut nervus, (α aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coalescit.

19. Lorsqu'un os, un cartilage, un nerf, l'angle des lèvres, ou le prépuce, sont coupés, ces parties ne se régénèrent pas, et ne forment pas de réunion.

κ'. Ἡ ὃν ἐς τὴν κοιλίην αἷμα ἐκχυθῇ παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκπονηθῆναι.

20. Si in ventrem sanguis effusus (α fuerit præter naturam, necesse est suppurari.

20. S'il y a beaucoup de sang épanché dans le ventre ou dans quelque cavité, nécessairement il s'y convertit en pus.

κά. Τοῖσι μαινομένοισι, κιστῶν, ἢ αἰμορροΐδων ἐπιγενομένων, τῆς μανίης λύσις.

21. Insanientibus si varices, (α aut hæmorrhoides supervenerint, insanix solutio fit.

21. Lorsque des varices ou des hémorrhoides

surviennent dans la manie , la guérison a lieu.

κβ'. Οκόσα ῥήγματα ἐκ τῶ νώτε εἰς τὰς ἀγκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομή λύει.

22. Quæ ruptiones ex dorso ad cubitos descendunt, venæ sectio solvit.

22. Les douleurs qui se portent depuis le dos jusqu'aux coudes, guérissent par la saignée.

κγ'. Ἡ ἂν φόβος ἢ δυσθυμία πολὺν χρόνον διατελέῃ, μελαγχολικὸν τὸ τοιῷτον.

23. Si metus et (a tristitia multò tempore perseverent, melancholicum hoc ipsum.

23. La crainte et le découragement, s'ils durent long-temps, sont des symptômes d'atrabile.

κδ'. Ἐντέρων ἢ διακοπῇ τῶν λεπτῶν τι, ὁ ἔμφύεται.

24. Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

24. Si dans une portion de l'intestin grêle il y a plaie, ou solution de continuité, la réunion n'a point lieu.

κί. Ερύσιπελας ἔξωθεν μὲν εἴσω τρέπει-
θαι, ἐκ ἀγαθόν· ἔσωθεν δὲ ἔξω, ἀγαθόν.

25. Erysipelas foris quidem intrò
verti, non bonum : intùs verò foràs,
bonum.

25. Il n'est pas bon que l'érysipèle se porte
du dehors au dedans ; mais c'est un avantage
si la métastase se fait du dedans au dehors.

κς'. Οὐκόσοισιν αἱ ἐν τοῖσιν καύσοισι
τρομοὶ γένωνται, παρακοπὴ λύει.

26. Quibus in febre ardente tremo-
res (α fiunt, delirium solvit.

26. Les tremblemens ou soubresauts qui ont
lieu dans une fièvre ardente, se terminent par
le délire.

κς'. Οὐκόσοι ἔμπυοι, ἢ ὑδρωπικοὶ καίον-
ται, ἢ τέμνονται, ἐκρυέντος τῆ πύος, ἢ τῆ
ὑδατος ἀθρόου, πάντως ἀπόλλυνται.

27. Qui suppurati, (ι aut hydropici
(α uruntur, aut secantur, *hi* pure, aut
aquâ acervatim effluente, omninò mo-
riuntur.

27. Dans les suppurations internes ou les

hydropisies, lorsque, soit à l'aide de l'incision ou du caustique, on donne issue en grande quantité à l'eau ou au pus, la mort des malades est inévitable.

κή. Εὐνῆχοι ἔ ποδαγριῶσιν, ἔδὲ φαλακροὶ γίνονται.

28. Eunuchi (α non laborant podagrâ, (ι neque calvi fiunt.

28. Les eunuques ne sont point sujets à la goutte et ne deviennent point chauves.

κθ'. Γυνή ἔ ποδαγριᾷ, ἣν μὴ τὰ καταμήνια αὐτέῃ ἐκλίπη.

29. Mulier non (α laborat podagrâ, nisi menses (α ipsi defecerint.

29. Les femmes ne sont point attaquées de la goutte avant le temps de la cessation des menstrues.

λ'. Πᾶς ἔ ποδαγριᾷ, πρὸ τῆ ἀφροδισιασμῶ.

30. Puer (α non laborat podagrâ, ante Veneris usum.

30. La goutte ne vient point à l'enfant avant l'usage des plaisirs de Vénus.

λα'. Ο'δύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοπείη, ἡ
λατρὸν, ἡ πυρίη, ἡ φλεβοτομία, ἡ φαρμα-
κείη λύει.

31. Oculorum dolores meri potus,
aut balneum, (α aut fomentum, aut
venæ sectio, aut purgatio solvit.

31 On guérit les douleurs des yeux par
la boisson de vin pur, par les bains, par la
saignée, ou par la purgation.

λβ'. Τραυλοὶ ὑπὸ διάρροίης μάλιστα ἀλίσ-
κονται μακρῆς.

32. (1 Balbi ab alvi profluvio maximè
corripiuntur longo.

32. Les bègues sont surtout pris de longues
diarrhées.

λγ'. Ο'ι ὀξυρεγμιάδεις ἔ πάνυ τι πλευ-
ριτικοὶ γίνονται.

33. Acidum ructantes non admodum
pleuritici fiunt.

33. Ceux qui sont sujets aux renvois acides,

ne sont que très-rarement attaqués de la pleurésie.

λδ'. Ο'κόσοι φαλακροὶ , τετέοισι κισοὶ μεγάλοι ε' γίγνονται. ο'κόσοισι δ' ἂν φαλακροῖσιν ἔσσι κισοὶ ἐπιγένωνται , πάλιν ἔτοι γίγνονται δασέες.

34. Qui calvi sunt, his varices magni non fiunt. Quibus verò dum sunt calvi superveniunt varices, hi rursus capillati fiunt.

34. Ceux qui sont chauves ne sont pas sujets à avoir de grandes varices; et s'il leur en survient, les cheveux leur repoussent.

λε'. Τοῖσιν υδρωπικοῖσι βλῆξ ἐπιγενομένη , κακόν.

35. Hydropicis tussis (α superveniens, malum.

35. La toux qui survient dans l'hydropisie, est de mauvais augure.

λς'. Δυσσρίην φλιθοτομήν λύει· τάνυσιν δὲ τὰς εἴσω.

36. Urinæ difficultatem venæ sectio solvit : secundæ verò internæ.

36. La saignée guérit la difficulté d'uriner, mais il faut ouvrir les veines internes.

λζ'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἴδημα γενέσθαι ἐν τῷ τραχήλῳ, ἀγαθόν· ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νέσθημα.

37. Ab anginâ detento tumorem (α fieri in collo, bonum : foràs enim morbus vertitur.

37. C'est un bon signe dans la squinancie, si l'on remarque une tumeur au cou, car la maladie se porte à l'extérieur.

λη'. Οὐκ ὅσοισι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον· θεραπευόμενοι γὰρ ἀπόλλυνται ταχέως· μὴ θεραπευόμενοι δὲ πλείω χρόνον διατελῶσι.

38. (ι Quibus occulti cancri fiunt, eos non curare melius est. Curati enim citò pereunt. Non curati verò longius tempus perdurant.

38. Il vaut mieux ne pas toucher aux cancers

occultes , car les malades qui sont traités périssent promptement , au lieu que ceux qui ne font aucun remède vivent plus longtemps.

λθ'. Σπασμὸς γίνεται ἢ ὑπὸ πληρώσιος, ἢ κενώσιος. ἔτω δὲ καὶ λυγμός.

39. Convulsio fit, aut à repletione, aut ab evacuatione. Sic quidem etiam singultus.

39. La convulsion vient de réplétion, ou d'inanition ; il en est de même du hoquet.

μ'. Ο'κόσοισι περὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνοι γίνονται ἄτερ φλεγμονῆς, τετέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὸν πόνον.

40. Quibus ad hypochondrium dolores fiunt, absque (α inflammatione, his febris superveniens solvit dolorem.

40. Lorsqu'il survient de la douleur à l'hypochondre , sans inflammation , si la fièvre survient , elle dissipe la douleur.

μά. Ο'κόσοισι διάπυον τι ἐὼν ἐν τῷ σώματι μὴ διασημαίνει, τετέοισι διὰ παχυ-

τητα τῷ πύρι, ἢ τῷ τέλει, οὐκ ἀποσημαίνει.

41. Quibus suppuratum quid in corpore existens nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, signum non exhibet.

41. Lorsqu'il existe dans le corps quelque abcès intérieur, et que le pus ne donne aucuns signes de sa présence, cela provient de l'épaisseur de la matière, ou du lieu où elle est située.

μδ'. Ἐν τοῖσιν ἰκτερικῶσι τὸ ἥπαρ σκληρὸν γενέσθαι, ποιηρὸν.

42. In ictericis hepar (a durum fieri, malum.

42. Dans l'ictère, la dureté du foie est un mauvais signe.

μγ'. Οἰκίστοι σπληνάδεις ὑπὸ δυσεντερίης ἀλίσκονται, τετέοισιν, ἐπιγαστρίης μακρῆς τῆς δυσεντερίης, ὁρᾶται ἐπιγαστρίη, ἢ λειεντερία, καὶ ἀπόλλυται.

43. Qui lienosi à dysenteria a corripiuntur, (i his longa superveniente

dysenteria, hydrops supervenit, aut intestinorum lævitas, et pereunt.

43. Ceux qui ont des affections de la rate, et qui, dans cet état, sont attaqués de la dysenterie, si elle dure long-temps il survient l'hydropisie ou la lienterie, et les malades périssent.

μδ'. Οκόσοισιν ἐκ στραγγίτης εἰλεὸς ἐπιγίνεται, ἐν ἐπὶ ἡμέρητιν ἀπόλλυνται, ἢν μὴ πυρετῷ ἐπιγενομένῃ ἅλῃς τὸ ἔρον ῥυῇ.

44. Quibus ex (a urinæ stillicidio volvulus supervenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente urina abundè fluxerit.

44. Si le volvulus survient dans la strangurie, la mort a lieu en sept jours, à moins que la fièvre ne se déclare et qu'elle ne soit suivie d'un flux abondant d'urine.

μέ. Ἐλκεα ὁκόσα ἐνιαύσια γίνεται, ἢ μακρότερον χρόνον ἴσχουσιν, ἀνάγκη ὀσέον ἀφίστασθαι, καὶ τὰς ἐλὰς κοίλας γίνεσθαι.

45. Ulcera quæcumque annua fiunt,

aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, et cicatrices cavas fieri.

45. Les ulcères qui durent un an et plus, causent nécessairement la carie de l'os et des cicatrices profondes.

μς'. Οκόσοι υἱοὶ ἐξ ἁσματος, ἢ βηχὸς γίνονται πρὸ τῆς ἥδης, ἀπόλλυνται.

46. (1 Qui gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt ante pubertatem, pereunt.

46. Ceux que l'asthme ou la toux rend bossus avant la puberté, périssent en général.

μζ'. Οκόσοισι φλεβοτομία, ἢ φαρμακείη συμφέρει, τῆτέας προσῆκον τῷ ἥρος φλεβοτομεῖν, ἢ φαρμακευεῖν.

47. Quibus venæ sectio, aut purgatio conducit, his vere convenit venam secare, aut purgationem facere.

47. Ceux à qui la saignée ou la purgation est utile, doivent se faire saigner ou se purger au printemps.

μη'. Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερίᾳ ἐπιγενομένη, ἀγαθόν.

48. Lienosis dysenteria (α superveniens, bonum.

48. La dysenterie est avantageuse dans les affections de la rate.

μθ'. Ο πόσα ποδαγρικά νυσήματα γίνονται, ταῦτα ἀποφλεγμῆναι ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ἀποκαθίστανται.

49. Qui podagrici morbi fiunt, hi, sedatâ inflammatione, in quadraginta diebus decedunt.

49. Les attaques inflammatoires de goutte se dissipent par résolution, dans l'espace de quarante jours.

ν'. Ο κίσεισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος διακοπῇ, κατέσεισιν ἀνάγκη πυρετὸν, καὶ χολῆς ἔμετον ἐπιγιγνέσθαι.

50. Quibus percissum fuerit cerebrum (1, his necesse est febrem, et bilis vomitum supervenire.

50. Lorsque les plexes du cerveau sont pénétrantes, il survient nécessairement de la fièvre, et le vomissement de bile.

νά. Οἵ κ' ὅσοισιν ὑγιαίνουσιν ὁδύναί γίγνεται ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ παραχρῆμα ἄφωνοι γίνονται, καὶ ῥέγχεσιν, ἀπόλλυνται ἐν ἐπτά ἡμέρησιν, ἢν μὴ πυρετὸς ἐπιλαβῇ.

51. Quibus sanis dolores derepentē fiunt in capite, et statim muti fiunt, ac stertunt, in septem diebus pereunt, (i nisi febris apprehenderit.

51. Une forte céphalalgie qui survient tout à coup aux personnes en santé, et qui s'accompagne de la mutité, et d'une respiration stertoreuse, donne la mort en sept jours, à moins que la fièvre ne se déclare.

νβ'. Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσιαις τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν. ἢν γὰρ τι ὑποφαίνεται, ξυμβαλλομένων τῶν βλεφάρων, τῶ λευκῶ, μὴ ἐκ διαρροίης πονέοντι, ἢ ἐκ φαρμακοποσίης, φλαῦρον τὸ σημεῖον, καὶ θανατῶδες σφόδρα.

52. Considerare verò etiam oportet oculorum subtùs apparentia in somnis. Si enim albi quid (α, palpebris commissis, subtùs appareat, id quæ non ex

alvi profluvio sit, aut ex potione purgante, pravum signum, et valdè lethale.

52. Il faut considérer l'état des yeux pendant le sommeil ; car lorsque l'on aperçoit du blanc, les paupières étant rapprochées, si cela ne vient pas d'un flux de ventre ou d'un purgatif, ce signe est très-pernicieux, et même mortel.

γγ'. Αἱ παραφροσύναι, αἱ μὲν μετὰ γέλωτος γινόμεναι, ἀσφαλέσονται· αἱ δὲ μετὰ σπᾶδῆς, ἐπισφαλέσονται.

53. Deliria, cum (a risu quidē acci-
dentia, securiora : cum studio verò, pe-
riculosiora.

53. Les délires gais laissent plus d'espérance ; mais ceux qui fixent l'attention du malade, sont très-pernicieux.

γδ'. Ἐν τοῖσιν ὀξείσι πάθεσι τοῖσι μετὰ πυρετοῦ, αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαὶ, κακαί.

54. In acutis affectionibus quæ cum febre sunt, luctuosæ respirationes, malæ.

54. Dans les maladies aiguës avec fièvre, la respiration plaintive est un très-mauvais signe.

ιέ. Τὰ ποδαγρικὰ, τῷ ἥρος καὶ τῷ φθινοπώρῃ, κινέεται ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ.

55. Podagrici morbi, vere et autumno, moventur ut plurimum.

55. Les accès de goutte se renouvellent surtout en automne et dans le printemps.

νς'. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νστήμασιν ἐς τὰδε ἐπικίνδυνοι· αἱ ἀποσκήψεις, ἡ ἀποπληξίην τῷ σώματι, ἡ σπασμὸν, ἡ μανίην, ἡ τυφλωσιν σημαίνουσι.

56. (1 Morbis melancholicis ad hæc periculosi sunt humorum (2 decubitus, (3 aut corporis siderationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut cæcitatem significant.

56. Le déplacement de l'humeur mélancolique est toujours dangereux, parce qu'il présage ou l'apoplexie, ou les convulsions, ou la manie, ou la cécité.

νς'. Ἀπόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται,
ἐλικίη

ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων ἔχρῃς
ἐξήκοντα.

57. Apoplectici autem fiunt maximè ,
ætate ab anno quadragesimo usque ad
sexagesimum.

57. On devient sujet à l'apoplexie , surtout
depuis l'âge de quarante ans jusqu'à soixante.

νθ'. Η'ν ἐπίπλοον ἐκπέση, ἀνάγκη ἀπο-
σαπῆναι.

58. Si omentum exciderit, necesse
est putrefieri.

58. Si l'épiploon tombe au dehors, néces-
sairement la mortification s'en empare.

νθ'. Ο'κόσοισιν ὑπὸ ἰσχυράδου ἐνοχλεμέ-
νοισι χρονίης ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν
ἐμπίπτει, κατέοισι μύξαι ἐπιγίνονται.

59. Quibus à diuturno coxendicis
morbo vexatis coxa excidit. et rursus
incidit, his mucus innascitur.

59. Après plusieurs attaques de sciatique
chronique, lorsque la tête du fémur sort de

sa cavité et y rentre alternativement, il survient un amas de glaires.

ξ'. Ο πόσοισιν ὑπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλυμένοισι
 χρονίης τὸ ἰσχίον ἐξίσταται, τετείοισι τήκεται
 τὸ σκέλος, καὶ χωλῶνται, ἢν μὴ καυθῶσιν.

60. (1 Quibus a diuturno coxendicis morbo vexatis coxa (α excidit, his crus labescit, (2 et claudicant, (3 nisi usti fuerint.

60. Lorsqu'à la suite de longues attaques de goutte sciatique, la tête du fémur reste hors de sa cavité, la jambe se dessèche, et la claudication a lieu, à moins qu'on ne cautérise.

NOTAE

IN

SECTIONEM SEXTAM.

APHOR. I. II. Epid. ij, 49, 50, 51. — I Morb. vj, 10. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 116; t. ij, p. 341.

Signum est scilicet restitutæ incipientis quantumvis leviter coctionis. Aliter rem intelligit Russel œconomiâ Naturæ in Glandul., p. 125.

APHOR. II. IV. Epid. vj, 37. — *Vide* Boerhaav. de Morbis fibræ debilis et laxæ, et Commentaria van-Swieten in § 24 et sequentes.

APHOR. III. VI. Epid. viij, 1. — Coac. vj, 100. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, pag. 83, l. 26.

APHOR. IV. VI. Epid. viij, 2. = (a Cels. v, c. 2, s. 11, p. 346, l. 28.

Cum scilicet circa ulceris limbos nulla inflammatio vasa in tumorem attollit, illaque ulceri suppuranti non favet; licet illud sit naturæ actuosæ votum.

APHOR. V. II. Prædict. xvij, 4; xix, 6, 7; xx, 4. — VI. Epid. vij, 83. — Vict. Acut. lij, 1, 2, 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 75.

APHOR. VI. VI. Epid. vij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 222.

Solida atona in senibus indurnere; liquida minus cocta sunt; perspiratio minor; vesica ex rei necessitate iners et corrugata.

APHOR. VII. Ili. dum intestina distendunt, flatus et humores ad exitum promptos indicant, illi fixum in membranis, aut glandulis aere irritans ostendunt; exemplo sit colicus pectorum dolor.

APHOR. VIII. (a Cles. iij, c. 2, s. 10, p. 188, l. 15. — *Vide* van-Swieten, t. j, 209.

Frustrâ ab humorum compage solutâ penitês et perversâ pus bonum speraremus. Quod tamen ad medelam ulcerum necessarium est!

APHOR. IX. VI. Epid. ij, 52. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 360.

APHOR. X. Judicat. xij, 3 — Coac. ij, 25,

26, 27, 59. — Sal. Diæt. xiv, 4. — VII. Epid. xxx, 6, 16. — II. Morb. iv, 18; xij, 1 ad 7; xvj, 10. — III. Morb. ij, 6, 7, 8. — (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 13. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 411; t. iij, p. 308.

APHOR. XI. Aph. vj, 21. — Humor. xj, 1. — Judicat. x, 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 787; t. iij, p. 233.

APHOR. XII. Humor. xj, 3. — IV. xxvj, 1, 2. — V. Epid. x, 18 ad 21. Epid. — VI. Epid. iij, 65. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 19.

APHOR. XIII. Prænot. xij, 11. — Coac. iij, 275. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, pag. 85, l. 25. — Van-Swieten, t. ij, p. 243; t. iv, p. 465.

APHOR. XIV. Aph. vij, 29. — Flat. xvij, 8, 9. — Judicat. xj, 20. — Coac. iij, 285, 289. — I. Morb. vj, 7. — II. Morb. lxi, 11, 12. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 338, 347; t. iv, p. 165.

APHOR. XV. II. Diæt. xxvj, 15, 16. — Loc. in Hom. xlv, 8. — Coac. iij, 7. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 23. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 354.

Non tam impete vomitûs facto vacuatur morbi semes, quàm minuitur et invertitur

motus peristalticus celerrimè deorsum vergens.

APHOR. XVI. Aph. v, 12, 14. — Loc. in Hom. xxix, 15, 16, 17. — I. Morb. vj, 5; x, 41. — III. Morb. xvij, 59. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 86, l. 22. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 345, 671.

Putridam enim testatur morbi indolem profusus et symptomaticus alvi fluxus. Tenuiora, diluentia, à parte inflammata avertit. Vires morbo ferendo reddit impares.

APHOR. XVII. Judicat. xij, 9. — Coac. ij, 130, 133. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 84, l. 14. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 345, 350.

APHOR. XVIII. Aph. vj, 24. — II. Prædict. xix, 2 ad 6, 11, 12; xxij, 1. — Coac. iij, 387, 388, 389. — I. Morb. iij, 4; vij, 21. = (a Cels. v, c. 2, s. 1, p. 327, l. 28. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 478.

Docet contrarium experientia, laterali calculi operatione.

APHOR. XIX. Aph. vij, 28. — Coac. iij, 380 ad 382. — II. Prædict. xxiv, 1. — I. Morb. iij, 32, 33; vij, 21. = (a Cels. ij, c. 2, s. 1, p. 99, l. 16. = (b Cels. v, c. 2, s. 5, p. 336, l. 30. — Aristotel. histor. Animal. 13. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 513.

Meliora docuit recentiorum observatio.

APHOR. XX. Aph. vij, 38. — I. Morb. iij, 37; x, 42 ad 48; xij, 4; xv, 4. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 76, l. 4. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 255, 438; t. iij, p. 665.

Non suppuratione verâ, sed corruptelâ degener fit, si non resorbeatur sanguis.

APHOR. XXI. Aph. vii, 5. — Humor xj, 1. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 84, l. 15. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 304, 553, 554; t. iij, p. 284, 510.

APHOR. XXII. II. (a Cels. ij, c. 2, s. 1, p. 99, l. 1.

Nomine τῆ βήματος Antiqui causas intellexere quæ fibras divellunt, aut distrahunt. Galenus credidit legendum ἀλγήματα.

APHOR. XXIII. Aph. vij, 40. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 75, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 467.

APHOR. XXIV. Aph. vj, 18, 19. — II. Prædict. xix, 4. — Coac. iij, 379, 387. — I. Morb. vij, 21. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 478, 482.

Contrarium docuit sera Recentiorum experientia.

APHOR. XXV. Aph. vj, 37. — Prænot. vij, 3; xxij, 9. — Coac. iij, 103. — I. Morb. vj, 8, 9. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 73, 369.

APHOR. XXVI. Judicat. xj, 10. — Coac. j, 185. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 411.

Vel malo omine solvit levius malum noxa gravior, vel delirium febrile tollit convulsivos tremores; vel dum instantem præsentit hæmorrhagiam signum proximius, remotiora sanat.

APHOR. XXVII. Aph. ij, 51; vij, 44. — Coac. iij, 91, 92. — II. Morb. xlv, 24 ad 28. — III. xxvij, 2, 8, 14. — Int. Affect. iv, 30; x, 20 ad 23; xxv, 33 ad 36; xxvij, 5. — (I VI. Epid. vij, 62. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 87, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 463, 655; t. iij, p. 680; t. iv, p. 120, 209.

APHOR. XXVIII. (I Natur. Puer. xvij, 4, 5, 6; xix, 1. = (a Cels. iv, c. 1, s. 8, p. 277, l. 8. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 255.

APHOR. XXIX. V. Epid. xxvij, 5, 6. --- VI. Epid. viij, 98 ad 106. --- VII. Epid. xlix, 12. --- I. Morb. Mul. xij, 6, 13. = (a Senec. Ep. xcv. : (a Cels. iv, c. 1, s. 8, p. 277, l. 9. --- *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 254.

APHOR. XXX. Coac. iij, 395. = (a Cels. iv,

c. 1, s. 8, p. 277, l. 8. --- *Vide* Russel, œconom. Naturæ in Glandul. --- *Vide* van-Swieten, t. iv, pag. 254.

APHOR. XXXI. Aph. vij, 46. --- II. Epid. vj, 26. --- (a Cels. vj, c. 3, s. 1, p. 9, l. 6.

Prout à causis contrariis possunt oriri. Lege hic notas Cl. de Villebrune.

APHOR. XXXII. (1 Præcept. xij, 1 ad 5. --- Coac. ij, 147. --- Verat. us. j, 12. --- *Vide* Commentatores in hunc Aphorismum non satis experientiæ consonum.

APHOR. XXXIII. *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 13.

APHOR. XXXIV. II. Epid. v, 40. --- *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 553.

APHOR. XXXV. Aph. vij, 47. --- II. Prædict. xj, 1, 16. --- II. Epid. v, 28. --- (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 86, l. 16. --- *Vide* Galenum in hunc Aphorismum. *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 177.

APHOR. XXXVI. Aph. vij, 48.

De delectu venarum multi scripsère, pauci consentiunt.

APHOR. XXXVII. Aph. vij, 49. = (a Cels.

iv, c. 1, s. 2, p. 230, l. 25. = (b Cels. iv, c. 1, s. 2, p. 230, l. 20.

APHOR. XXXVIII. (1 II. Prædict. xvij, 5, 9; xxj, 5. --- II. Morb. Mul. xxij, 25. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 795, 802, 821, 828.

APHOR. XXXIX. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 342; t. ij, p. 242, 320; t. iij, p. 441.

Quod plenitudinem spectat, veteres ad eam retulère, sub fluxionis nomine, varia irritationis genera, ut eos accuratè legenti satis patebit.

APHOR. XL. Aph. iv, 73; vij, 52. --- Coac. iij, 272. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 6. --- (b Cels. iij, c. 2, s. 6, p. 165, l. 1.

Scilicet à stagnantibus orta humoribus circa hypochondria gravitas, et natus ab infarctu dolor, novâ vi motûs circularis per febrem additâ, solvuntur.

APHOR. XLI. Coac. ij, 238, 239. --- II. Morb. xlv, 14. --- III. Morb. xxvij, 1. --- *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 667.

APHOR. XLII. Aph. iv, 64. --- Coac. ij, 223, 225 ad 229. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 90, l. 29. --- *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 139.

APHOR. XLIII. Aph. vj, 48; vij, 76. ---

Coac. iij, 295, 296. = (1 I. Morb. iij, 27. = (2 Coac. iij, 275. --- Affect. xxj, 23; xxiiij, 3; xxviiij, 1. --- (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 91, l. 1. --- *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 155.

Rupta esse vasa lienis, ipsumque corruptum dysenteria talis indicat. Alioquin Aph. 48, bona dicitur, si ex naturæ vi enata, motu vasis addito, infarctum lienis tollere sit idonea.

APHOR. XLIV. Judicat. xij, 2. --- Coac. iij, 314; v, 75, 87. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 9. --- (b Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 91, l. 6. --- *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 230.

APHOR. XLV. Fractur. xxxvj, 2. = (1 Ulcer. v, 4. --- *Vide* van-Swieten, t. j, p. 311, 875.

APHOR. XLVI. (1 Articul. xxxvij, 1, 4, 5, 6; xxxviiij, 4, 5. --- Vectiar, xxj, 6. --- *Vide* Ballonium. Cons. 51, p. 204.

APHOR. XLVII. Aph. vij, 53:

Vere rarescunt humores, motus intenditur, liquescunt spissiora, canalibus libertas inducitur.

APHOR. XLVIII. Aph. vj, 43. --- Coac. iij, 295. --- I. Morb. vj, 7. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 3. --- *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 140, 155.

APHOR. XLIX. Judicat. vj, 3. = (a Cels. iv, c. 1, s. 8, p. 280, l. 3. --- *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 280.

APHOR. L. II. Prædict. xxij, 12, 16; xxij, 5 ad 11. --- Coac. iij, 371, 383, 384. --- III. Morb. j, 3, 9. = (a Cels. v, c. 2, s. 3, p. 331, l. 22. --- *Vide* van-Swieten, t. j, p. 395.

Hoc et in capitis vulneribus, aut commotionibus experientia declarat.

APHOR. LI. Judicat. xij, 4, 5, 6. --- Coac. ij, 6; iij, 320 ad 323. --- II. Morb. vj, 1, 2, 3, 4, 7; xij, 2 ad 12. --- III. Morb. viij, 2, 3. = (1 I. Prædic. x, 13; xij, 8. = (a Cels. ij, c. 2, s. 7, p. 88, l. 4.

APHOR. LII. Prænot. iij, 1. --- I. Prædict. xj, 2. --- Coac. ij, 124. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 66, l. 2. --- (b Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 88, l. 8.

APHOR. LIII. Coac. j, 141. = (a Cels. iij, c. 2, s. 7, p. 181; l. 14. --- *Vide* vanSwieten, t. ij, p. 294, 549.

APHOR. LIV. Oppressum scilicet thoracem, languentem, aut impeditum per vasa pulmonalia sanguinis circuitum arguunt luctuosa suspiria. --- *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 391.

APHOR. LV. Aph. iij, 20. = (a Cels iij, præf., p. 51, l. 29; iv, c. 1, s. 7, p. 277, l. 26. *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 253.

APHOR. LVI. (I Aph. vij, 40. = (2 Vict. Acut. xlv, 3. --- II. Prædict. xij, 3. = (3 Coac. iij, 316, 317. --- *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 275, 481, 496, 507.

APHOR. LVII. Aph. iij, 31. --- *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 276, 496.

APHOR. LVIII. Coac. iij, 378. --- I. Morb. iij, 36.

Distinctionem adhibe ex van-Swieten, t. j, p. 484.

APHOR. LIX. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 335, 550; t. v, p. 618, 630.

APHOR. LX. (I Glandul. x, 6, 7, 8. = (2 I. Morb. iij, 16. --- Int. Affect. lvij, 2. = (3 Aër. Ag. Loc. xlvij, 5. --- Affect. xxx, 12. = (a Cels. iv, c. 1, s. 7, p. 276, l. 9. --- *Vide* van-Swieten, t. j, p. 335; t. v, p. 630.

De capsulæ ligamentosæ infarctu et tumore indè exorto res intelligenda est.

Τμήμα ἐβδόμον.

α'. Ἐν τοῖσιν ὀξείσι νασήμασι ψύξις ἀκρωτηρίων, κακόν.

1. In morbis acutis (α extremarum partium frigus, malum.

1. Dans les maladies aiguës, le refroidissement des extrémités est un très-mauvais signe.

β'. Ἐπὶ ὀστέῳ νοσέοντι σάρξ πελιδνή, κακόν.

2. Ex osse ægrotante caro livida, malum.

2. Des chairs livides sur un os malade, c'est un mauvais signe.

γ'. Ἐπὶ ἐμέτῳ λύγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ, κακόν.

3. A vomitu singultus (α , et oculi rubri, malum.

3. Lorsque le hoquet et la rougeur des yeux succèdent au vomissement, c'est un signe mortel.

δ'. Ε'πὶ ἰδρῶτι φρίκη, ε' χρηστόν.

4. A sudore (a horror, non bonum.

4. C'est un mauvais signe, si la sueur est suivie d'horripilation.

ε'. Ε'πὶ μανίῃ δυσεντερίῃ, ἢ ὕδρωψ, ἢ ἔκτασις, ἀγαθόν.

5. Ab insaniâ dysenteria, aut hydrops, aut exstasis, bonum.

5. La dysenterie, ou l'hydropisie, ou une émotion de l'âme, sont avantageuses dans la manie.

ς'. Ε'πὶ νύσῳ πολυχρονίῃ, ἀποσιτίῃ, καὶ ἀκρήτοι ὑποχωρήσεις, κακόν.

6. In morbo diuturno appetitus prostratus, (a (i et meracæ (b dejectiones, malum.

6. L'aversion du manger dans les maladies longues, et les évacuations de bile pure, sont de mauvais augure.

ζ'. Ε'κ πολυποσίης ῥίγος καὶ παραφροσύνη, κακόν.

7. A multo potu rigor, et delirium, malum.

7. Le rigor et le délire qui surviennent après un excès de boisson, sont des signes funestes.

ή. Α'πὸ φύματος εἶσω ῥήξιος ἔκλυσις, ἔμετος, καὶ λειποψυχία γίνεται.

8. A tumoris intus ruptione, exsolutio, vomitus, et animi deliquium fit.

8. La rupture d'un abcès intérieur est suivie de l'exsolation, du vomissement et de la perte de connoissance.

θ'. Α'πὸ αἵματος ῥύσει παραφροσύνη, ἢ καὶ σπασμὸς, κακόν.

9. A sanguinis fluxu (α delirium, aut etiam convulsio, malum.

9. Dans une hémorrhagie, le délire ou la convulsion annonce un très-grand danger.

ι. Ε'πὶ εἰλαφῇ ἔμετος, ἢ λόγξ, ἢ σπασμὸς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

10. Ab ilco vomitus, aut (α singultus, aut convulsio, aut delirium, malum.

10. C'est un mauvais signe lorsque le vomissement ou le hoquet, la convulsion ou le délire, se déclarent dans le volvulus.

14. Εἰς πνευρίτιδι περιπνευμονίη, κακόν.

11. A pleuritide (α peripneumonia, malum.

11. C'est un mauvais signe si la péri-pneumonie se joint à la pleurésie.

15. Εἰς περιπνευμονίη φρενίτις, κακόν.

12. A peripneumoniâ phrenitis, malum,

12. La phrénésie qui survient dans la péri-pneumonie est mortelle.

17. Εἰς καύκασιν ἰσχυροῖσι σπασμοῖς, ἢ τέτανος, κακόν.

13. Ab ardoribus vehementibus (α convulsio, aut tetanus, malum.

13. Dans une ardeur excessive ou fièvre ardente, la convulsion ou le tétauos est un très-mauvais signe.

13. Ἐπὶ πληγῇ εἰς τὴν κεφαλὴν ἴκ-
πληξίς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

14. A plagâ (α in caput, stupor, aut
delirium, malum.

14. Dans une plaie de tête, la stupeur ou le
délire est un signe dangereux.

14. Ἐπὶ αἵματος πύσει πύε πύσις,
κακόν.

15. A sanguinis sputo, puris sputum,
malum.

15. Il y a à craindre, si le crachement de
sang est suivi du crachement de pus.

15. Ἐπὶ πύε πύσει φέσις καὶ ῥύσις,
κακόν. ἢ πῶν εἰς τὸ πύειλον ἴσχηται, ἀπο-
θνήσκουσιν.

16. (1 A puris sputo, tabes, et flu-
xus, malum. (2 Postquam verò sputum
(α retinetur, moriuntur.

16. Si le crachement de pus est suivi de la
phthisie et de la diarrhée, c'est un très-mau-
vais signe ; et si les crachats s'arrêtent, la mort
survient.

ιζ'. Ε'πὶ φλεγμονῇ τῆς ἥπατος λὺγξ, κακόν.

17. Ab hepatis inflammatione (α singultus, malum.

17. Le hoquet dans l'inflammation du foie, est un signe dangereux.

* Ε'πὶ ληθαργῶ τρόμος, κακόν.

* A lethargo tremor, malum.

* Le tremblement dans la léthargie, est un signe mortel.

ιη'. Ε'πὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

18. A vigiliâ convulsio, aut delirium, malum.

18. La convulsion ou le délire, à la suite d'insomnies, est un signe funeste.

ιθ'. Ε'πὶ ὁστὲς ψιλώσῃ ἐρυσίπελας (κακόν.)

19. Ab ossis denudatione erysipelas, malum.)

19. L'érysipèle, lorsqu'il y a dénudation de l'os, est un mauvais signe.

κ'. Ἐπὶ ἐρυσιπέλατι σηπιδῶν, ἢ ἐκπύησις (κακόν.)

20. Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, (malum.)

20. C'est un mal très-grave, lorsque l'érysipèle est accompagné de putridité ou de suppuration.

κα'. Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖσιν ἔλκεσιν αἰμορραγία, (κακόν.)

21. A forti pulsu in ulceribus, sanguinis (a eruptio, (malum.)

21. Dans les ulcères, l'hémorrhagie, qui est la suite de violentes pulsations, est d'un présage funeste.

κσ'. Ἐπὶ ὀδύνη πολυχροίῃ τῶν περὶ τὴν κοιλίην, ἐκπύησις, (κακόν.)

22. A dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio, (malum.)

22. La suppuration après une douleur ancienne du ventre, est mortelle.

κγ'. Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει δυσεντερία, (κακόν.)

23. A meracâ dejectione (α dysenteria, (malum.)

23. C'est un mauvais signe lorsque la dysenterie succède à des déjections de bile pure.

κδ'. Ἐπὶ ὅσῃς διακοπῇ (ἐκπληξίς ἢ) παραφροσύνη, ἣν κενεὸν λάβῃ (θανατῶδες.)

24. Ab osse perscisso stupor aut delirium, si in vacuum penetraverit, lethale.

24. Dans la diacope du crâne, la stupeur ou le délire, si la blessure est pénétrante, est un signe mortel.

κε'. Ἐκ φαρμακοποσίας σπασμὸς, θανατῶδες.

25. A purgantis potione convulsio, lethale.

25. La convulsion après un purgatif, est mortelle.

κς'. Ἐπὶ ὀδύνῃ ἰσχυρῇ τῶν περὶ τῆς κοιλίης ἀκρατηρίων ψύξις, κακόν.

26. Α (1 dolore vehementi partium circa ventrem, extremarum (α frigus, malum.

26. Le froid des extrémités, dans les fortes douleurs de ventre, annonce du danger.

αζ'. Γυναὶκὶ ἐν γαστρὶ ἔχσῃ τένεσμός ἐπιγενόμενος, ἐκτρώται ποίεσι

27. Mulieri in utero gerenti, tenemus superveniens, abortire facit.

27. Le ténésme qui survient à une femme enceinte, fait naître la fausse couche (*).

κκ'. Ὅ, τι ἂν ὀστέον, ἢ χόνδρος, ἢ νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, ὥστε αὐξεται, ὥστε ἑνωμεύεται.

28. Quodcunque os, aut cartilago, aut nervus in corpore dissectus fuerit, neque augetur, neque coalescit.

28. Lorsqu'un os, un cartilage, un nerf, on

(*) Cet aphorisme appartient à la section v, n°. 49, dans les manuscrits; il est répété ici comme beaucoup d'autres.

un tendon , sont coupés , ces parties ne se régénèrent pas et ne forment point de réunion

κθ'. Η'ν ὑπὸ λευκῷ φλέγματος ἐχομένην διάρροια ἐπιγίνεται ἰσχυρὴ, λύει τὴν νῆτον.

29. Si à leucophlegmatiâ detento veniens diarrhœa (a superveniat, morbum solvit.

29. Si une forte diarrhée survient dans la leucophlegmatie, elle guérit la maladie.

λ'. Ο'κότοισιν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν τῇπι διάρροίῃτι, τετίοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα καταρρέει.

30. Quibus spumosa excretiones in alvi profluvio, (i his de capite pituita defluit.

30. Lorsque dans la diarrhée, on rend des selles spumeuses, cela est occasionné par la pituite qui descend de la tête.

λα'. Ο'κόσισι πυρέσσουσιν ἐν τοῖσιν ἔργοις κριμῶδες αἱ ὑποστάσεις γίνονται, μακρὴν τὴν ἀρρώστιν σημαίνει.

31. Quibus febricitantibus, (i in uri-

nis subsidentiae fiunt crassiori farinae similes, longam infirmitatem significat.

31. Lorsque dans les fièvres les urines déposent une matière semblable à une farine grossière, c'est un signe que la maladie sera longue.

λβ'. Οπόσοισι δὲ χολώδεις αἱ ὑποσάσιες, αἰωθεὶν δὲ λεπταί, ὀξείην ἀρρώσιν σημαίνει.

32. Quibus autem biliosæ (α subsidentiae, ab initio verò tenues, acutum morbum significat.

32. Les urines qui dès le principe forment un dépôt bilieux, indiquent que la maladie est aiguë.

λγ'. Οπόσοισι δὲ διετηκίτα τὰ ὕρα γίνεται, τετέοισι παραχὴ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματι ἔστιν.

33. Quibus autem urinæ (ι divulsæ sunt, iis vehemens est in corpore turbatio.

33. Si les urines varient, il se passe un violent trouble dans le corps.

λδ'. Οκόσοισι δὲ ἐπὶ τοῖσιν ὕροισιν ἐφίστανται πομφόλυγες, νεφριτικὰ σημαίνουσι, καὶ μακρὴν τὴν ἀρρώστιν ἑσέειναι.

34. Quibus verò, in urinis bullæ superstant, (α renum affectiones significant, et longam fore invaletudinem.

34. Les urines à la surface desquelles il nage des bulles, dénotent une affection des reins, et de plus, que la maladie sera longue.

λε'. Οκόσοισι δὲ λιπαρὴ ἢ ἐπίσασις καὶ ἀρόη, νεφριτικὰ καὶ ὀξεία σημαίνει.

35. Quibus autem pingue est et confertum quod supernatat, his affectiones nephriticas, et acutas significat.

35. Lorsque les urines se couvrent d'une couche grasse, épaisse, elles indiquent une affection des reins, et que la maladie est aiguë.

λς'. Οκόσοισι δὲ, νεφριτικοῖσιν ἔχουσιν, τὰ προειρημένα ἑμφανίζει σημεῖα, πόνοι τε περὶ τὰς μύας τὰς ῥαχιαίας γίνονται, ἢ

μὲν περὶ τὰς ἑξῶ τόπῳ γίνονται, ἀπόστημα
προσδέχῃ ἐσόμενον ἑξῶ· ἢν δὲ μᾶλλον οἱ
πόνοι πρὸς τὰς εἰσῶ τόπῳ γίνονται, καὶ τὸ
ἀπόστημα προσδέχου ἐσόμενον μᾶλλον εἰσῶ.

36. Quibus verò , nephriticis exis-
tentibus, prædicta signa accidunt, et
dolores circa musculos spinales fiunt ,
si quidem ad loca exteriora fiunt, abs-
cessum exspecta futurum extrorsum. Si
verò dolores fiant magis ad interna
loca, etiam abscessum magis introrsum
fore exspecta.

36. Lorsqu'il y a maladie des reins, indi-
quée par les signes précités, si des douleurs
se déclarent vers les muscles de la colonne
épineière, et qu'elles se dirigent plutôt extérieu-
rement, attendez-vous que l'abcès sera plutôt
externe; mais si les douleurs se font ressentir
davantage vers les parties intérieures, l'abcès
sera plutôt interne.

λζ'. Οἰκόσοι αἷμα ἐρέεσιν, ἢν μὲν ἄνεσ
πυρετῶ, σωτήριον· εἰ δὲ ζὺν πυρετῶ, κα-
χόν. Θεραπεύειν δὲ τοῖσι ψυχτικοῖσι, καὶ
τοῖσι συπλητικοῖσι.

37. Qui sanguinem (*a* vomunt, si quidem sine febre, salutare : si verò cum (*b* febre, malum. Curandum autem refrigerantibus, et astringentibus.

37. Le vomissement de sang, lorsqu'il est sans fièvre, peut être salutaire ; mais avec de la fièvre, il est très-pernicieux. Il faut alors y remédier par les rafraîchissans et les astringens.

* Τριταῖος ἀκριβὲς κρίνεται ἐν ἐπὶὰ περιόδοις τὸ μακρότατον.

* Tertiana exquisita in septem ad summum circuitibus judicatur.

* La fièvre tierce vraie, est jugée en sept accès au plus.

* Τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

* Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

* Les maladies aiguës sont jugées en quatorze jours.

ἰή. Κατάλοι ἐς τὴν ἄνα κοιλίην ἐκπύονται ἐν ἡμέρητιν εἴκοσιν.

38. Destillationes in ventrem supernum, in viginti diebus coquantur.

38. Les catarrhes ou *fluxions d'humeurs acres* sur le ventre supérieur ou la *poitrine*, se terminent par coction, dans vingt jours.

λθ'. Ηὐν ἐρέη αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ τραγχερίην ἔχη, καὶ ὀδύνη ἐμπύπῃ ἐς τὸ περίναιον καὶ τὸ ὑπογάστριον, καὶ τὸν κτένα, τὰ περὶ τὴν κύσιν νοσέειν σημαίνει.

39. Si quis sanguinem et grumos mingat, et stranguriam habeat, et dolor incidat ad perinæum, et inum ventrem, et pectinem, *partes* circa vesicam laborare significat.

39. Si l'on rend par l'urèthre du sang pur et des grumeaux, et si l'on urine goutte à goutte, et que l'on ait de la douleur à l'hypogastre, au pubis et au périnée, c'est signe de maladie à la vessie.

μ'. Ηὐν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρατὴς γίνηται, ἢ ἀποπληκτόν τι τῷ σώματι, μελαγχολικὸν τὸ τοῖστο γίγνεται.

40. Si lingua ex improvise impotens

fiat, aut aliqua corporis pars siderata,
(i melancholicum hoc ipsum fit.

40. Si la langue devient tout à coup immo-
bile, ou si quelque partie du corps tombe en
paralysie, cela est occasionné par l'atrabile.

μá. Η'ν ὑπερκαθαρισμένων τῶν πρεσβυ-
τέρων, λόγῳ ἐπιγίνεται, ἐκ ἀγαθόν.

41. Si senioribus nimiùm purgatis,
singultus superveniat, non bonum.

41. Si un vieillard est pris du hocquet, à
la suite d'une purgation excessive, cela n'est
pas d'un bon augure.

μῆ. Η'ν πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχη,
ὕδατος πολλῷ καὶ θερμῷ καταχεομένης κατὰ
τῆς κεφαλῆς, λύσις τῷ πυρετῷ γίνεται.

42. Si febris, quæ non est à bile, de-
tineat, (a aquà multà, et calidà in ca-
put affusà, febris solutio fit.

42. Si la fièvre n'est point occasionnée par la
bile, des douces d'eau chaude sur la tête
font cesser la fièvre.

μγ. Γυνή ἀμφιδέξιός ε' γίνεται.

43. Mulier ambidextra non fit.

43. La femme ne devient point ambidextre.

μδ'. Οἷόσοι ἔμπροσθι καίονται, ἢ τέμνονται, ἢ μὲν τὸ πύον καθαρὸν μὲν καὶ λευκὸν, περιγίγνονται. ἢ δὲ ὑφαίμιον, καὶ βερρῶδες, καὶ ὀυσῶδες, ἀπόλλυται.

44. Qui suppurati uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus et album. evadunt: (si verò subcruentum, et caenosum, ac graveolens, pereunt.

44. Après l'ouverture d'un abcès interne, soit par l'incision, soit par le caustique, lorsqu'il sort un pus blanc et sans mélange, les malades guérissent; mais si le pus est sanguinolent, boueux et fétide, les malades meurent.

μέ. Οἷόσοι τὸ ἥπαρ διάπυον καίεται (ἢ τέμνεται) ἢ μὲν τὸ πύον καθαρὸν μὲν καὶ λευκὸν, περιγίγνονται. ἢ χιτῶνι γὰρ τὸ πύον χιτῶσις ἐστίν· ἢ δὲ οἷον ἀμάργη μὲν, ἀπόλλυται.

45. Qui a /hepar/a suppuratum uruntur (aut secantur) si quidem purum

effluat pus et album, superstites evadunt : ipsis enim pus est in tunica : (1 si verò effluat velut (b amurca, pereunt.

45. Lorsqu'on a fait l'ouverture d'un abcès au foie, soit par l'incision, soit par le caustique, si le pus qui sort est pur et blanc, les malades en réchappent, car la matière était contenue dans un kiste; mais s'il coule un pus semblable à du marc d'huile, les malades meurent.

μς'. Εἰς ὀδύνας ὀφθαλμῶν, ἀκρῆτον ποτίσας, ἢ λέσας πολλῶ θερμῶ, φλεβοτόμει.

46. In doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, et multà calidà laveris, venam secato.

46. Dans les douleurs des yeux, après la boisson de vin pur, et des bains d'eau chaude, il faut saigner.

μς'. Ὑδροπικῶντα ἢ βήξ ἔχον, ἀνέλπιστος ἐστίν.

47. Hydropicum si (α tussis habeat, desperatus est.

47. Si la toux survient à un hydropique, il n'y a plus d'espoir.

μη. Στραγγερίην κὶ δυσερίην θώρηξις κὶ φλεβοτομή λύει. τέμνειν δὲ τὰς εἴσω (φλέδας.)

48. Urinæ stillicidium, et urinæ difficultatem vini potus, et venæ sectio solvit. Secundæ verò internæ (venæ).

48. La dysurie et la strangurie cèdent à la boisson de vin pur et à la saignée; mais il faut ouvrir les veines internes.

μεθ'. Ὑπὸ πυνάγχης ἐχομένου οἴδημα κὶ εὐρύθημα ἐν τῷ στήθει ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν· ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νέσθημα.

49. Ab anginâ detento tumor et rubor in pectore superveniens, bonum: foras enim vertitur morbus.

49. C'est un bon signe dans la squinancie, lorsqu'il survient de l'enflure ou de la rougeur à la poitrine, car alors la maladie se porte à l'extérieur.

ν'. Οἱ πόσοιτιν ἂν σφαιρελιθῇ ὁ ἐγχεῖσθαιος, ἐν τρισὶν ἡμέραισιν ἀπόλυνται· ἢν δὲ ταύτας διαφύγῃσιν, ὑγιῆς γίνονται.

50. Quibus cerebrum (1 sphacelo fuerit affectum, in tribus diebus pereunt : si verò hos effugerint, sanī fiunt.

50. Ceux dont le cerveau est attaqué de sphacèle ou d'engorgement, meurent dans trois jours ; s'ils passent ce terme, ils guérissent.

νά. Παρμὸς γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς, διαθερμαινομένῃ τῇ ἐγκεφάλῳ, ἢ διυγραινόμενῃ τῇ ἐν τῇ κεφαλῇ κενῷ. ὑπερχεῖται γὰρ ὁ αἷρ ὁ ἐνεὼν ἔξω. ψοφεῖ δὲ, ὅτι διὰ σενῶ ἢ διέξοδος αὐτῷ ἐστίν.

51. (1 Sternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, quod est in capite, vacuo. Aër enim qui intus est supra modum (i. e. vi) foràs effunditur. (2 Strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus.

51. L'éternuement provient de la tête, le cerveau étant échauffé, ou le vide qui est dans la tête étant très-humide, alors l'air qui y est renfermé est chassé dehors avec violence ; il fait explosion parce qu'il n'a qu'un passage étroit.

νδ'. Ο'κόσοισιν ἡπαρ περιωδιᾶται, τε-
τέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὴν ὀδύνην.

52. Quibus hepar circumcirca dolet,
his febris superveniens, dolorem solvit.

52. Lorsqu'on ressent de la douleur dans la
région du foie, si la fièvre survient, elle dis-
sipe la douleur.

νγ'. Ο'κόσοισι θυμφέρει αἷμα ἀφαιρεί-
σθαι ἀπὸ τῶν φλεβῶν, τετέως χρηὴ ἦρος φλε-
βοτομεῖσθαι.

53. Quibus sanguinem de venis au-
ferre conducit, his vere venam secare
oportet.

53. Ceux à qui la saignée est bonne, doivent
y avoir recours au printemps.

νδ'. Ο'κόσοισι μεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῆς
γαστρὸς φλεγμα ἀποκλείεται, καὶ ὀδύνην πα-
ρέχει, ἐκ ἔχον διέξοδον εἰς ἐδετέρην τῶν
κοιλίων, τοστέοισι κατὰ τὰς φλέβας εἰς τὴν
κύσιν τραπέντος τῆς φλέγματος, λύσις γίγ-
νεται τῆς νόσου.

54. Quibus inter septum transver-

sum, et ventrem pituita excluditur, et dolorem exhibet, in neutrum ventrem habens transitum, his per venas in vesicam pituitâ versâ, morbi solutio fit.

54. Lorsqu'il y a un amas d'eau entre le diaphragme et l'estomac, et qu'il se manifeste par la douleur, le fluide n'ayant aucune issue ni vers la poitrine, ni vers le ventre; si alors il se porte des veines dans la vessie, la maladie guérit.

νέ. Ο κόσοισιν ἂν τὸ ἥπαρ ὕδατος πλη-
 ρέν ἐς τὸ ἐπίπλοον ῥαγῇ, τρεῖοισιν ἡ κοιλίη
 ὕδατος ἐμπιπλάται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

55. Quibus hepar aquâ replētum ad omentum eruperit, his venter aquâ impletur, et moriuntur.

55. Lorsque le foie plein d'eau se dégorge vers l'omentum, le ventre se remplit et les malades meurent.

νς'. Α'λύκην, χάσμην, φρίκην, οἶνος ἴσῳ
 πινόμενος λύει.

59. Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum par pari aquâ potum solvit.

56. On fait cesser le bâillement, le malaise et l'horripilation, par une égale dose de vin et d'eau.

νζ'. Οκόσσισιν ἐν τῇ ἐρήθει φύμα γίνεται, τστέοισι διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος, λύεται ὁ πόνος.

57. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum sit, his suppurato eo et perrupto, solvitur dolor.

57. Lorsqu'il s'est formé un tubercule dans l'urèthre, la suppuration qui suit la rupture de l'abcès, en est la guérison.

νη'. Οκόσσισι δ' ἂν ὁ ἐγκέφαλος σεισθῇ ὑπό τινος προφάτιος, ἀνάγκη ἀφώνους γενέσθαι παραχρῆμα.

(H'ν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένη ὁ τράχηλος ἐπιστραφῇ, καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται, οἰδηματις μὴ ἶόντος ἐν τῷ τραχήλῳ, θανάσιμον.)

58. Quibus cerebrum concussum fuerit ab aliquâ causâ, necesse est eos statim inuitos fieri.

(Si la fièvre detento collum inverta-

tur, et deglutire non possit, tumore non existente in collo, lethale).

58. Si le cerveau a été violemment ébranlé par quelque causé extérieure, nécessairement on éprouve sur-le-champ la perte de la voix.

(Lorsque le col se renverse subitement dans un malade attaqué de la fièvre, et que la déglutition est empêchée, sans qu'il y ait de tumeur dans la gorge, c'est un signe mortel.)

* Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ, οἰδήματος μὴ ἶόντος ἐν τῇ φάρυγγι, πνῖξ ἐξαίφνης ἐπιγίνεται, καὶ καταπίνειν εὐκόλως μὴ δύνηται, ἀλλὰ μόλις, θάνασιμον.

* Si à febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvise superveniat, nec modum difficulter sed vix deglutire possit, lethale.

* Si un *malade* attaqué de la fièvre éprouve tout à coup un sentiment de strangulation, et que sans l'existence d'aucune tumeur à la gorge, la déglutition soit gênée, ou même interceptée, ce signe est mortel.

ἰδ'. Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγράς τὰς σάρ-

κας ἔχουσι, δεῖ λιμὸν ἐμποιεῖν· λιμὸς γὰρ
ξηραίνει τὰ σώματα.

59. Corpōribus humidās carnes habentibus, famem inducere oportet : famēs enim siccāt corpora.

59. Faites souffrir la faim aux personnes qui ont les chairs très-humides, car la faim dessèche le corps.

ξ'. Οἷος ἂν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ τὸ σῶμα καταψύχεται καὶ πάλιν θερμαίνεται, ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου μεταβάλλῃ, μῆκος νῆσος σημαίνει.

60. Ubi in toto corpore mutationes, et corpus perfrigeratur, et rursus calefit, aut calor alius ex alio permutatur, longitudinem morbi significat.

60. Lorsque le corps éprouve de prompts changemens, soit des alternatives de froid et de chaud, ou un changement de couleur, cela annonce la longueur de la maladie.

ξά'. Ἰδρῶς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς, ῥέων αἰεὶ, σημαίνει ἔχειν πλησμονὴν ὑγρῶς.

ἀπάγειν ἔν χρῇ, τῷ μὲν ἰσχυρῷ, ἀνωθεν·
τῷ δὲ ἀσθενεῖ, κάτωθεν.

61. (1 Sudor multus, calidus, aut frigidus, semper fluens, (2 humidi redundantiam adesse significat. (3 Educere igitur oportet, robusto quidem, supernè : debili verò, infernè.

61. Une sueur considérable, chaude ou froide, continuelle, indique une humidité surabondante; c'est pourquoi il faut la détourner par le vomissement dans les sujets forts, et par les selles dans les sujets foibles.

* Ἰδρὼς πολὺς χεόμενος, νῆσον σημαίνει·
ὁ ψυχρὸς πολλήν· ὁ θερμὸς ἐλάσσω.

* Sudor si fluat multus, morbum indicat : frigidus quidem majorem; calidus vero minorem.

* Une sueur qui coule abondamment dénote la maladie; la sueur froide annonce une maladie plus considérable, et la sueur chaude, une maladie qui l'est moins.

ἔβ. Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες,
ἐν ἰσχυρότεροι διὰ τρίτης γίνονται, ἐπι-

κίνδυνος. ὅταν δ' ἂν πρόω διαλείπῃσι, σημαίνει, ὅτι ἀκίνδυνος.

62. Febres non intermittentes, si per tertiam diem vehementiores fiant, periculosæ. Quocunque autem modo intermittant, significat periculi esse expertes.

62. Les fièvres continues qui prennent de nouvelles forces le troisième jour, sont beaucoup plus graves; mais de quelque manière qu'elles deviennent intermittentes, c'est un signe en général qu'elles ne sont point dangereuses.

ξγ'. Οἷοίσισι πυρετοὶ μακροὶ, τετέοισιν, ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίγονται.

63. Quibus febres longæ sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt.

63. Ceux qui ont de longues fièvres sont sujets à des tumeurs ou à des douleurs aux articulations.

ξδ'. Οἷοίσισι φύματα μακρά, ἢ ἐς τὰ

άρθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν γίνονται, ὅσοι
σιτίοις πλείοσι χρέονται.

64. Quibus tubercula diutina, aut ad
articulos dolores ex febris fiunt, hi
cibis utuntur copiosioribus.

64. Ceux à qui il vient à la suite d'une lon-
gue fièvre des tumeurs indolentes ou des dou-
leurs aux articulations, usent d'alimens trop
copieux.

ζέ. Ἡ'ν τις τῷ πυρέσσοντι τροφήν δι-
δῷ, τῷ μὲν ὑγιαίνειν, ἰσχύς· τῷ δὲ κάμ-
νοντι, νῆσος.

65. Si quis febricitanti cibum det,
convalescenti quidem robur; agrotanti
verò morbus fit.

65. Si l'on donne des alimens à un fébrici-
tant, qui est convalescent, on le fortifie; mais
s'il languit, on empire le mal.

ζη. Τὰ διὰ τῆς νόσious διαχωρόντα
ὁρᾶν δεῖ, εἰ ἴσα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχω-
ρεῖται· τὰ ἥκιστα ἐν ὁμοια τετέοις, ταῦτα
νοσηδέεσσιν. καὶ δ' ὁμοια τοῖσιν ὑγιαίνουσιν,
ἥκιστα νοσερά.

66. Per vesicam prodeuntia inspicere

oportet, an *sint* qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minimè his similia, eò morbosiora; sanis verò similia, minimè morbosa.

66. Observez si l'excrétion de l'urine est semblable à celle des personnes en santé; moins donc elle y ressemble, et plus il y a maladie; et nullement au contraire, si tout est semblable à l'état de santé.

ξζ'. Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ἢ ἐάτης εἶναι καὶ μὴ κινήσης, ὑφίσταται οἷον ζύσματα καὶ, ἢν ὀλίγα ἦ, ὀλίγη ἢ ἰστος γίνεται· ἢν δὲ πολλὰ, πολλή· τετέοισι συμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην. ἢν δὲ μὴ καθαρὴν ποιήσας διδῶς τὰ ροφήματα, ὅπως ἂν πλείω διδῶς, μᾶλλον βλάψεις.

67. Et quibus egestionibus, si stare permiseris, et non moveris, (2 subsident veluti ramenta; et si pauca fuerint, parvus fit morbus: si verò multa, magnus; his confert alvum internè purgari. (3 Si autem non purgatâ alvo sorbitiones dederis, quantò plures dederis, eò magis lædes.

67. Et de même par rapport aux déjections alvines; si vous les laissez sans les troubler et qu'elles déposent comme des raclures de chairs; s'il y en a peu, la maladie est légère; s'il y en a beaucoup, elle est considérable. Il convient alors de purger le ventre; mais si au lieu de purger, vous nourrissez par des boissons, plus vous en donnez, et plus vous causez de mal.

ξη'. Ο'κόσα ἂν κάτω αἷμα διαχωρήη, ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἔσιν. ἢν πλεῖω, πλεῖων ἢνέ λάσσω, ἐλάσσων ἢ νῆσος.

68. Quæ cruda deorsum secedunt, ab atrâ sunt bile: si plura, major; si pauciora, minor est morbus.

68. Ce qui sort par le bas avec le caractère de crudité, vient de l'atrabile; s'il y en a beaucoup, la maladie est plus dangereuse; et elle l'est moins, s'il y a moins d'atrabile.

ξθ'. Αἱ ἀποχρέμψιες, αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ διαλείπουσιν, αἱ πελιδναί, καὶ αἱματώδεις, καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις, πᾶσαι κακαί. ἀποχωρέεσαι δὲ καλῶς, ἀγαθαί, καὶ κατὰ κοιλίην, καὶ κύσιν, καὶ ὅκως ἂν τι ἀποχωρέον εἴη μὴ κεκαθαρμένον, κακόν.

69. Excreationes in febris non intermittentibus lividæ, et cruentæ, et biliosæ, et graveolentes, omnes malæ sunt. At ritè secedentes, bonæ. Sic etiam per alvum, et vesicam, et ubicunque quid secedens restiterit non purgatum, malum.

66. Les crachats livides, sanguinolens, fétides, bilieux, sont tous mauvais dans les fièvres continues; mais si on les rend facilement, ils sont bons. C'est aussi un mauvais signe, si ce qui doit être évacué par les selles, par les urines ou autre part, s'arrête et n'a pas été purgé.

ó. Τὰ σώματα χρὴ, ὅτε τις βέλεται καθαίρεσθαι, εὖροα ποιεῖν. κἢν μὲν ἄνω βέλεται εὖροα ποιεῖν, σῆσαι τὴν κοιλίην· ἢν δὲ κάτω, ὑγρῆναι.

70. Corpora oportet, ubi quis purgare vult, facilitè fluentia reddere. (1 Et si quidem velit efficere facilitè fluentia sursùm, alvum sistere: si verò deorsùm, humectare.

70. Dès qu'on veut purger le corps, il faut faire couler les humeurs; resserrer le ventre

si l'on veut faire couler par haut, et relâcher,
si l'on veut purger par bas.

οά. Ὑ΄πνος, ἀγρυπνία, ἀμφοτέρω μᾶλλον τῷ μετρίῳ γιγνόμενα, νῆσος.

71. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

71. Le sommeil et la veille, s'ils sont l'un et l'autre excessifs, il y a maladie.

* Οὐ πλεοναχία, οὐ λιμός, οὐκ ἀλλ' οὐδὲν ἀγαθόν, ὅ, τι ἂν μᾶλλον τῆς φύσεως ᾖ.

* Non satietas non fames neque aliud quidquam bonum est, quod naturæ modum excedat.

* Ni la satiété, ni la faim, ni rien de ce qui passe l'ordre naturel, n'est avantageux.

οδ. Ἐν τοίῳ μὴ διακρίπῃσι πυρετοῖσιν, ἢν τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ᾖ, τὰ δὲ ἔσω καίηται, καὶ δίψαν ἔχῃ, θανάσιμον.

72. In non intermittentibus febribus, si externa quidem (b sint frigida, interna verò urantur, et sitim habeant, lethale.

72. Dans les fièvres continues, si les parties extérieures *du corps* sont froides, tandis que les intérieures sont brûlantes, et que le malade éprouve une grande soif, il est affecté mortellement.

ογ'. Εἰ μὴ διαλείποντι πυρετῶ, ἢ χειῖλος, ἢ ρίς, ἢ ὀφθαλμοί, ἢ ὀφρύς διασραφῇ, ἢ μὴ βλέπη, ἢ μὴ ἀκρότης, ἢ δὴ ἀσθενείῃς εἶναι, ὅ, τι ἂν τῶν τούτων γένηται, θανάσιμον.

73. In febre non intermittente, si labium, aut nasus, (2 aut oculus, aut supercilium distorqueatur, si non videat, si non audiat, jam debilis existens; quidquid horum fit, lethale.

73. Dans un malade attaqué de fièvre continue, si l'angle des lèvres, ou l'œil, ou le sourcil, ou le nez, sont dans une distorsion convulsive, et si la faiblesse étant excessive, le malade ne voit plus et n'entend plus; quel que soit celui de ces symptômes qui ait lieu, il est mortel.

οδ'. Εἰ πὶ λευκῶ φλέγματι ὕδρως ἐπιγίνεται.

74. Leucoplegmatiae hydrops supervenit.

74. A la leucophlegmatie succède l'hydro-
pisie.

οι. Ἐπὶ διάρροϊᾳ δυσεντερίῃ.

75. Ab alvi profluvio dysenteria.

75. A la diarrhée succède la dysenterie.

οε'. Ἐπὶ δυσεντερίᾳ λειεντερίᾳ (ἐπι-
γίνεται).

76. A dysenteria (α intestinorum læ-
vitas (supervenit).

76. La dysenterie est suivie de la lienterie.

οζ'. Ἐπὶ σφακελισμῷ ἀπόσασις ὀστέα.

77. A sphacelo abscessus ossis.

76 Dans le sphacèle survient la carie de l'os.

οθ. Ἐπὶ αιματος ἐμύτω φέση, καὶ τῷ
πύθ καθάρισις αἵτω.

(Ἐπὶ φέσῃ ρεύμα ἐκ τῆς κεφαλῆς. ἐπὶ
τῷ ρεύματι διάρροια. ἐπὶ διάρροϊᾳ γίγνεται τῆς
αἵτω καθάρσις. ἐπὶ τῇ σφύσει θάνατος.)

(Ἐπὶ αιματος πύθου πύθ πύθσις, καὶ

ρύσις. ἐπὴν δὲ σίαλον ἴσχηται, ἀποδνήσκουσιν.)

78. A sanguinis vomitu tabes, et puris (α purgatio sursùm.

(A tabe, fluxus ex capite. A fluxu, alvi profluvium. Ab alvi profluvio, inhibitio purgationis sursùm. Ab inhibitione, mors).

(A sanguinis sputo, puris sputum, et fluxio. Postquam autem sputum inhibetur, moriuntur).

77. Au vomissement de sang succède la phthisie et le crachement de pus.

Dans la phthisie, il survient la chute des cheveux et la diarrhée; après la diarrhée la suppression des crachats; et après cette suppression, la mort.

Au crachement de sang, succède le crachement de pus et la chute des cheveux; et dès que le crachement s'arrête, la mort survient.

οθ'. Οκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ κύστιν, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίην ὑποχωρήμασι, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὰς σάρκας, καὶ ἢν καὶ ἄλλη τῆς φύσεως ἐκβαίνει τὸ σῶμα ἢν ὀλίγοι, ὀλίγη

ὀλίγη ἢ ὕσσοις γίνεται ἢν δὲ πολὺ, πολ-
λή. ἢν πάνυ πολὺ, θανάσιμον τὸ τοῖστον.

79. Qualia etiam in his quæ per vesi-
cam, et in his quæ per alvum *fiunt* eges-
tionibus, (α et in his quæ per carnes, et
sicubi alià naturæ *viâ* corpus difiluat:
si parum, parvus morbus fit; si mul-
tum, magnus; si admodum multum,
hoc ipsum lethale.

79. Il faut aussi examiner quelle est la na-
ture des excrétiens qui ont lieu, soit par la
vessie, par les intestins, par la peau, ou par
toute autre voie dont le corps s'éloigne de l'é-
tat naturel; s'il s'en écarte peu, la maladie est
légère; beaucoup, elle est considérable; entiè-
rement, cela est tout-à-fait mortel.

NOTÆ

IN

SECTIONEM SEPTIMAM:

APHOR. I. **A**PH. vij, 26. — Prænot. xv. 9. —
Coac. j, 165. — VI. Epid. viij, 93. = (1 Aph.
iv, 48. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 24;
ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 21.

APHOR. II. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 86r.

Арноб. III. Соас. iv, 20. = (a Cels. ij, c. i;
s. 3, p. 62, l. 27.

Præsignum ventriculo hærentis irritati-
onis est; posterius sanguinis ad cerebrum ni-
tentis. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 298.

APHOR. IV. I. Prædict. vij, 14, 15. =
Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 26.

Sudor naturæ motus, horror morbi gras-

santis symptoma vinci naturam à morbo edocent.

APHOR. V. Aph. v, 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 554; t. iij, p. 526. — *Vide* Observationem cl. Mead. cap. *de insaniâ*, monit. et præcept. medica.

APHOR. VI. (1 Aph. vij, 23. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 29. = (b Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 64, l. 13. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 345.

APHOR. VII. Aph. v, 5.

De vini potu rem intellige.

APHOR. VIII. Coac. ij, 236. — I. Morb. xij, 7. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 671.

APHOR. IX. Aph. v, 3. — Coac. iij, 57. = (a Cels. ij, c. 2, p. 93, l. 4.

APHOR. X. Coac. iij, 303. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 90. l. 30.

Rapi in inflammationis communionem ventriculi tunicas singultus et vomitus docent; cerebrum nervosque iisdem malis affici delirio et convulsione patet. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 243, 549.

APHOR. XI. Coac. iij, 172. — Affect. ix, 12. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 78, l. 1.

Summum inflammationis gradum, motum sanguinis per vasa pulmonum præpeditum, quomodo peripneumonia pleuritidi superveniens indicet, *Vide* apud van-Swieten, t. iij, p. 62.

APHOR. XII. *Vide* van - Swieten, t. ij, p. 548.

APHOR. XIII. Aph. ij, 26. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 78, l. 2.

Hujus Aphorismi veritatem observatione consecrarunt Bontius, Hans Sloane, Hillari, aliique ferventium regionum medici. In aëre inflammabili factitio illicò tetano animalia corripuntur.

APHOR. XIV. Coac. ij, 8; iij, 371. — VII. Epid. xxx, 8; cap. Vuln. xv, 1. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 78, l. 4. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 394.

APHOR. XV. Aph. vij, 16, 78. — Nat. Human. xxij, 1. — II. Prædict. xiv, 1, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 7, 70.

APHOR. XVI. Aph. vij, 15, 78. = (1 Glandul. x, 2, 3, 4. = (2 Coac. iij, 257. — I. Morb. x, 17, 20; xj, 40. — Vict. Acut. vij, 6, 7, 8. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 87, l. 25. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 70.

Sive *ῥίσις* sit alvi profluvium, sive sit colliquescentis corporis marasmus, ut alii volunt.

APHOR. XVII. Aph. v, 48. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 75, l. 15. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 84.

APHOR. XVIII. (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 75, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 531.

APHOR. XIX. Cap. Vuln. xxvij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 359.

APHOR. XXI. (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 78, l. 6.

APHOR. XII. Aph. vij, 26.

APHOR. XXIII. Aph. vij, 6. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 77, l. 28.

Meraca *ἀκρητος* quæ alibi *ειλικρινής* sincera, id est, cruda, indigesta dejectio, si in dysenteriam desinat, ingentem in visceribus irritationem enatam et cruditati junctam designat. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 345.

APHOR. XXIV. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 394.

APHOR. XXV. Aph. v, 1.

APHOR. XXVI. (1 Aph. iv, 48, vij, 22. ~~et~~

(a Cels. ij, c. 1, s. 7. p. 82, l. 28; et c. 1, s. 3, p. 62, l. 22.

Sive adsit febris lypiria, sive immineat gangræna, sive demùm præ doloris vehementiâ nervi constringantur. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 186.

APHOR. XXVII. I. Morb. Mul. xlij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 220; t. iv, p. 444.

APHOR. XXVIII. Aph. vj, 19. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 513.

APHOR. XXIX. Flat. xvij, 8, 9. — Indicat. xj, 21. — Coac. iij, 285, 326. — I. Morb. vj, 7. — II. Morb. lxi, 11, 12. — Int. Affect. xiiij, 12. — (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 82, l. 28. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iij, p. 286, 374; t. iv, p. 230.

Modò virium constantia, ægri euphoria morbi imminutionem indicent.

APHOR. XXX. Morb. Sac. vij, 28. = (1 Coac. v, 13, 14. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 338.

Scilicet adest vasis excernenda transmittentibus laxitas et atonia, hinc crudorum effluxus.

APHOR. XXXI. (1 Prænot. xj, 7. — Coac. ij, 199, x, 12, 64, 65. — *Vide* Savonarolam de

Urin. pag. 700. Prosper. Alpin. de præsa-
giendâ vitâ et morte, lib. vij, cap. 13.

APHOR. XXXII. Coac. v, 6, 8. — I. Morb.
xxvij, 28. — Vict. Acut., liv. 5. = (a Cels. ij,
c. 1, s. 5, p. 65, l. 3.

Acrem scilicet designant et valde biliosam
materiam intus grassari, quæ inflammet vasa.
Vide Savonarolam de Urin. p. 677, 679; undè
ardentes urinæ vocantur, *ibidem*, p. 680.

APHOR. XXXIII. (I Coac. v, 15, 16, 76. —
IV. Epid. vj, 14, 19.

Crudissimæ sunt ex urinis, quæ non aggre-
gatas, sed divulsas partes ferunt, ex tamen
omnia susdeque ferri significant, imò cruda
coctionem affectare.

APHOR. XXXIV. (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 65,
l. 7; ij, c. 1, s. 6, p. 73, l. 22. II. 7, p. 60,
l. 31.

Abrasâ scilicet mucilagine turgescunt.

APHOR. XXXV. Prænot. xij, 1, 2. — Coac.
v, 43. — IV. Epid. vj, 12, 13.

Forsan ob vicinum renibus adipem, qui
præ putredine indolem saponis insumit.

APHOR. XXXVI. — *Vide* van-Swieten,
t. iij, p. 242.

APHOR. XXXVII. Aph. iv, 25. — Coac. iij, 238 ad 243. = (a Cels. iv, c. 1, s. 2, p. 238, l. 26; et p. 239, l. 5. (b Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 68, l. 8.

Aliquandò sanguis à vasis debilioribus ad salutem evomitur; sed rarò id accidere fatendum est, et plerumque infido levamine, cum aut infarctum per abdominalia vasa demonstret sanguinis vomitus, aut debilitatem saltem vasorum. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 123, 127.

APHOR. XXXVIII. Aph. vj, 20. — Loc. in Hom. xvij, 7. — I. Morb. xj. 2, 3.

APHOR. XXXIX. Aph. iv, 80.

APHOR. XL. (I Aph. vj, 23, 57. — II. Prædict. xvj, 12. — Coac. iij, 87, 88, 315, 317.

Sensus Hippocratis est, quasi melancholicus humor aliquandò apoplexiam possit inducere. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 252, 264.

APHOR. XLI. Vid. Aph. v, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 194.

Extincta scilicet vi vitali, quæ in senio debilis est, fit singultus.

APHOR. XLII. (a Cels. ij, c. 2, s. 6, p. 169, l. 9.

APHOR. XLIV. Aph. vj, 27; vij, 45. — Prænot. vij, xix, 4. — II. Morb. xlv, 34, 35. = (1 Coac. iij, 217, 218, 269. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 647; t. iij, p. 56, 683.

APHOR. XLV. Aph. vij, 44. — Prænot. vij, 6. = (1 Coac. iij, 218, 274. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 81, l. 8. = (b Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 86, l. 30. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 647; 674; t. iij, p. 106, 116, 117.

APHOR. XLVI. *Vide* Aph. vj, 31. — *Vide* notas. Cl. de Villebrune.

APHOR. XLVII. Aph. vj, 35. — I. Prædict. xj, 1, 6. — II. Epid. v, 28. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 88, l. 16. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 177.

APHOR. XLVIII. Aph. vj, 36. — II. Epid. vj, 39.

Non ita intelligendus est Hippocrates, quasi eidem casui conveniat vini potio et venæ sectio. Sed cum idem symptoma causis oppositis competat, opposita pariter adhibenda Medicina.

APHOR. XLIX. *Vide* Aph. 37. — Prænot. vij, 3; xxij, 14. — Coac. ij, 221; iij, 97, 102. — II. Morb. xxvj, 26; xxvij, 14. — *Vide* van-Swieten; t. j, p. 858.

APHOR. L. Coac. ij. — II. Morb. v, 2, 21; xx, 2, 8, 9, 10. = (1 VII. Epid. xxx, 7. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 398.

Quid de cerebri sphaelismo sentiendum sit nemo plenius et melius exposuit Cl. de Villebrune in Aphor. xij, sect. iij.

APHOR. LI. (1 Prænot. xij, 11. = (2 Princip. et Car. xix, 1 ad 4.

Fit sternutatio, vel convulsivè, vel à sensu ingrato in membranâ pituitariâ.

APHOR. LII. Aph. vj, 40. — Coac. iij, 272.

APHOR. LIII. Aph. vj, 47.

APHOR. LIV.

Propositio Anatomix repugnans de qua libet pituitæ mucilaginosâ stagnatione intelligatur, seu vasis contenta sit, seu, ruptis vasis, sibi ipsi cavum molitâ fuerit.

APHOR. LV. Prænot. viij, 6. — Coac. iij, 276, 278. — Affection. xxij, 3 ad 10. — Int. Affect. xxvj, 2.

An de hepate in hydatides converso loqui voluit Hippocrates?

APHOR. LVI. II. Epid. vj, 45. = (1 II. Morb.

xxxviiij, 6. — Int. Affect. v, 14. — II. Morb. Mul. lxxxviiij, 2.

APHOR. LVII. *Vide* Aph. iv, 12. = (a Cels. ij, c. 1, s. 7, p. 85, l. 27. — *Vide* van-Swieten, t. v, p. 428.

APHOR. LVIII. Coac. iiij, 370. — I. Morb. iiij, 34. — Aph. iv, 35. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 408.

APHOR. LIX. Aph. ij, 21; iv, 13, 41; vij, 50. = (1 II. Diæt. xxxviiij, 1, 2. — III. Diæt. xvj, 12, 14. — II. Prædict. viij, 8, 13. — Insomn. xv, 14, 15. — Affect. xxviiij, 2; xlj, 7, 8, 11, 12. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 238.

APHOR. LX. Aph. iv, 40. — I. Prædict. ij, 4; iv, 2; vij, 12; x, 2. — Coac. v, 6, 78; vj, 85. — Vict. Acut. xlvj, 4, 5.

APHOR. LXI. (1 Aph. iv, 41, 42. = (2 Aph. iv, 56. = (3 Aph. j, 21.

APHOR. LXII. *Vide* Aph. iv, 44.

APHOR. LXIII. *Vide* Aph. iv, 44.

APHOR. LXIV. *Vide* Aph. iv, 45.

APHOR. LXV. Aph. ij, 10, vii, 67. — Vet. Medic. xij, 11.

APHOR. LXVI. VI. Epid. viij, 29. 40.

APHOR. LXVII. (1 Judicat. viij, 10, 11. = (2 Prænot. x, 8. — Coac. vj, 85. — Epid. vj, 10. = (3 Aph. ij, 10; vij, 65. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 348.

APHOR. LXVIII. Aph. j, 22. — Judicat. viij, 12.

Delendum hunc Aphorismum vult. Prosp. Martianus, aut legendum ut in lib. de Judicat. *Si atrabilis deorsum exeat, pauca, etc.*

APHOR. LXX. Aph. ij, 9; iv, 12. = (1 II. Dic. xxxvj, 18 ad 23. = (a Cels. iij, c. 2, s. 7, p. 181, l. 16.

APHOR. LXXI. *Vide* Aph. ij, 3.

APHOR. LXXII. *Vide* Aph. iv, 48. = (a Cels. ij, c. 1, s. 5, p. 67. l. 10.

APHOR. LXXIII. *Vide* Aph. iv, 49. — I. Prædict. x, 7. = (1 Coac. ij, 117, 128.

APHOR. LXXIV. I. Morb. iij, 28. — Affection. xx, 13; xxxij, 3. — Int. Affect. xxiv, 1. — *Vide* van-Swieten, t. j, 93.

APHOR. LXXV. (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 77, l. 28. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 349.

APHOR. LXXVI. Aph. vj, 43. — Coac. ij, 296. — I. Morb. iij, 26. = (a Cels. ij, c. 1, s. 6, p. 77, l. 29.

APHOR. LXXVIII. Aph. vij, 15, 16. — II. Prædict. xiv, 1, 3. — I. Morb. x, 69; xiv, 4 ad 22. = (a Cels. iv, c. 1, s. 2, p. 238, l. 17. — Vid. Aph. v, 12, 14. — II. Prædict. xij, 3. — Coac. iij, 259. — *Vide* Aph. vij, 15, 16.

Ad intelligendum hujus Aphorismi sensum, obscuræ Benneti Londinensis de tabe observationes accuratè legendæ sunt. Theatr. Tabid.

APHOR. LXXIX. Prænot. ij, 1, etc. xv, 10, 11. = (1 Aph. viij, 18. — Aliment. vj, 1 ad 8. — Insomn. iv, 16. — Epid. vj, 2. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 387.

Multi L. B. Sectionem Octavam omittunt. Plurimi sex ejus priores adjiciunt Aphorismos. Alii Sectionem totam addunt, ut hîc factum vides. Nam quæ spuria tibi videntur, in lectione præteriri facîle possunt.

Α' Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι'

Πάρειμβλημένοι.

Τμήμα ὀγδοον.

α'. Ο'κόσοιτι ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα ἔτεα φρενιτικοὶ γίνονται, ὃ πάνυ τοι ὑγιάζονται. ἤσπον γάρ κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείη τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίης, ἢ νῆσος ᾗ.

1. Qui (1 supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non admodum sanantur. (2 Minus enim periclitantur, quorum naturæ, et ætati, morbus similis fuerit.

1. Ceux qui deviennent phrénétiques après quarante ans, guérissent très-rarement. Car

lorsque la maladie est plus analogue à l'âge et au tempérament, on court moins de danger.

β'. Οκόσοισιν εν τῇσιν ἀρρώσίσιν οἱ ὀφθαλμοὶ κατὰ προαίρεσιν δακρύουσιν, ἀγαθόν. ὁκόσοισι δὲ ἄνευ προαίρεσιος, κακόν.

2. Quibus, in infirmatibus, oculi ex proposito (i. e. ob causam) (α lacrymantur, bonum. Quibus verò sine causâ, malum.

2. Dans les maladies, ceux à qui on voit répandre des larmes, ce signe leur est avantageux ; mais lorsque les yeux pleurent sans sujet, c'est un très-mauvais signe.

γ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἔξιν αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῖ, πονηρόν.

3. Quibus in febris quartanis existentibus, sanguis ex naribus fluxerit, malum.

3. Dans les fièvres quartes, l'hémorrhagie du nez est de mauvais augure.

δ'. Ἰδρωτες ἐν τῇσι κρίσεμοισιν ἡμέ-

ρησι γιγνώμενοι σφοδροὶ καὶ ταχείες, ἐπικίνδυνοι καὶ οἱ ἀθρόοι ἐκ τῆς μετώπης, ὥσπερ σταλαγμοὶ καὶ κρενοὶ, καὶ ψυκροὶ σφόδρα, καὶ πολλοὶ. ἀνάγκη γὰρ τὸν τοιοῦτον ἰδρῶτα πορεύεσθαι μετὰ βίης, καὶ πόιν ὑπερβολῆς, καὶ ἐκθλίψιος πολυχρονίᾳ.

4. Sudores in diebus criticis oborientes, vehementes et veloces, periculosi : (1 et qui expelluntur ex fronte, velut guttæ, et aquæ salientes, et frigidi valdè, ac multi. Necesse enim est talem sudorem prodire cum violentiâ, et laboris excessu, et expressione diuturnâ.

4. Les sneurs qui surviennent les jours critiques, sont dangereuses, si elles sont très-fortes et promptes; de même que si elles sortent du front comme les filets d'eau d'une source: si elles sont très-froides et considérables; car nécessairement une telle sueur ne peut avoir lieu qu'avec violence et par un excès de travail, et d'après une longue expression.

ἔ. Ἐπὶ χρονίῳ νυσήματι κοιλίης καταφορὴ, κακόν.

5. Ex morbo diuturno alvi defluxus, malum.

5. Si la diarrhée survient après une longue maladie, c'est un mauvais signe.

ε'. Ὅσα φάρμακα ἐκ ἰῆται, σίδηρος ἰῆται. ὅσα σίδηρος ἐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται. ὅσα δὲ πῦρ ἐκ ἰῆται, ταῦτα χρὴ νομίζειν ἀνίατα.

6. Quæ medicamenta non sanant, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat. Quæ vero ignis non sanat, ea insanabilia existimare oportet.

6. Ce que les remèdes ne peuvent guérir ; le fer le guérit ; ce que le fer ne guérit pas, le feu le guérit ; et ce que le feu ne guérit pas, il faut le regarder comme incurable.

ζ'. Φθίσεις μάλιστα γίνονται ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐτέων, μέχρι τριήκοντα καὶ πέντε.

7. Tabes maximè fiunt ab anno octavo decimo usque ad quintum et trigessimum.

7. On est surtout attaqué de la phthisie ; depuis l'âge de dix-huit ans , jusqu'à trente cinq.

ή. Τὰ δὲ κατὰ φύσιν γιγνόμενα κατὰ φθίσιν, τάντα μὲν ἰσχυρὰ, τὰ δὲ καὶ θανατάδεα. δεύτερον δὲ, ἢν μὲν ἐν τῇ ὥρῃ νασείη, αὐτὴ ἢ ὥρῃ ξυμμαχῇ τῇ νόσῳ, οἷον καύσῳ θέρος, ὑδρωπικῷ χειμῶν· ὑπερνικᾷ γὰρ τὸ φυσικόν· φοδερῶτερον δὲ πλυνί.

8. (1 Quæ secundùm naturam ad talem disposita sunt, omnia quidem vehementia; quædam verò etiam lethalia. (2 Secundùm autem, si quidem in eo tempore ægrotet, cùm tempus ipsum unà cum morbo impugnat, velut cum febre ardente æstas, cum hydropo hyems. Natura enim longè superior est : leni verò plus offert timoris.

8. Ceux qui naturellement sont disposés à la phthisie , chez eux tout est violent , et souvent mortel. En second lieu, si la saison lutte de concert avec la maladie , comme l'été avec la fièvre ardente ; l'hiver avec l'hydro-

pisie ; car les causes physiques sont les plus fortes , et il y a plus à craindre pour les maux de rate.

θ'. Γλῶσσα μέλαινα ἢ αἱματώδης, εἴ τι τῶν τοιούτων σημείων ἄπεισι, μὴ σφόδρα κακόν. δηλοῖ γὰρ νῆσον μικροτέραν.

9. Lingua nigra atque cruenta, si quid horum signorum abest, non valdè malum : morbum enim minorem declarat.

9. La langue est noire, ou sanguinolente ; s'il y a absence de l'un de ces signes, le mal n'est pas très-grave ; car cela indique une maladie moins violente.

ι. Ταῦτα μὲν ἔν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὀξέσι σημειῖσθαι χρὴ, ὁπότε μέλλει ἀποθνήσκειν, ἢ ὁπότε σαθρήσεσθαι.

10. Hæc igitur in febribus acutis notare oportet, quando quis moriturus sit, et quando evasurus.

10. Or, il faut indiquer dans les fièvres ai-

guës, quand un malade doit mourir et quand il doit en réchapper.

ια. Ὅρχις δεξιὸς ψυχρὸς καὶ σπασμώδης, θανατῶδες..

11. Testis dexter frigidus et convulsus, lethale.

11. C'est un signe mortel, que d'avoir le testicule droit froid, et contracté par le spasme.

ιβ'. Ὅνυχες μέλανες, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροὶ, ξυνεσχυμένοι ἢ καθεύμενοι, ἐγγύς τὸν θάνατον δηλοῦσι.

12. Ungues nigri; et digiti manuum et pedum frigidi, contracti, vel remissi, mortem in propinquo esse ostendunt.

12. Les ongles noirs, et les doigts des pieds et des mains froids, retirés ou couchés, indiquent une mort prochaine.

ιγ'. Τὰ χεῖλη πελιδνὰ, ἢ καὶ ἀπολειμμένα, καὶ ἐξετραμμένα, καὶ ψυχρά, θανατῶδεια.

13. Labia livida, aut etiam resoluta et inversa, et frigida, lethalia.

13. Les lèvres livides, pendantes, froides et renversées, sont un signe mortel.

ιδ'. Τὰ ὦτα ψυχρά, διαφανέα, ξυρσαλμένα, θανατάδεια εἰσι.

14. Aures frigidae, pellucidae, contractae, lethales sunt.

14. Les oreilles froides, transparentes, et contractées, sont un signe de mort.

ιε'. Καὶ σκοτοδινίων, καὶ τὴν αὐγὴν ἀποσρεφόμενος, καὶ ὕπνῳ καὶ καύματι πολλῷ κατεχόμενος, ἀνέλπιστος.

15. Et tenebricosâ vertigine laborans, et lucem aversans, et somno ac ardore multo detentus, desperatus.

15. Celui qu'un brouillard épais empêche de voir, qui détourne les yeux de la lumière, qui est dans l'assoupissement et dans une ardeur continuelle, est près de mourir.

15'. Καὶ λυσάων ἀτρέμα, καὶ ἀγνοίαν, καὶ μηδὲ ἀκρίαν, μηδὲ ξυνεῖς, θανατώδης.

16. Et qui in rabiem actus furit intrepidè, et non agnoscit, et neque audit, neque intelligit, *jain* moribundus est.

16. Celui qui agité d'un transport furieux, brave toute crainte, qui ne connoît personne, qui n'entend et ne comprend plus, est mourant.

17'. Μέλλουσιν ἀποθνήσκειν ταῦτα σαφέστερα γίνεται, καὶ αἱ κοιλίαι ἐπαίρονται, καὶ φυσῶνται.

17. Morituri signa hæc magis fiunt manifesta, et ventres attolluntur, atque inflantur.

17. Ces signes sont plus manifestes dans ceux qui vont mourir, le ventre s'élève et se météorise.

18'. Ὅρος δὲ τῆς θανάτου, εἰὰν τὸ τῆς ψυχῆς θερμὸν ἐπανεέλθῃ ὑπὲρ τῆς ὀμφαλῆς εἰς τὸν ἄνω τῶν φρενῶν τόπον, καὶ συγκαυσθῇ τὸ ὑγρὸν ἅπαν. ἐπειδὴν ὁ πλεύμων καὶ ἡ καρ-

διὰ τὴν ἱκμάδα ἀποβάλλωσι, τῷ θερμῷ
ἀθροῦντος ἐν τοῖσι θανατάδεσι τόποις, ἀπο-
πνέει ἀθρόον τὸ πνεῦμα τῷ θερμῷ, ὅθεν πέρ
ξυνέστη τὸ ὅλον, ἐς τὸ ὅλον. πάλιν τὸ μὲν διὰ τῶν
σαρκῶν, τὸ δὲ διὰ τῶν ἐν κεφαλῇ ἀναπνοῶν,
ὅθεν τὸ ζῆν καλεῖμεν, ἀπολείπῃσα ἡ ψυχὴ
τὸ τῷ σώματος σκῆνος, καὶ τὸ ψυχρὸν, καὶ τὸ
θνητὸν ἐξῶλον, ἅμα καὶ χολῇ, καὶ αἵματι, καὶ
φλέγματι, καὶ σαρκὶ, παρέδωκεν.

18. *Terminus verò mortis est, si animæ calor suprâ umbilicum ad locum septo transverso superiorem ascenderit, (1 et omne humidum fuerit combustum. Potsquam pulmo et cor humorem amiserint, calore in mortiferis locis coacervato, caloris spiritus confertim exhalat, undè totum in toto constitit. (2 Rursus partim quidem per carnes, partim verò per spiracula in capite, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis tabernaculum, et mortale simulacrum, unâ cum bile, et sanguine, et pituitâ, et carne, dedicatione tradit.*

18. Or, l'instant de la mort est arrivé, lorsque la chaleur vitale remonte au-dessus de l'ombilic, à la partie supérieure du diaphragme, et tout l'humide est consumé. Après que le poumon et le cœur ont exhalé leur humidité, la chaleur se rassemblant dans les lieux mortels, chasse en masse ce souffle de vie, d'où le tout va se réunir au tout. Dès-lors l'ame abandonne le corps, qui lui a servi de demeure; elle sort partie par les chairs, partie par les soupiraux qui sont à la tête, et par lesquels nous disons que l'on vit, et restitue le froid, image de la mort, avec la bile, le sang, le flegme et la chair.

NOTAE

IN

SECTIONEM OCTAVAM.

APHOR. I. (1 **A**PH. ij, 39, 40; vj, 6. = (2 Aph. ij, 34; iv, 48.

APHOR. II. Aph. iv, 52. = (a Cels. ij, c. 1, s. 3, p. 62, l. 13.

APHOR. III. Judicat. x, 7. — I. Prædict. j, 2. — Coac. ij, 37, 38; iiij, 433. — VI. Epid. ij, 40. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 473.

Notat Prosper Alpinus se narium hæmorrhagiâ à quartanâ liberatum fuisse, quod tamen hujusce dogmatis Hippocratici veritatem non impedit; cum symptoma illud ab immenabili obstructione pendere soleat. Prosp Alp. de præsag. vitâ et morte. Lib. vj, cap. xiiij, p. 425.

APHOR. IV. (1 Judicat. vj, 9. — I. Prænot. 4, 8. — I. Prædict. v, 7. — Coac. iiij, 91; iv, 38, 39. — Vict. Acut. liij, 8, 9.

APHOR. V. *Vide* van-Swieten; t. ij, p. 346;
t. iij, p. 374.

APHOR. VI. Arte xij, 12 ad 18. — *Vide*
van-Swieten, t. iij, p. 67.

APHOR. VII. Aph. v, 9.

APHOR. VIII. (1 I. Morb. xx, 1, 2, 3. = (2
Aph. ij, 34; iij, 3; viij, 1. — VI. Epid. viij,
45. — Affect. vij, 3, 4.

APHOR. IX. Coac. ij, 140, 148.

APHOR. X. Prænot. ij, iij, iv.

APHOR. XI. Prænot. viij, 20. — Coac. iij,
352.

APHOR. XII. Prænot. viij, 15; xv, 9. — Coac.
iij, 349 = (a Cels. ij, c. 17, s. 5, p. 66, l. 20;
ij, c. 1, s. 6, p. 80, l. 15.

APHOR. XIII. Coac. j, 97.

APHOR. XIV. Prænot. ij, 9. — Coac. ij, 67,
108.

APHOR. XV. Prænot. ij, 18, 19. — (1 Coac.
ij, 117.

APHOR. XVI. Coac. iij, 327.

APHOR. XVIII. (1 Morb. xxx, 12 ad 16. — (2
Vid. Aph. vij, 79. — Aliment. vj, 1 ad 8.

LUD. VERHOOFD

PRÆFATIO

AD

INDICEM.

SISTO tibi, L. B. indicem, qui (ut verum fatear) in meum factus est usum. Sed cum is jam aliis etiam conceditur, quid quærentem monere velim verbo dicam.

Ordo ejus est litterarum idem. Prout quærendum cæperit à litterà, in eàdem illud videri debet. Quidquid eundem affectum concernit, in summum collegi caput, ut uno intuitu omnia vi-

deantur. Methodo ad Praxin directâ disposui.

Primò *Affectum* pono. Deinde *Anni Tempus*, in quo accidit. Mox *Ætatem* cui et familiaris. Inde ad *Signa* progredior. Hinc *Causas* adscribo, simul cum aliis affectibus, unde originem trahit. Deinceps descendo ad *Prognosin*, bonam vel malam. Tum *Diætam* præscribo. *Curam* subjungo, sub quâ *Purgationem* quandoque simul præcipio. Tandem *Crisin*, sive *Solutionem*, quomodo ea fiat, annecto. Denique quibus superveniens morbis *eosdem solvat*, refero. Ultimò *Species varias* (in quibus tractandis eadem iterum servatur methodus) addo. Et si quæ *supra hæc* occurrant, adjicio.

Verùm de omni affectu hæc singula conjungere volumen breve vetat.

Jam si quid in indice omissum putes, in alio id quærere capite, et fortasse non frustra feceris. Si tamen idem pluribus notetur in locis, quæso, ne id offendat.

Tuâ enim gratiâ id repetitum est : atque decies redundare , quàm semel deficere , malo sciens. Ordinis rationem , quia brevis esse cogor , non reddo. Fruere , fave , vale.

Καὶρὸν γινῶθι.

Ὅξὺς γάρ:

Aph. I. 1.

I N D E X.

ABDOMEN.

Crassi et tenuis ,
prog. ij, 35.

ABORTUS.

Tempus, iiij, 12.
Futuri signa à
mammis, v, 37,
 38, 53.
Causa V. S. v, 31.
Diarrhœa, v, 34.
Tenesmus, vij, 27.
Uteri mucus, v, 45.
Macies p. n. v, 44.
Extenuatio in fe-
bre, v, 55.

ABSCUSSUS.

Futuri sign. in feb.,
 iv, 31.
In morb. diuturno,
 iv, 32.
Solutio, iv, 74.
Longi sign. iv, 51.
In art. ulis ante
post. febr., iv, 31.
Prævertitur, iv, 74.
In nephriticis sign.
 vij, 36.
Abscess. ossis in ul-

cere diuturno, vj,
 45.

Asphacelo, vij, 77.

ÆTAS.

Temperamentum,
 j, 14, 15.
Prog., ij, 34, 45;
 iiij, 24; viij, 1.
Diæta, j, 13, 14,
 15, 16.
Cautio in diæta, j,
 17; iiij, 3.
In aliis, j, 3, 4.

Nuper natus.

Morbi, iiij, 24.

Dentiens.

Morbi, iiij, 25.

Morbor. crisis, iiij,
 28.

Puer.

Ver et æstas con-
veniunt, iiij, 18.

Fames, j, 13, 14.

Morbi, iiij, 26.

Non laborat poda-
gra, vj, 30.

Morbor. progn.
 ij, 39; iiij, 28.

- Diæta*, j, 16.
 Puber.
Ver et æstas con-
ducunt. iij, 18.
Morbi, iij, 27.
Morbor. progn.
 ; iij, 28.
 Adolescens.
Fames, j, 13.
Alvi prog. ij, 20.
 53.
Morbi, iij, 29.
Morbor. progn.
 ij, 45; v, 7.
 Vir.
Autumno et hye-
me valet, iij, 18.
Fames, j, 13.
Morbi, iij, 30; vj,
 57.
 Senex.
Temperamentum,
 j, 14.
Æstate valet, iij,
 18.
Fames, j, 13, 14.
Alvus, ij, 20,
 53.
Morbi, j, 14; iij,
 31.
Progn. ij, 39, 40,
 49; iij, 12; vi, 6;
 viij, 1.
 ALPHI. *Tempus*, iij,
 20.
- ALVI EXCREMEN-
 TA, egestioncs.
Χαρέον, j, 23.
Ἀποχώρεον, vij, 69.
Διαχώρημα, iv, 28;
 vij, 30.
Διαχώρησις, ij, 18;
 iv, 47; v, 64.
Υ'ποχώρεον, iv, 25,
 26.
Υ'ποχώρημα, j, 12;
 iv, 21; vij, 77, 79.
Υ'ποχώρησις, iv, 83;
 v, 64; vij, 6, 23.
Ε'κκρισις, ij, 15.
Ε'πελθόν iv, 22.
Υ'πελθόν, iv, 23.
Progn. j, 12; vij,
 79.
In feb. continuâ,
 iv, 47; vij, 69.
Diæt. in fanis, ij,
 15.
In biliosis, ij, 15;
 v, 64.
Biliosorum solutio,
 iv, 28.
Ab atrâ bile lethar-
lia, iv, 22, 23, 24.
Nigror. progn. iv, 21.
Sanguis niger, bo-
 nus, iv, 25.

- Lethalis*, iv, 23.
Spumosa unde, vij, 30.
Sincera. Progn. vij, 23.
In morbo. diuturn. vij, 6.
Celeria unde, ij, 18.
Pauca ubi, iv, 83.
Carunculæ, malæ, iv, 26.
Ramentorum, prognosis, vij, 67.
ALVI FLUXUS.
Διάρροια, iiij, 21, 25, 30; v, 12, 14; vj, 15, 16, 17, 32; vij, 29, 30, 75, 78.
Ρύσις, ij, 14; iiij, 16; vij, 78.
Ρύειν, v, 34.
Ταραχή, j, 2; iv, 60.
Καταφορά, viij, 5.
Υγρότης, iiij, 31.
Tempus, iiij, 16, 21.
Ætas, iiij, 25, 31.
A fluxione capitis, vij, 78.
Progn. ij, 14; vij, 75.
Malus, v, 34; vj, 16, viij, 5.
Lethalis, v, 12, 14.
Solutio, vj, 15.
Morbum solvit, iv, 60; vj, 17; vij, 29.
Spontanei progn. j, 2.
Spumosos à capite, vij, 30.
Longo obnoxii, ij, 20; vj, 32.
Ætas, iiij, 30.
ALVI MUTATIO.
naturalis, ij, 20, 53.
ALVUS HUMIDA, SICCA.
Tempus, iiij, 16, 17.
Progn. ij, 20, 53.
Humidæ ætas, iiij, 31.
Ubi fiat, iv, 27, 73.
ANGINA.
Tempus, iiij, 16, 20, 22.
Progn. bona, vj, 37; vij, 49.
Mala, v, 10.
ANIMUS. Videatur Mens.
ANXIETAS.
Kino solvitur, vij, 56.
APHTHÆ. *Ætas*, vij, 24.
APPETITUS. Vid. Fames.
A purgante, iv, 21.
ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ.

APOPLEXIA.

Tempus, iiij, 16, 23.

Ætas, iiij, 31; vj, 57.

In melancholicis unde, vj, 56.

Progn. vj, 51.

Curæ, ij, 42.

Particularis, vij, 40.

AQUA.

Levis sign. v, 26.

Calidæ effectus, vij, 42, 46.

Frigidæ effectus, v, 21.

AROMATA. *Suffitus vis et noxæ*, v, 28.

ARS MEDICA, *longa*, j, 1.

Requisita, j, 1.

ARTICULORUM.

Dolor Tubercula.

Vid. Dolor. Tubercula.

ARTUS, etc.

Progn. mortis, viij, 10 ad 18.

ASTHMA.

Tempus, iiij, 22.

Ætas, iiij, 26, 30.

Progn. vj, 46.

AUDITUS.

Progn. in feb. iv,

49; vij, 73.

Hebetis tempus, iiij, 5, 17.

Ætas, iiij, 31.

Acuti tempus, iiij, 17.

AURES.

Progn. viij, 14.

Humidarum ætas, iiij, 24, 31.

Doloris tempus, iiij, 21.

AUSTER. *Vid. Ventus.*

AUTUMNUS. *Vid. Tempestas.*

BALBUS. *Progn.* vj, 32.

BALNEUM.

Dolores oculorum solvit, vj, 31; vij, 46.

BILIS.

Atræ sign. vij, 68.

Lethalis ubi, iv, 22, 23, 24.

BOREAS. *Vid. Ventus.*

BUBO. *Progn.* iv, 54.

CACHEXIA.

Ætas, iiij, 31.

Diæta, ij, 10; vij, 67.

- Purgationis progn.* ij, 36.
- CALCULUS. Vid. Vesica.
- CALIDUM INNATUM.
- Majoris tempus*, j, 15.
- Ætas*, j, 14.
- CALOR.
- Utilis ubi*, v, 18. 22.
- Magni progn.* vij, 13.
- Frequentioris morbi*, v, 16.
- Mutati progn.* iv, 40; vij, 60.
- Particularis quid notet*, iv, 39.
- Ventris quando major*. j, 15.
- Progn.* iv, 48; vij, 72.
- CALVUS. Vid. Capilli.
- CANCER. *Occulti progn.* vij, 38.
- CAPILLI, PILUS.
- Quid indicent.* iv, 69.
- E renibus*, iv, 76.
- Defluxus in tabe lethalis*, v, 12, 14.
- Calvi progn.* vj, 34.
- Eunuchus non fit*, vj, 28.
- CAPUT.
- Doloris tempus*, iij, 13, 23.
- Sign.* iv, 70.
- Progn.* vj, 51.
- Diæta*, v, 64.
- Cura, V. S.* v, 68.
- Solutio*, vj, 10.
- Gravitatis tempus*, iij, 5, 17.
- Causa*, v, 28.
- Cura, calor.* v, 22.
- Vulneris progn.* vij, 14.
- Ulcus, calor juvat.* v, 22.
- CARTILAGO. *Dissecta non coalescit*, vj, 19; vij, 28.
- CATARRHUS.
- Ætas*, iij, 12, 31.
- Sign. in diarrhœa*, vij, 30.
- Causa, frigus*, v, 24.
- A tabe*, vij, 78.
- Lethalis ubi*, iij, 12.
- In pectus ruentis, progn.* viij, 38.
- CAUTIO GENERA-

- LIS, i, 2, 3, 17.
 CEREBRUM.
 Frigus nocet, v, 18.
 Concussi sympto-
 mata, vij, 58.
 Vulneris sympto-
 mata, vj, 50.
 Progn. vij, 14.
 Lethale est, vij, 24.
 Sphaceli progn.
 vij, 50.
 CHOLERA. *Ætas*,
 ijj, 30.
 CIBUS, *Nutritio*.
 Cautio, j, 17; ij, 7, 51.
 Progn. ij, 31, 32.
 Concoction. progn. à tempore, j, 18; iij, 18.
 Differentia, ij, 18.
 Tutus quando, ij, 15; vij, 65.
 Nocet, j, 11, 19; ij, 10; vij, 65, 67.
 Pauco ubi opus, j, 10, 14, 18.
 Multo ubi opus, j, 14, 15, 18.
 Copiosi sign. ij, 8, 17; iv, 41, 45; vij, 61.
 Effectus, ij, 17.
 Consuetus præfer-
 tur, ij, 38.
 Humidus quibus
 utilis, j, 16.
 Citò nutriens, ij, 18.
 Et lentè ubi neces-
 sè, ij, 7.
 Mutatio ubi juvet,
 ij, 45.
 Pravi progn. per-
 gante, ij, 36.
 Vid. plura in Diæta.
 COLLIQUEFAC-
 TIO
 Prog. in feb. ij, 28.
 In gravidâ, v, 45.
 Diæta, v, 64.
 COLLUM. *Inversi*
 progn. iv, 35; vij, 58.
 COLOR. *Variantis*
 progn. iv, 40; vij, 60.
 CONCEPTUS.
 Sign. v, 41, 51, 61.
 Impedimentum, v, 46, 62.
 Maris locus, v, 38, 48.
 Sign. à colore, v, 42.
 CONCOCTA.
 Movenda, non

- cruda*, j, 22.
Cruda, à bile atrá,
 vij, 68.
CONSUETUDO.
Vís, ij, 45.
Ejus habenda ratio, j, 16, 17; ij,
 28, 49, 50.
CONTRARIUM.
Remedium est, ij,
 17, 22, 48, 50;
 v, 19.
Paulatim adhiben-
dum, i, 51.
CONVULSIO. Vid.
 Spasmus.
COR. *Vulnus*, le-
 thale, vj, 18.
CORPUS.
Præparatio. Vid.
 in Purgatione.
Statura, ij, 54.
CRANIUM. *Læsi*
symptomata, vij,
 24.
CRISIS.
Future sign. à noc-
te, ij, 13.
Ab uriná, iv, 71.
Critici dies. ij, 23,
 24; iv, 36, 61.
Progn. j, 12.
Non turbanda, j,
 19, 20.
Imperfecta, ij, 12;
 iv, 51, 61, 62;
 viij, 4.
CUCURBITULÆ.
Ubi necesse, v, 50.
CUTIS.
Progn. v, 61.
Raræ, v, 69.
DEGLUTITIO.
Progn. iv, 34, 35;
 vij, 58.
DELIQUIUM ANI-
MI.
Causa; calor fre-
quens, v, 16.
A tuberculo rupto,
 vij, 8.
Progn. ij, 41.
In fluore muliebri
malum, v, 56.
Ubi opus, j, 23.
DELIRIUM.
 Φρενίτις.
Ætas, iiij, 30.
Sign. ab uriná, iv,
 72.
Progn. in sene,
 viij, 1.
Mala; ex perip-
neumoniá, vij, 12.
 Παραφροσύνη.
In cranio fracto,
 vij, 24.

Progn. bona, à somno, ij, 2.

A risu, vj, 53.

Mala, in febr. iv, 50.

Cum studio. vj, 53.

Post potum, vj, 7.

In hæmorrhagiâ, vij, 9.

In ileo, vij, 10.

In vigiliis, vij, 18.

In plagâ capitis, vij, 14.

Παρακοπή.

Ubi bona, vj, 26,

Μαρία.

Tempus, iiij, 20, 22.

Ab ulcere, v, 65.

In melancholicis, vj, 56.

A mammis, v, 40.

Progn. vij, 5.

Solutio, vj, 21.

Delirium, viij, 16.

DENTIS.

Dentitionis ætas et morbi, iiij, 25.

Frigus nocet, v, 18.

Lentoris in feb. progn. iv, 53.

DESTILLATIO.

Vid. Catarrhus.

DIÆTA.

Cautio, j, 9, 10, 16; iiij, 3.

Pleniori ubi opus, j, 4, 5, 7, 10.

Tenui ubi opus, j, 7, 8, 10, 11.

Mutatio quos juvet, ij, 45.

Erratum, j, 5.

Vid. plura in Cibo.

DIAPHRAGMA.

Vid septum transversum.

DIARRHŒA. *Vid.*

Alvi fluxus.

DOLOR.

Progn si non sentiat, ij, 6.

Si sint bini, ij, 46.

Calor lenit, v, 22.

Torpor solvit, v, 25.

In ulcere, v, 65.

Ab anginâ, v, 10.

Cautio, vj, 5, 56.

Lumborum.

Tempus, iiij, 23.

Progn. iv, 11.

Purgatio, iv, 20.

Ventris.

Progn. iv, 11; vj,

7; viij, 22, 26.

Purgatio, iv, 20.
Viscerum. Progn.
 iv, 66.
Articulorum.
Tempus, iiij, 16, 20.
Ætas, iiij, 31.
Post febres longas, iv, 44; vij, 63.
Causa, cibus copiosior, iv, 45; vij, 64.
Frigida solvit, v, 25.
DYSENTERIA.
Tempus, iiij, 11, 12, 16, 22.
Ætas, iiij, 30.
In ulcere, v, 65.
Adiarrhœa, vij, 75.
Progn. vj, 3, 43; vij, 76.
Bona in liënosis, vj, 48.
In insanid, vij, 5.
Mala, à sincerâ dejectione, vij, 23.
Lethalis ab atrâ bile, iv, 24.
Cum carunculis, iv, 26.
DYSPNOEA. Vid.
Respiratio.

DYSURIA.

Tempus, iij, 5.
Ætas, iiij, 31.
Cura. V. S. vj, 36; vij, 48. *Vinum*, vij, 48.

EBRIUS. *Progn.* v, 5.

ELLEBORUS.

Præparatio ad Elleborem, iv, 13.
Quomodo juvetur, et sistatur, iv, 14, 15.
Sanis periculosus, iv, 16.
Progn. à spasmo, v, 1.
 Vid. *plura in purgante.*

EMPYEMA.

Causa à sanguine effuso, vi, 20.
À pleuritide, v, 8.
Quot diebus fiat.
Progn. v, 15.
In curâ, vij, 34.
Cautio in curâ, vj, 27.

EPILEPSIA.

Tempus, iiij, 16, 20, 22.
Ætas, iiij, 29.
Progn. v, 7.

Curá, ij, 45.
ERYSIPELAS
Ab osse nudato,
 vij, 19.
Progn. vj, 25; vij,
 20.
Lethalis in gravi-
dæ utero, v, 43.
Cura non exulce-
rati, v, 23.
EVACUATIO.
Ubi opus, ij, 8;
 iv, 41.
Cautio, i, 23; ij, 29.
Quá víd, j, 21;
 vij, 61.
Progn. j, 2, 23, 25.
Extrema pericu-
losa, j, 3; ij, 51.
Cura, ij, 22.
EUNUCHUS.
Progn. vj, 28.
EXCRETIO.
EXSOLUTIO.
Εκλύω, ij, 36, 41;
 vij, 8.
Διαλύω, iiij, 17.
Καταλύω, ij.
Tempus, iiij, 17;
 43.
Causa, ij, 36; vij,
 8.
Progn. ij, 41, 43.

EXPERIENTIA.
Quoad brevitatem
vítæ fallax, j, 1.
EXTENUATUS.
Progn. ij, 28, 35;
 iv, 23.
Vid. plura in pin-
gni.
EXTREMARUM.
frigus. Vid. *Frigus.*
FAMES.
Variat cum ætate,
 j, 13.
Progn. ij, 4.
Labor nocet, ij, 16.
Siccatur corpus, vij,
 59.
Expletur diffici-
lius quàm sitis,
 ij, 11.
Solvitur vino, ij, 21.
Appetitus dejectus.
Progn. ij, 32.
Malus, vj, 3; vij, 6.
Curat purgatio, iv,
 17.
Fastidium cibi. In
muliere *progn.*
 v, 61.
FAUCES.
Laborantium pro-
gn. ij, 15.
Asperarum tem-
pus, iiij, 5.

FEBRIS.

Ætas, iij, 25.*Progn.* ij, 28.*A tempore*, iij, 6.*A paroxysmo*, iv, 30.*A somno*, iv, 67.*A lacrymis*, iv, 52; viij, 2.*A surditate*, iv, 60.*A dentibus*, iv, 53.*A collo*, iv, 35; vij, 58.*A respiratione*, iv, 68.*A suspîrîis*, vj, 54.*A suffocatione*, iv, 34.*A vomitu sanguinis*, vij, 37.*Ab hypochondriis*, iv, 73.*Ab urina*, iv, 69, 70; vij, 31.*Ab alvi excrementis*, iv, 21.*A dysenteria*, vj, 3.*A calore*, iv, 65.*A rigore*, iv, 29.*A spasmò*, ij, 26.*A bubone*, iv, 55.*A lassitudine*, iv, 31.*Ab abscessu*, iv, 51.*Ab extenuatione*, iv, 28, 23.*Ab hæmorrhagiâ*, iv, 27.*A diebus criticis*, iv, 36, 61; ij, 23, 24.*Ab ictero*, iv, 62, 64.*Sudoris in febris tempus*, iij, 6.*Diæta*, j, 16; v, 64.*Cibus cui noceat*, vij, 65.*Nocet in paroxysmo*, j, 19.*Cura febris, quæ non est à bile*, vi, 42.*Morbum solvit*, ij, 26; iv, 57; v, 5; vj, 40, 44, 51; vij, 52.*Acuta.**Tempus*, iij, 7; ij, 13.*Ætas*, j, 14; iij, 29.*Progn.* iv, 66, viij, 10.*A sudore*, iv, 37.*Diæta*, v, 64.*Ardens.**Tempus*, iij, 21.

- Ætas*, iiij, 30.
Progn. iv, 54.
A tempore, vii, 8.
A tremore, vj, 26.
Cura. Rigor solvit, iv, 58.
Delirium, quando, vj, 26.
Continua.
Tempus, iiij, 21.
Progn. à sudore, iv, 43, 56.
A rigore, iv, 46.
A Sputo.
Urina et excrementis, iv, 47; vij, 69.
A spasmo, iv, 49; vij, 73.
A delirio et Respiratione, iv, 50.
Leipyrria.
Progn. iv, 48; vij, 72.
Crisis in xx, diebus, ij, * 23.
Ephamera.
Progn. iv, 55.
Quotidiana.
Sign. iv, 63.
Quæ sit difficilis, iv, 30.
Tertiana.
Tempus, iiij, 21.
Crisis, iv, 59.
Tertiana continua, periculosa intermittens non, iv, 43; vij, 62.
Quartana.
Tempus, iiij, 21, 22.
Sign. ab urina, iv, 74.
Progn. v, 70.
A tempore, ij, 25.
Ab hæmorrhagiâ, viij, 3.
Symptomata, ij, 47; vj, 60.
Vaga.
Tempus, iiij, 22.
Longa.
Tempus, iiij, 16; iv, 36.
Ætas, iiij, 27.
Unde, vj, 45; vij, 64.
Longæ futuræ sign.
A sudore, iv, 37.
Ab urinis, vij, 31.
Ab abscessu, iv, 51.
Progn. iv, 44; vij, 63.
Diæta, v, 64.
Lenta. Diæta, v, 64.
Cum lassitudine, quibusdam jam.

- Lymphatica dicta. *Prog. mala*, viij, 11, 12, 14.
Sign. ab urina, iv, 31.
 Recidiva.
 Causa, ij, 12.
 Unde, iv, 36, 61.
 FERRUM. *In cura* progn. viij, 6.
 FLUOR MULIEBRIS. *Progn.* v, 56.
 FOEMINA. Vid. Mulier.
 FOTUSSUFFITUS. Πυρία.
 Menses movet, v, 28.
 Oculorum dolores solvit, vj, 31.
 Ejus noxæ, v, 28.
 Ουρία. Experimentum circa prægnationem, v, 59.
 FRIGUS. *Ætas*, iij, 14.
 Ubi juvet, v, 21, 23, 25.
 Ubi noceat, v, 17, 18, 20, 22, 23, 24.
 Morbi à frig. v, 17, 20, 24.
 Particulare, *quid notet*, iv, 39.
 Extremarum, prog. viij, 1, 26.
 In febre progn. iv, 48; viij, 69.
 Mutati. progn. iv, 40; viij, 60.
 Mortis imago, viij, 18.
 Cura, calor. v, 19, 22.
 FUROR. Vid. in Delirio.
 GEMELLI. *Alterutrius abortus*, v, 38.
 GENA. *Tenuis particula dissecta non coalescit*, vj, 19.
 GENITALIUM putredines. *Tempus*, iij, 21.
 GENUUM gravitas. *Purgatio curat.* iv, 20.
 GIBBUS. *Progn.* vj, 46.
 GINGIVÆ Putritus. Vid. Pruritus.
 GRACILIS. Vid. in Pingui.
 GRAVEDO.

- Tempus*, iiij, 13,
 20, 23.
Progn. in sene, ij,
 40.
Diuturnæ tempus,
 iij, 14.
GRAVIDA.
Sign. v, 41, 51, 61.
Fœtus locus, v, 38.
 48.
Progn. à mammis.
 v, 37, 38, 52, 53.
A menstruis, v, 60.
A colore, v, 42.
A. V. S. v, 31.
A diarrhœdâ, v, 34.
A tenesmo, vij, 27.
Ab erysipellate, in
utero, v, 43.
A febre, v, 55.
A morbo acuto, v,
 30.
Ab extenuatione
p. n. v, 44.
Purgatio, iv, 1;
 v, 29.
HABITUS.
Progn. ij, 34.
Athleticus, j, 15.
Periculosus, i, 3.
HÆMOPTOE. Vid.
Sanguinis spu-
tum.
HÆMORRHAGIA.
- Vid. *Sanguinis*
fluxus
HÆMORRHOIDES.
Ætas, iiij, 30.
Bonæ, iv, 25; vj,
 11.
Curæ cautio, vj,
 12.
Solvunt delirium,
 vj, 21.
HEPAR.
Dolorem febris sol-
vit, vij, 52.
Inflammati sympto-
mata, sive sign.
 v, 58.
Progn. vij, 17.
Suppurati curæ
progn. vij, 45.
Hydropis, progn.
 vij, 55.
Vulnus, lethale, vj,
 18.
HERPES exedens. *Ju-*
vatur calore, v,
 22.
HORROR.
Tempus, iiij, 5.
A sudore malus,
 vij, 4.
Vinum solvit, vij,
 56.
HUMIDA NATU-
RA, sive Corpus,

- Ætas*, iiij, 31.
Sign. sudor. iv, 56; vij, 61.
Progn. vj, 2.
Cura, fames, vij, 59.
Evacuatio, vij, 61.
Juvat siccitas, iiij, 14.
Morbi, iiij, 11.
 HUMORES ALII.
Progn. vij, 69, 70.
 HYDROA. *Tempus*, iiij, 21.
 HYDROPS.
Tempus, iiij, 22.
Causa, ab hæmorrhoidibus curatis, vj, 12.
Aliene, vj, 43.
Ab hepatis hydrope, vij, 55.
A leucophlegmatid, vij, 74.
Progn. à causis, vj, 43; vij, 55.
A tempore, viij, 8.
Tussis desperata est, vj, 35; vij, 47.
Bona in delirio, vij, 5.
Curæ cautio, vj, 27.
Solutio, vj, 14.
Ulcus difficile, vj, 8.
Sicca, unde, iv, 11.
 HYEMS. Vid. *Tempestas*.
 HYPERCATHARSIS. Vid. *Purgatio*.
 HYPOCHONDRIA.
Murmuris progn. iv, 73.
Diæta, v, 64.
Doloris progn. vj, 40.
Duritie in Ictero progn. iv, 64.
 HYPOGASTRIUM.
Dolor, quid notet, iv, 80; vij, 39.
 HYSTERICA. *Sternutatio juvat*, v, 35.
 ICTERUS.
Non est flatulentus, v, 72.
Progn. ab hepate, vj, 42; iv, 64.
Progn. quando noxius, iv, 62.
Utilis, iv, 64.
 JEJUNIUM. Vid. *Fames*.
 IGNIS. *Curæ progn.* viij, 6.
 ILEUS.

- Tempus*, iij, 22.
Progn. à stranguria, vj, 44.
A variis, vij, 10.
 IMBECILLITAS.
Sign. ij, 28.
 IMPETIGINES.
Tempus, iij, 20.
 INFLAMMATIO.
Recens, frigore curatur, v, 23.
 INSANABILIA.
 viij, 6.
 INSTABILIA. *Quæ*,
 ij, 27, 52.
 INTESTINUM.
Tenuis vulnus lethale, vj, 18.
Non coalescit, vj, 24.
Recti inflammati symptomata, v, 59.
 ISCHIADICUS DOLOR.
Tempus, iij, 22.
Progn. vj, 59, 60.
 JUDICIUM. *Difficile*, j, 1.
 JUVANTIA, NOCENTIA, ij, 27.
 LABIA.
Progn. viij, 13.
In febre continuâ.
 vj, 49; vij, 73.
 LAC.
In menstruis deficientibus, v, 39.
In gravidâ, progn.
 v, 52.
Quibus conveniat.
 v, 64.
 LACRYMÆ.
Ætas, iij, 31.
Progn. in morbis,
 iv, 52; viij, 2.
 LASSITUDO.
Sign. ex urinâ, iv, 74.
Progn. in febre,
 iv, 31.
Cura, quies, ij, 48.
Spontanæ progn.
 ij, 5.
 LATUS. Dolor. Vid.
 Dolor.
 LEPROA.
Tempus, iij, 20.
 LETHALE VULNUS. Vid. Vulnus.
 LETHARGUS.
Tempus, iij, 23.
Ætas, iij, 30.
 LEUCOPHELEGMATIA.
Progn. vij, 74.
Solvitur diar-

rhæa, vij, 29.
LICHENES. *Tempus*, iij, 20.

LIENOSUS.
Tempus, iij, 22.
Progn. vj, 43; viij, 8.
Dysenteria utilis, vj, 48.

LIENTERIA.
Tempus, iij, 22.
Ætas, iij, 30.
Causa in Lienosis, vj, 43.
A dysenterid, vij, 76.
Progn. à ructu, vj, 1.
Cautio in purgatione, iv, 12.

LINGUA.
Progn. vij, 40; vij, 9.

LOCUS. Vid. Regio.

LUMBUS. Dolor. Vid. Dolor.

MAMMÆ.
Progn. à lacte, v, 39.
A sanguine, v, 40.
In gravidâ, ab extenuatione, v, 37. 53.
A Lacte, v, 52.

MANIA. Vid. in Delirio.

MELANCHOLIA.
Tempus, iij, 14, 20, 22.

Signa Timor et mæstitia, vj, 23.
Effectus, vij, 40.
Progn. vj, 11, 56.
Purgatio, iv, 9.

MENS.
Progn. ij, 33, viij, 16.
Laborantis sign. ij, 6.

MENSTRUUA.
Eruptentia, morbos pueritiæ solvunt, iij, 28.
Vomitum sanguinis curant, v, 32.
Sistuntur in gravidâ, v, 61.

Fluentium progn. v, 60.

Deficientia.
Sign. v, 57; vj, 29.
Sanguis è naribus juvat, v, 33.
Cura suffitus, vj, 28.

Nimia.
Progn. v, 56.
Cura, v, 50.

Coloris vitiiati *Cura*,
v, 36.

MORBUS.

Cautio in morbo,
j, 2.

Progn. j, 12; ij, 32,
33, 34, 35; iij, 3;
viij, 1.

MORBI SEDES, sive
Focus, iv, 33, 38,
39.

MORBUS FUTU- RUS.

Tempus, iij, 1, 19.

Sign. ij, 5.

Causa. Cibi copia,
ij, 17.

MORBI PRIN- CIPIMUM.

Remissius est, ij,
30.

Ab atrá bile lethale,
iv, 22.

Rarò purgandum,
j, 22, 24.

*Siquid movendum
statim move*, ij,
29; iv, 10.

Morbi Vigor.

Vehementior est,
ij, 30.

Diæta, tenuis, j,
8, 20.

Nil movendum, ij,
29.

Morbi Finis.

Remissior est, ij,
30.

MORBUS ACUTUS.

Tempus, iij, 9.

Sign. j, 7.

Ab uriná, vij, 32,
35.

Prædictio incerta,
ij, 29.

Progn. viij, 10.

Mala, à suspiriis,
vj, 54.

*Frigore extrema-
rum*, vij, 1.

*Lethalis ab excre-
mentis*, iv, 23.

In gravidâ, v, 30.

Diæta, j, 4, 7.

Purgatio, j, 24;
iv, 10.

Crisis in XIV.
diebus, vij, * 39.

MORBUS LONGUS.

Futuri sign. j, 12;
ij, 28; iv, 40;
vij, 60.

A sudore, iv, 36,
37, 56.

Ab uriná, vij, 31,
34.

Ab abscessu, iv,
51.

Existentis progn. ab

- appetitu prostrato*, vij, 6.
Ab excrementis,
 iv, 21; vij, 67.
Ab alvi fluxu,
 viij, 5.
Diæta tenuis periculosa, j, 4.
Crisis in lx. diebus,
 iv, * 36.
MORBUS PERICULOSUS.
In genere, ij, 34;
 viij, 1, 8.
Remedium quale,
 viij, 6.
MORBUS.
Judicatu facilis, j,
 12; iiij, 8.
Difficilis, j, 12, iiij,
 8; iv, 29, 30.
MORBUS RECIDIVUS.
Causa, ij, 12.
Futuri sign. iv, 36,
 61.
MORBUS INSANABILIS, viij, 6.
MORS.
Propinqua.
Sign. à variis, vij,
 16, 24, 25; viij,
 11 ad 18.
Ab excrementis,
 iv, 23.
- In feb. contin.* iv,
 49; vij, 73.
Certa, vj, 27.
Subita. Sign. ij, 41,
 44.
MORTIFERUM, Lethale.
Θανάσιμον, Θανατώ-
δες, ij, 1; iiij, 9; iv,
 22, 24, 26, 35,
 37, 46, 48, 50; v,
 1, 2, 11, 14, 22,
 30, 43; vj, 18, 27,
 52; viij, 25, 72, 73,
 79; viij, 11, 13, 14,
 15, 16, 17, 18.
MOTUS, QUIES.
Se invicem curant.
 ij, 22, 48.
Effectus in purg.
 iv, 14, 15.
Progn. ij, 49, 50.
MULIER.
Non est ambidex-
tra. vij, 43.
Fœcundæ tempera-
mentum, v, 62.
Sign. v, 59.
Infœcunda., crassa
p. n. v. 46.
MUTATIONES.
Subitarum progn. ij,
 51.
- Caloris,

- Caloris, Coloris, Tempestatis. Vid. Calor, Color, Tempestas, etc.
- MUTUS.**
Causa, vij, 58.
Progn. vj, 51.
Ab ebrietate, v. 5.
- NARES.**
Progn. in feb. contin. iv, 49; vij, 73.
Humidarum ætas, iij, 31.
Et Siccarum progn. vj, 2.
Hæmorrhagiæ in quartana progn. viij, 3.
Pus solvit dolorem capitis, vj, 10.
Compressarum vis, v, 49.
- NATURA.**
Inimicum. Vid. Nimum.
Differentia, iij, 1.
Progn. ij, 34; vj, 2; viij, 1, 8.
- NEPHRITIS.**
Ætas, iij, 31.
Sign. ab urina, vij, 34, 35.
Progn. vj, 36.
- In senibus*, vj, 6.
Hæmorrhoides utiles, vj, 11.
- NERVUS.**
Calor juvat, v, 18.
Frequentior debilitat, v, 16.
Resectus non coalescit, vj, 19; viij, 28.
- NIGROR**
Causa, frigus, v, 17, 20.
- NIMIUM**, Naturæ est inimicum.
In omnibus, ij, 51.
In cibo, j, 4; ij, 4, 17.
In somno, vig. ij, 3; viij, 71.
- OCCASIO.** *Celeris*, j, 1.
- OCULI.**
Progn. iv, 52; viij, 2.
In febre continuâ, iv, 49; vij, 73.
In vomitu, viij, 3.
In somno, vj, 52.
Ophthalmia.
Tempus, iij, 11, 14, 16, 21.
Solutio, vj, 17.
Doloris cura, vj, 31; viij, 46.

Tarditatis et Mor-
sus tempus, iiij,
17.

Hebetudinis.

Glaucomatis et Hu-
miditatis ætas, iiij,
31.

Cæcitas, in melan-
cholicis, vj, 56.

OFFICIUM medici,
ægri, etc., j, 1.

OMENTUM.

Crassius, infœcun-
dam facit, v, 46.

Excidens putrescit,
vj, 58.

ORGASMUS. Vid.
Turgens materia.

OS.

Ulcerationum.

Tempus, iiij, 21.

Ætas, iiij, 24.

Amari cura, iv, 17.

OSCITATIO.

Solvitur vino, vij,
56.

OSSA.

Frigus lædit, v,
18, 22.

Laborantis progn.
vij, 2.

Nudati progn. vij,
19.

Cura, calor juvat.
v, 22.

Dissectum, non coa-
lescit, vj, 19; vij,
28.

Fracta calor juvat,
v, 22.

Abscessus, in ul-
cere diuturno, vj,
45.

A sphacelo, vij,
77.

Παρακοπή. vj, 26.

PAROXYSMUS.

Sign. j, 12; ij, 13.

Progn. iv, 30.

Cibus nocet, j, 11,
19.

PARTUS DIFFICI-
LIS.

In tenuitate p. n.
a feb. v, 55.

Sternutatio juvat,
v, 35.

PECTEN. *Dolor*
quid notet, vij, 39.

PECTUS. *Frigus*
lædit, v, 24.

Dolor. Vid. *Dolor.*

PERINÆUM.

Dolor quid notet,
iv, 80; vij, 39.

PERIPNEUMONIA.

Vid. in *Pleuritide.*

PERVERSA, sive
Distorta pars.

- Progn. in febre*,
iv, 35, 49; vij,
58, 73.
- PHLEBOTOMIA.
Vid. V. S.
- PHRENITIS. Vid.
Delirium.
- PHTHISIS.
Tempus, iij, 13,
16, 22.
Ætas, iij, 29; v,
9; viij, 7.
Causa, à pleuritide, v, 15.
Asputo sanguinis,
vi, 15, 56, 78.
Puris, vij, 16, 78.
*Ab hæmorrhoidi-
bus*, vj, 12.
Progn. lethalis.
A tempore, iij,
10.
A naturâ, viij, 8.
A diarrhœâ, v, 12,
14; vij, 78.
A sputo, v, 11;
vij, 16, 78.
*Puris purgatio sur-
sum*, vij, 78.
Diæta, v, 64.
Purgatio, iv, 8.
- PINGUES. Crassi.
Progn. ij, 35.
Mortis, ij, 44.
- Purgatio*, ij, 35;
iv, 7.
Gracilis.
Purgatio, ij, 35;
iv, 6.
Gravidæ p. n.
progn. v, 44.
- PITUITA.
Conclusæ solutio,
vij, 54.
Fluxus à capite, vij,
30.
- PLEURITIS.
Tempus, iij, 23.
Ætas, iij, 30.
Qui minus obnoxii,
vj, 33.
Progn. vij, 11.
*A sputo, quoad
tempus*, i, 12; v,
8, 15.
Diarrhœa lethalis,
vj, 16.
Dolor vid. Dolor La-
teris.
Peripneumonia.
Tempus, iij, 23.
Ætas, iij, 30.
Progn. vij, 12.
Mala à pleuritide,
vij, 11.
Diarrhœa lethalis,
vj, 16.
- PLUVIA. Vid. in
Tempestate.

PODAGRA.

Tempus, iij, 16,
20; vj, 55.

Ætas, iij, 31.

Causa, vj, 29, 30.

Qui non obnoxii,
vj, 28, 29, 30.

Progn. vj, 49.

Dolorem frigida
solvit, v, 25.

POTUS.

Consuetus præfer-
tur, i, 38.

Effectus, ij, 11.

Multi progn. vij, 7.

PRÆDICTIO.

Acutorum incerta,
ij, 19.

PRÆGNANS. Vid.
Gravida.

PRÆPUTIUM.

Resectum non coa-
lescit, vj, 19.

PRURITUS.

Gingivarum, ætas,
iij, 25.

Corporis totius,
Ætas, ii, 31.

PURGATIO PER
ALVUM.

Purgandum.

Vere, vj, 47.

Hyeme, iv, 4.

Non purgandum.

Æstate, iv, 7.

Sub cane, etc., iv,
5, 9.

In vigore morbi,
ij, 29.

In extenuatis, ij,
35; iv, 6.

Qui purgandi, ij, 8;
iv, 18, 20; vij, 67.

Quæ purgandæ, v, 36.

Purgandi.

Difficulter vomen-
tes, iv, 7.

Melancholici, iv,
9.

Tabidi, iv, 8.

Oculis dolentes,
vj, 31.

Debilis sudans,
vij, 61.

Gravida, quando,
iv, 1; v, 29.

Purganda.

Concocta, j, 22.

Turgentia, iv, 1,
10; v, 29.

Quâ viâ purgan-
dum, j, 21; vij, 61.

Præparatio ad pur-
gationem, ij, 9;
iv, 13; vij, 30.

Quantâ purgatione
opus, j, 23.

Juvanda, aut

- Sistenda, *quomodo*,
iv, 14, 15.
- Finis *sign.* iv, 12.
Progn. ab excre-
mentis, iv, 21.
A spasmō, v, 1;
vij, 25.
- Bonæ *purgationis*
sign. j, 2, 23, 25;
iv, 2, 3.
- Noxia.
In genere, j, 2, 25;
iv, 2, 3.
Sub Cane, etc., iv,
5.
In sanis, ij, 36, 37;
iv, 16.
In Crisi, j, 20.
- Spontaneæ *progn.* j,
1, 2.
- Hypercatharsis.
Progn. v, 4; vij,
41.
- PUS.
Generationis sign.
ij, 47.
Calor juvat, v, 22.
Frigus impedit, v,
20.
Progn. vj, 41; vij,
8.
Boni nota, vij, 44,
45.
Curæ Cautio, vj,
27.
- Puris sputum.
Causa, à sanguinis
sputo, vij, 15, 78.
A vomitu sangui-
nis, vij, 78.
Progn. vij, 16,
78.
- E capite effluens,
ejus dolorem sol-
vit, vj, 10.
- In ventre, *Causa*,
vj, 20; vij, 22.
- In urinâ, *quid no-*
tet, iv, 75, 81.
- In utero, *Cura*, v,
47.
- PUSTULÆ.
Ulcerosæ, Vere
fiunt, iij, 20.
Datæ, quales sint,
vj, 9.
- PUTREDINES.
Tempus, iij, 16, 21.
- QUIES. Vid. in Mo-
tu.
- RABIES. Vid. in De-
lirio.
- RAUCEDO.
Tempus, iij, 13,
20, 23.
Progn. in sene, ij,
40.
- RATIO. Vid. Mens.
Rationi fidendum,
ij, 27, 52.

RECIDIVUS MOR-
BUS. Vid. Morbus
recidivus.

REFECTIO. Vid.
Cibus.

REGIO.

Cautio in Diætâ,
j, 17.

In Medicamentis,
j, 2.

Mutatio, quos ju-
vet, ij, 45.

REMEDIIUM.

Quali opus, j, 6.

Gradus, viij, 6.

RENES.

Sanguinis profluen-
tis sign. iv, 75, 78.

Suppuratorum sym-
-ptomata, vij, 36.

Ulceris sign. iv, 75.

Pili, et

Carunculæ, iv, 76.

REPLETIO.

Differentia, ij, 11.

Extrema periculosa,
j, 3, 4; ij, 4, 17,
51; vj, 39.

Cura, ij, 22.

RESPIRATIO diffi-
cilis. Dyspnœa.

Ætas, iij, 31.

Progn. in febre,
iv, 68.

In feb. contin. iv,
50.

RIGOR.

Causa, frigus, v,
17, 20.

Focus, v, 62.

Signum est quoti-
dianæ feb. iv, 63.

Solvit feb. arden-
tem, iv, 58.

Progn. in febre, iv,
29, 46.

Malus à multo po-
tu, vij, 7.

Cura. Calor miti-
gat, v, 22.

RUCTUS ACIDUS.

Progn. vj, 33.

Bonus in Liente-
riâ. quando, vj, 1.

SANGUIS.

Collecti in mammas
progn. v, 40.

Fluxus tempus, iij,
20.

Causa, calor, j, 16.

Frigus, v, 24.

Progn. in feb. iv,
27.

A convulsione, etc.
v, 3, vij, 9.

Malus in ulcere,
vij, 21.

Diætâ, v, 64.

- Cura, frigus, v,*
 19, 23.
E capite progn. vj,
 10.
Per nares.
Ætas, iij, 27.
Progn. in quarta-
na, viij, 3.
Bonus in mens-
truis deficienti-
bus, v, 33.
Solvit surditatem,
vj, 60.
Capitis dolorem,
vj, 10.
Abscessum, iv, 74.
In ventrem progn.
vj, 20.
Sputum.
Ætas, iij, 29.
Progn. vij, 15, 78.
In feb. contin. iv,
 27.
Spumans, e pulmo-
ne, v, 13.
Vomitus.
Progn. Bonus sine
febre, vij, 37.
Malus, ij, 25.
Cum febre, vij, 37.
Tabes sequitur,
vij, 78.
Cum urina, quid no-
let, iv, 78, 80, 31;
vij, 39.
- Per alvum.*
Niger bonus, iv,
 25.
Malus, iv, 21,
 23.
 SANITAS. *Sign. vj,*
 2.
 SATIETAS. *Quæ*
mala, ij, 4.
Vid. Repletio.
 SATYRIASIS.
Ætas, iij, 26.
 SECUNDÆ.
Sternutatio expel-
lit, v, 49.
 SEMEN. *Progn. vj, 2.*
 SENEX. *Vid. in Æta-*
 te.
 SEPTUM TRANS-
 VERSUM.
Vulnus lethale, vj,
 18.
 SICCITAS. *Vid. in*
Tempestate.
 SIGNA. *Vid. Affec-*
tus, ejus sunt.
 SINGULTUS.
Causa, vj, 39.
Ab hepate inflam-
mato, v, 58.
Progn. malus in
hæmorrhagiâ, v, 3.
In hypercatharsi,
v, 4; vij, 41.
A vomitu, vij, 3.

Ab Ileo, vij, 10.

Ab hepate inflam-
mato, vij, 17.

Cura. sternutatio,
vj, 13.

SITIS.

Non magna, ubi.

Progn. nocturna,
v, 27.

In purgante, iv, 19.

In feb. Leipyria,
iv, 48; vij, 72.

Diceta, *Lac nocet*,
v, 64.

Expletur citius,
quàm fames, ij,
11.

SOMNUS, VIGI-

LIÆ.
Mali, ij, 3; vij, 71.

Somnus.

Progn. ij, 1.

In febre, iv, 67.

In vertigine, viij,
15.

Bonus, *in delirio*,
ij, 1. 2.

Post sitim, v, 27.

Effectus, iv, 14, 15.

Longi tempus, j, 15.

Vigiliæ.

Ætas, iiij, 24, 31.

Prognosis mala,
vij, 71.

SPASMUS, Convul-

sio.

Ætas, iiij, 25.

Causa, *frigus*, v,
17, 20.

Repletio aut

Inanitio, vi, 39.

In melancholicis,
vj, 56.

In ulcere, *quando*.
v, 65.

Futuri in feb. sig.
iv, 68.

Progn. in febre,
ij, 26.

Malus in febre, iv,
66, 67.

In vigiliis, vij, 18.

In ardore, vij, 13.

In hæmorrhagiâ,
v, 3; vij, 9.

In Ileo, vij, 10.

Ab Ellebor, iv, 16.

Ab hypercatharsi,
v, 4.

In fluore muliebri,
v, 56.

Lethalis. In febre
contin. iv, 49.

Apurgante, vij, 25.

Ab Elleboro, v, 1.

In ebrio, v, 5.

In teste dextro,
viij, 11.

- In vulnere*, v, 2.
Cura. Calor mitigat, v, 22.
Frigus levat, v, 25.
Solvitur à febre, iv, 57.
A quartaná, v, 70.
TETANUS.
Causa, frigus, v, 17, 20.
In ulcere, quando, v, 65.
Progn., v, 6.
Malus in ardore, vij, 13.
Cura, frigida, v, 21.
Calor mitigat, v, 22.
Solvitur à febre, iv, 57.
SPIRITUS. Vid. *Respiratio*.
SPUMA.
Oris. progn. ij, 43.
In sputo sanguinis, unde, v, 13.
In alvi excrementis, unde, vij, 30.
Bullæ in urinâ, quid notent, vij, 34.
SPUTUM.
Progn. in feb. contin. iv, 47; vij, 69.
- In pleuritide*, i, 12.
In phthisi, v, 11; vij, 78.
Sanguinis. Vid. *Sanguinis sputum*.
Puris. Vid. *Puris sputum*.
STATURA CORPORIS, ij, 54.
STERILIS.
Mas. v, 63.
Mulier. Vid. *Mulier*.
STERNUTATIO.
Causa, vij, 51.
Solvit singultum, vj, 13.
Juvat partum difficilem, v, 35.
Expellit secundas, v, 49.
STRANGULATIO.
Progn. ij, 43.
STRANGURIA.
Tempus, iij, 16, 20, 22.
Ætas, iij, 31.
Symptomática, iv, 80; v, 58; vij, 39.
Progn. ab Ileo, vj, 44.
Cura. V. S. et vinum, vij, 48.
STRUMA. *Ætas*, iij, 26.

STUPOR.

*Malus in vulnere
Capitis*, vij, 14.

SUDOR.

In febre, tempus,
iij, 6.

In morte, cui, v, 71.

*Particularis, morbi
sedem notat*, iv, 38.

Progn. j, 12; vij,
79.

In febre, iv, 36.

Malus in feb. contin. iv, 56.

*In crisi, {qualis,
vij, 4.*

Horror malus, vij,
4.

Calidus, quid notet,
iv, 42.

Frigidus malus, iv,
42; viij, 4.

Progn. in feb., iv,
37.

*Multus et continuus,
quid notet*, iv, 42;
vij, 61.

A somno, unde,
iv, 41.

Ubi malus, viij, 4.

Cura, iv, 41; vij,
61.

Hydroa. Tempus,
iij, 21.

*SUFFITUS. Vid. Fo-
tus.*

SUFFOCATIO.

Progn. in febre,
iv, 34; vij, 58.

SUPERCILIUM.

*Distorti, in febre
contin. progn.* iv,
49; vij, 73.

SURDITAS.

*In febre contin. le-
thalis*, iv, 49; vij,
73.

*Solutio, per al-
vum*, iv, 28.

In febre, iv, 60.

SUSPIRIA.

*In acutis, cum feb.
mala*, vj, 54.

Vid. Respiratio.

*TABES. Vid. Phthi-
sis.*

TEMPESTAS ANNI.

Concedendum ei,
j, 2, 17.

Morbos indicat,
j, 12.

*In alia alii morbi
fiunt*, iij, 19.

Prog. ij, 34, viij, 8.

Mutatio.

Morbi causa, iij,
1, 4, 8.

Quos juvet, ij, 45.

Siccitas.

Salubris, iij, 15.

Morbi, iij, 7, 16.

Pluvia.

Minus Salubris,
iij, 15.

Morbi, iij, 16.

Ver.

Salubris, iij, 9.

Pueris conducit,
iij, 18.

Diæta, j, 15, 18.

Medicina facien-
da, vj, 47; vij, 53.

Morbi, iij, 20; vj,
55.

Progn. iij, 11, 12.

Æstas.

Senibus utilis, iij,
18.

Diæta, i, 18.

Purgatio, iv, 4, 6.

Morbi, ij, 25; iij,
6, 21.

Progn. iij, 2, 6,
13, 14; viij, 8.

Autumnus.

Ætas media va-
let, iij, 18.

Diæta, j, 18.

Periculosus est,
iij, 9.

Malus tibi, iij, 10.

Morbi, ij, 25; iij,
4, 22; vj, 55.

Progn. iij, 4, 13,
14.

Hyems.

Mediæ ætati com-
moda, iij, 18.

Diæta, j, 15, 18.

Purgatio, iv, 4, 7,
9, 12.

Morb. ij, 25; iij,
23.

Progn. iij, 2; ij,
12; viij, 8.

TENESMUS.

Progn. in gravidâ,
viij, 27.

TERROR.

Ætas, iij, 24.

Malus in febre,
iv, 67.

TESTES.

Progn. à convul-
sione, vij, 11.

TETANUS. Vid. in
Spasmo.

TIMOR. Longi ef-
fectus, vj, 23.

TONSILLÆ.

Inflammationis
ætas, iij, 26.

TORPOR. Effectus.
v, 25.

TRANSPIRATIO.

- Progn.* vij, 69,
 79.
In Viro. | V. 63.
TREMOR.
Solutio in feb. ardente, vj, 26.
TRISTITIA. Longæ.
Effectus, vj, 23.
TUBERCULA,
Φύματα
Tempus, iij, 20.
Ætas, iij, 26.
Progn. à ruptione, vij, 8.
Curæ Cautio, ij, 15.
In articulis in feb. longis, iv, 44;
 vij, 63.
Causa, Cibi copia, iv, 45, vij, 64.
Cura, frigida levat, v, 25.
In urethra.
Solutio, iv, 82;
 vij, 57.
Εξανθήματα. vj, 9.
TUMOR.
Progn. mollis bonus, v, 67.
Evanescens progn. v, 65.
In ulcere progn. v, 66.
TURGENS materia.
Ubique et semper educenda, j, 22;
 iv, i, 10; v, 29.
TUSSIS.
Tempus, iij, 5, 13,
 20, 23.
Ætas, iij, 24, 31.
Causa, frigus, v, 24.
Progn. in hydropes desperata, vj, 35;
 vij, 47.
Siccæ in feb. ardente progn. iv, 54.
Gibbi à tusse, progn. vj, 46.
VARICES.
Calvis non sunt, vj, 34.
Solvunt delirium, vj, 21.
VENÆ SECTIO.
Vere instituenda, vj, 47; vij, 53.
Quanta opus, j, 23,
juvat in Capitis dolore, v, 68.
Solvit oculorum dolorem, vj, 31;
 vij, 46.
Dysuriam, vj, 36.
Stranguriam, vij, 48.

Fluxiones, vj, 22.

Noceat gravidæ, v,
31.

VENTRICULUS.

Æstus et Dolor, in
feb. malus, iv, 65.

Cura, *Purgatio*,
iv, 17.

Vulnus, *lethale*, vj,
18.

VENTUS.

Auster. Morbi, iij,
5, 17.

Progn. iij, 12, 13.

Boreas. Morbi, iij,
5, 17.

Progn. ij, 11, 12,
13, 14.

VENTRIS Mutatio.

Vid. Alvi Muta-
tio.

Partes. Vid. Pinguis.

Dolor. Vid. Dolor.

Calor. Vid. Calor.

Ventris turbatio.

Solvit surditatem,
iv, 60.

Spontanæ progn. j,
2.

VER. Vid. in Tem-
pestate.

VERATRUM vid.
Elleborus.

VERMES et.

VERRUCÆ. Ætas

iij, 26.

VERTICULUM.

Luxationis ætas,

iij. 26.

VERTIGO.

Tempus, iij, 17,
23.

Ætas, iij, 31.

Tenebricosa, *mala*,
viiij, 15.

Cura, *Purgatio*,
iv, 17.

VESICA.

Laborantis sign., iv,
80; vij, 39.

Progn. in sene,
vj, 6.

Calor juvat, v, 22.

Calculi ætas, iij,
26.

Sign, iv, 79.

Vulnus lethale, vj,
18.

Ulceris sign, iv, 75,
81.

Scabiei sign. iv, 77.

VIGILIÆ. Vid. in
Somno.

VIGOR. Vid. Morbi
Vigor.

VINUM. Curat.

Θάψηξις fames, ij,
21.

- Ὀφθαλμοὶ *oculorum* UNGUES.
dolores, vj, 31;
 vij, 46.
 Ἰσχυρὰς *affectus* VOMITUS.
varios, vij, 56.
 VISCERA Dolor.
 Vid. Dolor.
 VISUS.
Progn. in feb. contin. iv, 49; vij, 73.
Hebetis tempus, iij, 5.
Ætas, iij, 31.
 VITA.
A calore est, viij, 18.
Brevis est, j, 1.
 ULCUS.
Tempus, iij, 20, 21.
Progn. vj, 4.
A pulsu, vij, 21.
A tumore, v. 65.
In hydropse, vj, 8.
Juvat calor, v. 22.
Nocet frigus, v, 20, 22.
Diuturni progn. vj, 45.
 Oris. Vid. Oris ulceratio.
 UMBILICUS.
Inflammationis ætas, iij, 24.
Doloris progn. iv, 11.
Nigrorum progn. viij, 12.
Tempus, iij, 21.
Ætas, iij, 24.
A tuberculo rupto, vij, 8.
Ubi opus, iv, 17, 18; vij, 61.
Æstate convenit, iv, 4, 6.
Præparatio, vij, 70.
Progn. j, 23; vij, 3.
Malus in Ileo, vij, 10.
In Lienteria hyeme, iv, 12.
 Spontaneus *Progn.* j, 2.
Solvit diarrhœam, vj, 15.
 Sanguinis.
Progn. vij, 78.
A febr. vij, 37.
Malus, iv, 25.
Cura, vij, 37.
Solutio, per menstrua, v. 32.
Bilis in Cerebro viso, vj, 50.
Ab atra bile, lethalis, iv. 22.
 URETHRA.

Tuberculi *solutio*,
iv, 82; vij, 57.

URINA.

Alba, pellucida, ma-
la, iv, 72.

Alba, multa 'crassa',
abscessu liberat,
iv, 74.

Crassæ, grumosæ,
paucæ, *Progn.* iv,
69.

Multa, *noctu quid*
notet, iv, 83.

Solvit morbum, vj,
44.

Nubeculæ *progn.* iv,
71.

Sedimentum.

Progn. iv, 69.

Biliosum, *quid no-*
tet, vij, 32.

Divulsa quid notet,
vij, 33.

Turbata, quid no-
tet, iv, 70.

Fœtida, quid notet,
iv, 81.

Bullarum progn. vij,
34.

Pinguedo, quid no-
tet, vij, 35.

Sanguis, e renibus
aut vesica, iv, 75.

E renibus, iv, 78.

E vesica, iv, 80,
81, vij, 39.

Sanguis et grumi,
quid notent, iv,
80; vij, 39.

Grumosæ progn. iv,
69.

Pus, unde, iv, 75, 81.

Carunculæ, et

Pili, unde, iv, 76.

Farinam crassiorem
referentis progn.
in feb. vij, 31.

Furfures, quid no-
tent, iv, 77.

Squamæ, quid no-
tent, iv, 81.

Arena calculi sign.
iv, 79.

Progn. in genere,
j, 12; vij, 66, 79.

In feb. contin. iv,
47; vij, 69.

UTERUS.

Temperies, mode-
rata fœcunditatis
causa v, 62.

Calor juvat, v, 22.

Os clau-
sum est, v, 54.

In gravida clau-
sum est, v, 51.

Inflammati sign. v,
58.

- Suppurati Cura, v, 47.
 Erysipelas in graviora lethale, v, 43.
 VULNUS.
 Progn. à tumore, v, 65.
 Spasmus lethalis, v, 2.
 Atra bilis per alvum lethalis, iv, 23.
 Non coalescens, vj, 19, 24; vij, 28.
 Lethale, vj, 18.
 Cerebri. Vid. Cerebrum.

FINIS INDICIS.

ERRATA.

PRÉFACE.

Page xv, lig. 8, phlegmagie, *leg.* phlegmasie. — *Id.*, p. xvj, l. 17, *lege* viginti. — P. xvij, l. 9, ἰκνυνῶνται (bis), *lege* ἰκνυόνται. — *Id.* P. xliij, l. 12, pour désigner, *lege* que pour désigner.

IN · TEXTU.

Τμήμα β'. αφερ. μγ'. ἢ *lege* καὶ. — ατ. ιά. ἰκνυόν leg. ὀκισσόν. τμή. δ'. αφ. σ' ἐνήμεας, *leg.* εὐήμεας. *Id.* δυσήμεας. ατ. ζ. τμήμ. ε. αφ. νε εκτιτρώσκουσαι *leg.* ἐκτιτρώσκουσαι τμήμ. σ'. αφ. ιδ' ὕδροπος l. ὕδρωπος. — αφ. ε. ἀλισκομενοι ἀλίσκονται. *lege* ἀλίσκιμέται, ἀλίσκινται. τμ. ς. αφ. ε' ἐργώδως. *leg.* ἐργώδως. ξζ. πορεύωται *leg.* πορεύονται. — ξθ. ἔμπροσθεν *leg.* ἔμπροσθεν. τμή. η. πάντα *leg.* πάντα. τμν. ι'. αφ. ιθ'. ὕδρωψ. *leg.* ὕδρωψ. αφ. ις'. ἐπὶν, *lege* ἐπὶν. τμν. κ. ατ. γ'. τυχοι, *lege* τυχοι.

L A T I N E.

Aphor. 43, S. ii, vel *lege* et. — Aph. * post. 37. S. vij, viginti, *leg.* viginti. S. vj, *leg.* viij. Aphor. 2, infirmatibus, *lege* infirmitatibus.

G A L L I C E.

Aphor. 61, sect. iv, impair, *lege* pair

NOTÆ.

Pag. xvj, lin. 17, viginti; *lege* viginti.
 Pag. 24, ad finem, *leg.* ad finem. Pag. 25,
vide εὐεφής πρὸς τὸν *leg.* εὐεφής, ut in aliis 30 et
 32. *Id.*, περὶ τοῦ, *leg.* περὶ τοῦ. - P. 26, l. 7, de hoc
 aphorismos, *leg.* aphorismo. - P. 31 augeat,
 morbum. *leg.* augeat morbum. Materiâ, *leg.*
 materiâ. - P. 71, l. 4, expellanda, *leg.* expel-
 lenda. - P. 105, sequuntur, *leg.* sequuntur. -
 P. 152, κατὰ τὸν, *leg.* κατὰ τὸν.

Alios errores minusculos in spiritibus, ac-
 centibusve apponendis ignosces operarum insi-
 citiæ, eosque legendo, siqui occurrant,
 castigabis.

